



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

~~1.2.2~~

48-11-31



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5318642352

23250

TABLES

ANALYTIQUES ET RAISONNÉES

DES

MATIÈRES ET DES AUTEURS.

TOME I.



**Le prix des trois volumes des Tables
est de 18 francs.**

502

B87j

TABLES

ANALYTIQUES ET RAISONNÉES

DES

MATIÈRES ET DES AUTEURS,

Pour la nouvelle Edition de l'Histoire
Naturelle DE BUFFON,

RÉDIGÉE PAR C. S. SONNINI,
Membre de plusieurs Sociétés savantes.

OUVRAGE formant, dans cent vingt-quatre volumes *in-8.*,
un COURS COMPLET d'Histoire Naturelle; les premiers, au
nombre de soixante-quatre, sont consacrés à l'histoire de
la théorie de la Terre, des Minéraux, de l'Homme, des
Animaux, des Quadrupèdes et des Oiseaux; les autres sont
partagés ainsi qu'il suit : quatorze pour l'histoire des
Poissons, en y comprenant celle des Cétacées; six pour
celle des Mollusques; huit pour celle des Reptiles; qua-
torze pour celle des Insectes; dix-huit pour celle des Plantes.

PAR P. SUE,

Professeur de Médecine légale, à l'école de Médecine
de Paris, trésorier de la même Ecole, Membre de
plusieurs Sociétés savantes, nationales et étrangères.

TOME I.

A. — G.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE F. DUFART

1808.



AVERTISSEMENT.

Si jamais, un ouvrage, pour être bien connu et bien jugé, a besoin d'une table alphabétique et raisonnée des matières, et même des auteurs, c'est sans contredit celui qui traite de tous les objets qui ont rapport aux trois règnes de la nature. Cette table complète manque à ce qu'a écrit Buffon. Combien elle est encore plus nécessaire à l'édition que publie aujourd'hui M. DUFART, et qui renferme, non seulement tout le texte de Buffon, mais encore les parties de l'histoire naturelle qu'il n'a pu traiter, et qui l'ont été par des Naturalistes très-instruits et très-initiés dans les mystères de la nature.

Comment, sans une pareille table, se livrer à l'étude et à la recherche des objets presque innombrables, contenus dans cent vingt-quatre volumes *in-8°*? Elle seule peut donc faciliter et rendre profitables cette étude, cette recherche. Elle seule peut

*

vj A V E R T I S S E M E N T.

guider les pas et assurer la marche de l'homme studieux qui desire parcourir tous les détours, tous les circuits de ce labyrinthe obscur, dont il ne peut découvrir les issues que par le secours de la table alphabétique qui les lui dévoile. Je l'ai entreprise cette table, aussitôt que la première livraison de la nouvelle édition a été délivrée aux Souscripteurs. Je communiquai alors mon plan à M. Sonnini, qui l'approuva, et je n'ai depuis négligé, pour sa rédaction, aucun des moyens, qui m'ont paru les plus propres à le rendre utile à toutes sortes de lecteurs. Ce plan est celui que les savans Auteurs de la table générale des matières du Journal des Savans ont suivi. Je ne pouvois, je crois, suivre un meilleur modèle.

Je savois, et je sais encore, combien un pareil travail est ingrat, fastidieux; je dirois presque ennuyeux, si on n'avoit pas en vue sa nécessité et son utilité. Il n'y a que les véritables gens de lettres qui sachent l'apprécier; en général, lors même qu'il est fait avec méthode, avec goût, il n'est pas autant estimé qu'il devrait l'être. On regarde communément celui qui s'y livre

AVERTISSEMENT. vij

comme une espèce de *manœuvre littéraire*, comme un simple compilateur, parce que, dit-on, il n'a besoin ni de génie, ni de beaucoup de connoissances, pour remplir sa tâche.

Il seroit facile de combattre avec avantage un tel préjugé, et de démontrer combien il est absurde; ne fut-ce que par les exemples d'hommes très-savans, qui ont joui dans l'empire des lettres d'une grande réputation, et qui n'ont pas dédaigné de se livrer à ce genre de travail; il doit donc être plutôt favorisé, encouragé, que mésestimé.

Mais j'ai intérêt à ne pas trop insister sur un point qui me regarde personnellement, et dont la discussion prêteroit peut-être à la malignité des armes contre moi-même. Il suffit de savoir, comme l'ont dit avant moi de grands littérateurs, qu'une table des matières est l'*ame d'un ouvrage*, la *porte d'entrée*, la *clef* qui conduit à sa connoissance, sur-tout lorsqu'il est volumineux, qu'on ne peut y pénétrer sans cette clef, ou au moins que très-difficilement, et en perdant beaucoup de tems.

viii AVER VISSEMENT.

J'ajouterai , comme une vérité , dont tout le monde conviendra , que le plus grand mérite d'une table alphabétique et raisonnée des matières , est celui par lequel elle indique jusqu'aux plus petits détails de l'ouvrage , auquel elle est destinée ; elle n'est en un mot parfaite , qu'autant qu'on y trouve , chacun à leur place , tous les mots significatifs , ou qui présentent un sens quelconque , ce qui oblige souvent l'auteur de répéter jusqu'à trois fois une même phrase , parce qu'elle renferme des mots qui ont des sens différens , et que le lecteur , qui les cherche , doit s'attendre à trouver dans la table.

Un exemple donnera l'explication nette et précise de ce que j'avance. J'ouvre ma table au premier endroit ; je tombe sur l'article *animaux* ; j'y lis : empire de l'homme sur les animaux. N'est-il pas nécessaire de répéter cette phrase à l'article *homme* ? Plus bas je lis , comparaison des animaux et des végétaux : ne faut-il pas répéter de même le mot *comparaison* à l'article *végétaux* ? enfin je poursuis et je lis encore ; rapports des végétaux et des minéraux avec les animaux. Peut-on s'empêcher de répéter cette même phrase aux articles *végétaux* et *miné-*

AVERTISSEMENT. ix

raux ? Il faut de même, que dans notre table des matières, on trouve indiquées séparément, chaque espèce de chaque classe d'oiseaux, de reptiles, de plantes, de poissons, quoiqu'elles soient déjà citées, pour la plupart, dans la nomenclature générale, appartenante à chacune de ces classes.

Voilà ce que j'ai dû faire ; voilà ce que j'ai fait ; voilà ce qui complète les tables que j'ai rédigées ; elles contiennent en outre certains articles, certains mots qui paroissent n'avoir aucun trait à l'histoire naturelle, mais que des circonstances de détail ont amenés, et qui tiennent au sujet traité.

Je pourrais rapporter plusieurs exemples à ce sujet ; je me contenterai des deux suivants. A l'article de *l'homme*, tome XX, pag. 337, une note de M. Sonnini nous apprend que l'idée d'une mutilation barbare, de la castration, a pris naissance dans la tête d'une femme, dans celle de la grande et fastueuse *Sémiramis*, qui la première a donné l'exemple de cette cruauté. Cette anecdote ne doit-elle pas tenir sa place dans la table, au mot *castration* et à celui *Sémiramis* ? N'en est-il pas de même de la sublime prière

x Avertissement.

que Buffon adresse à Dieu , tom. XXIII , pag. 369 , pour détourner les fléaux de la guerre ? N'ai-je pas dû la mentionner au mot *prière* ?

A l'égard de la table des auteurs , également analytique et raisonnée , qui est à la fin du 3^{me} volume , elle étoit indispensable , tant pour faire connoître les travaux de ceux qui ont traité *ex-professo* chaque article de l'ouvrage , que pour payer le tribut de reconnaissance , dû à ceux qui ont coopéré à la rédaction de ces articles , soit directement , soit indirectement , par de simples lettres ou par des découvertes qu'ils ont faites , et qu'ils ont consigné la plupart dans le récit de leurs voyages.

Nous aurions bien désiré , tant pour abréger notre travail , que pour faciliter les recherches du lecteur , que le libraire eut pu placer , à la tête de chaque volume , un frontispice particulier qui les indiquât chacun de suite par un chiffre romain , depuis le premier jusques et compris le 124^e , ainsi qu'on l'a observé dans l'édition des œuvres de Voltaire , faite à Kell ; la rédaction de nos deux tables eut été moins compliquée ;

AVERTISSEMENT. xi

parce qu'il eut suffi alors, pour chaque article, d'indiquer, quelle que fut la matière traitée, le chiffre romain de chaque tome et celui arabe de chaque page.

Cette classification méthodique n'ayant pu être adoptée, par des circonstances particulières, il a fallu répéter, dans les grands sujets qui forment plusieurs volumes, tels que, ceux *Insectes*, *Mollusques*, *Reptiles*, *Plantes* et *Poissons*, il a fallu, dis-je, répéter à chacun le mot *histoire*, et indiquer le volume et la page où se trouvent les articles qui ont rapport à ces grands sujets. Il en faut excepter la série des soixante et quatre premiers volumes des œuvres de Buffon, qui renferment l'*histoire* de la théorie de la terre, celle des animaux, de l'homme, des minéraux, des quadrupèdes et des oiseaux. Ces soixante-quatre volumes ne sont indiqués dans la table que par des chiffres romains et les pages par des chiffres arabes, au lieu que les articles des autres volumes sont en même tems précédés du mot *histoire*, avec l'indication du sujet dont ils traitent, dans chaque article et à chaque page.

Dans une table qui présente une infinité

xij **AVER TISSEMENT**

de mot singuliers', bizarres même, tels que ceux qui appartiennent sur-tout aux insectes et aux plantes, je ne puis me flatter, quelque attention, quelque exactitude que j'aie apportées, de n'avoir pas commis quelques erreurs de nomenclature, et d'avoir corrigé toutes les fautes typographiques : la vérification m'a prouvé qu'il s'étoit glissé fort peu des unes et des autres. Au surplus, un errata, à la fin de chaque volume, fera justice des principales.

TABLE GÉNÉRALE

ET

ANALYTIQUE.

A.

ABEILLES. Leur industrie. Tom. XXI. pag. 347, 358. Leur prévoyance. 366. — Comparaison de l'abeille avec le castor. XXVI. 92. — Comment elle se nourrit. *Hist. des Insectes*. I. 115. — Description de ses organes nutritifs. 116. — Opération de la cire. 118. 119. — L'insecte apivore est son plus cruel ennemi. 187. — La teigne. *Idem*. 214. — Aiguillon de l'abeille. 262. — Son industrie dans la disposition de son domicile ; celui de l'abeille maçonne. 215. — Celui de l'abeille charpentière. 216. — Nids de feuilles qu'elles construisent. *Idem*. — Abeille qui revêt son caveau d'un superbe damas, couleur de feu. 219. — Auteurs qui ont prétendu que l'ambre gris étoit dû aux rayons de miel de l'abeille. *Hist. des Mollusques*. I. 375.

ABEILLE, *apis*. Insecte du genre des apiaires domestiques ; ex. *apis amalthea, sonora, mellifica*. *Hist. des Insectes*. III. 386. — Genre 423 des insectes de la famille des apiaires. En quoi elles diffèrent des bourdons. *Hist. des Insectes*. XIII. 404. — Les végétaux forment leur principale nourriture. 406. — Description de leurs mâchoires et de leur langue. 407. — Leur intérieur. 409. — Temps de leur récolte. 411. — Lieux qu'elles habitent naturellement. 412. — Forme des ruches, dans lesquelles on les tient. 413. — Travail des abeilles ouvrières. 414. — Construction des gâteaux. Tom. XIV. 5. — Récolte du miel. 6. — Travail des ouvrières. 7. — Cellules où doivent naître les femelles. 8. — Si elles sont privées de sexe. 12. — Formation des essaims. 13. — Moyen de les conserver. 15. — Leur composition et ceux artificiels. 27. 17. — Moyen de tirer un parti

Tab. TOME I.



avantageux des abeilles. 18. — Formation des ruches de Palteau. 20. — Leurs avantages. 24. — Ruches de Huber. *Id.* — Comment on peut y établir un essaim. 25. — Avantages très-précieux que procurent ces ruches. 28. — Comment on connoît qu'une ruche est bonne, et comment on les transporte. 30. — Ce que c'est que de les dégraisser ou tailler. 31. — Soins à prendre dans les gelées. 33. — Maladies auxquelles les abeilles sont sujettes. 34. — Durée de leur vie. 36. — Leurs ennemis. 37. — Plusieurs espèces domestiques. 38. — Différences des travaux des abeilles de l'ancien et du nouveau continent. 40. — Travail de l'abeille *amalthée* de Cayenne. *Idem.* — De celle du Bengale. 41. — Abeilles de l'ancien continent. 66. — *Voyez* APIAIRES.

ABILDGAARD (l'). 96^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons.* IX. 413.

ABLE (l'). 11^e espèce du genre des poissons appelés corégones. *Hist. des Poissons.* XII. 223. 245. — 55^e espèce du genre des poissons appelés cyprins. XIII. 90. — Sa description. 199. — On compose avec ses écailles la liqueur qu'on nomme essence orientale, en forme de belles perles. 199.

ABDUKERDAN (l'). Oiseau, espèce de spatule, décrite par Montconys. LXIV. 109.

ABOUMRAS (l'). Hirondelle de mer d'Egypte. LX. 122. — Hasselquits est le premier qui l'ait décrite. 123.

ABOUTABAK (l') ou le centropode rhomboidal. Genre des poissons osseux. *Hist. des Poissons.* VIII. 390. — Sa description. 391.

ABMCOTIER, *armeniaca*. 42^e genre des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes.* XVII. 153. — Dix espèces. 154. — Leurs propriétés. 155.

ABROMA. 30^e genre des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes.* XVIII. 210.

ABRONIA (l'). Pl. ombellifère. 4^e genre de la famille des belles-de-nuit. *Hist. des Plantes.* XI. 288. pèce connue. 289.

ABRUS. 55^e genre des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes.* XVII. 330.

ABSINTHE (l'). Voyez **ARMOISES**. *Hist. des Plantes*. XIII. 66.

ABSTRACTIONS. 1^{er} principe de génération suivant Platon. XVII. 101 et suiv. — Les difficultés qu'elles produisent dans les sciences. XXI. 219. — Leur utilité. 222.

ABUSAMF (l'). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés sciènes. *Hist. des Poissons*. X. 332 et 338.

ABUTA. 5^e genre des plantes ménispermées. *Hist. des Plantes*. XVIII. — 316.

ABUTILON, *sida*. 10^e genre des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des plantes*. XVIII. 190.

ABYSSINS (les). Peuples qui font leur pain avec la graine d'une plante appelée *téf*. XX. 247.

ACACAHOAETLI (l'). Oiseau du lac du Mexique, espèce d'alcyon ou de martin-pêcheur. LXIV. 109.

ACACIA, *mimosa*. 1^{er} genre des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*. XVII. 247. — Trois espèces. *Idem*. — Faux acacia, robinia. 58^e genre des mêmes plantes. 333.

ACAJOU, *cassuvium*. 1^{er} genre des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*. XVII. 170. — Cinq espèces. 172.

ACALOT (l'). Oiseau de l'espèce des courlis du nouveau continent. LVIII. 267.

ACANTHES (l'), *acanthi*. 8^e ordre, famille L de la 4^e classe des plantes, dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*. V. 27.

ACANTHES OU **ACANTHACÉES**, OU **ACANTHÉES** (les). Leur caractère distinctif. *Hist. des Plantes*. XV. 91. — Sect. 1. Quatre étamines didynames. 1^{er} genre. Les acanthes, leur division. 93. — Deux espèces de France. 95. — 15 espèces connues. 96. — 2^e genre. Le lépidagathis *cristata*, à crête. 97. Genre 3. Les thunbergies. 98. — Genre 4. Les barrellières. 100. — Genre 5. Les crustolles ou ruellies. 102. — Sect. 2. Deux étamines. 6^e genre. Les carmantines. 111. — 7^e genre. Les élytraires. 137.

ACANTHIAS (l'). Poisson du genre des centronotes. *Hist. des Poissons*. VIII. 403.

ACANTHIE, *acanthia*. Insecte particulier; ex. *acanthia litteralis*. *Hist. des Insectes*. III. 247. cimicides. XII. 236. — 268^e genre. Sa description. 240. — Six espèces. 242.

ACANTHINIENS (les). Poissons du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Histoire des Poissons*. X. 149. 130^e genre des poissons. 1^{re} espèce, l'acanthinion rhomboïde. XI. 166. 168 et 169. — L'acanthinion bleu et l'orbiculaire. 167. 170 et 171.

ACANTHOPHIS (les). 6^e genre des serpens appelés ophidiens. *Hist. des Reptiles*. V. 287. — L'acanthophis cérastin décrit par Merrem. 289. — Sa description. 292. — Ses dimensions. 296. — Table méthodique des acanthophis. VIII. 386.

ACANTHOPODE. Poisson du 3^e ordre de la première division des osseux. *Hist. des Poissons*. X. 152. — 139^e genre de poissons, deux espèces. Celui argenté est le boddaert. XII. 238. 239 et 240.

ACANTHOPS (l'). 28^e espèce du genre des poissons appelés holocentres. *Hist. des Poissons*. X. 365. XI. 7.

ACANTHURES (les). Poissons du 3^e ordre de la division 1^{re} des osseux. *Hist. des Poissons*. X. 152. 137^e genre des poissons. 1^{re} espèce. L'acanthure chirurgien. XI. 224. 227. — L'acanthure zèbre. 224. 231. — Celui noiraud. 225. 231. — Celui voilier. 225. 234. — Celui theutis. *Idem*.

ACARA (l'). 88^e espèce de poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*. IX. 409. — X. 137.

ACARDES (les). 108^e genre des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*. VI. 180.

ACARIDIES, *aceridiae*. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*. III. 63. — V. 200. — (et) Famille 5^e des insectes appelés chélodontes. Leur division en mites, cirons et tiques. VII. 334.

ACARNAS (les) 34^e genre des plantes composées. V. leur hist. XII. 60. — Espèce remarquable, l'acarne gommifère. *Idem*. — Espèce de France. 61. — 7 espèces connues. 62.

ACATECHILI (l'). Oiseau de l'espèce du tarin. XLVIII. 213.

ACCOUCHEMENT. Ses causes et son mécanisme. XVIII. 172. — Douleurs de l'accouchement, distinctions, leurs causes. 175. — A quelle époque de la grossesse l'accouchement a lieu. 198. — Sa cause occasionnelle. 208. — Explication de cette cause, savoir les menstrues. 211. L'action propre du fœtus y contribue aussi. 221. — Naissance de deux enfans, l'un nègre et l'autre blanc. 379.

ACCOUPLEMENT. Tentative pour unir un chien avec une louve. XXII. 405. — La production nombreuse ne dépend pas du nombre ou de la durée de l'accouplement. XXIII. 127. — Essais pour faire produire ensemble le renard et le loup. 226. — Accouplement prolifique de la mule avec le cheval. XXIX. 377.

ACCROISSEMENT du corps. Table à ce sujet. XVIII. 295. — Très-prompt. 303. — C'est à l'âge de puberté que le corps achève de prendre son accroissement en hauteur. 350. 383. — Pourquoi, dans la jeunesse, de longues maladies font plus vite grandir que l'état de santé. 367.

ACCRAUES. C'est ainsi qu'on appelle les fausses mailles ou mailles volantes, que font les mailleurs pour augmenter l'étendue de leurs filets dans un sens ou dans un autre, à volonté. *Hist. des Poissons.* II. 415.

ACÉPHALES (les). Ordre quatrième des mollusques. Leur description. *Hist. des Mollusques.* VI. 120. — Ils sont hermaphrodites. 124. — L'organe du mouvement. 126. Organe particulier, appelé le stilet de cristal. 127. — Deux sections bien distinctes. 128. — Leur coquille. 129. — Leurs divisions. 133. — Moyen de nettoyer les coquilles. 134. — Lieux qu'occupent les acéphales. 135. — Leur nourriture et leur nombre. 136. — Acéphales nuisibles. 138. — Nomenclature des termes particuliers employés dans la description des coquilles bivalves. 140. — 1^{re} section des acéphales, ceux nus. 104^e genre. L'ascidie. 157. — 105^e genre. La fodie. 163. — 106^e genre. Le mammaire. 165. — 107^e genre. Le biphore. 160. — Acéphales testacées. 108^e genre. (L'acarde), *acardo*. 180. — 109^e genre. Les radiolites. 183. — 110^e genre

Les calcéoles. 185. — 111^e genre. Les comes. 187.
 — 112^e genre. Les dicérates. 195. — 113^e genre.
 Les corbules. 199. — 114^e genre. Les gryphées. 202.
 — 115^e genre. Les huitres. 208. — 116^e genre. Les
 spondyles. 228. — 117^e genre. La plicatule. 234. —
 118^e genre. La placune. 236. — 119^e genre. L'a-
 nomie. 239. — 120^e genre. Les cranies. 243. — 121^e
 genre. Les peignes. 245. — 122^e genre. Les limes.
 255. — 123^e genre. La houlette. 259. — 124^e genre.
 Les moules. 261. — 125^e genre. Les modioles. 273.
 — 126^e genre. Les jambonneaux. 278. — 127^e genre.
 Les avicules. 286. — 128^e genre. Les marteaux. 300.
 — 129^e genre. Les vulselles. 303. — 130^e genre.
 Les pernes. 305. — 131^e genre. Les crénatules.
 308. — 132^e genre. L'anodonte. 312. — 133^e genre. Les
 mulettes. 317. — 134^e genre. Les égéries. 324.
 — 135^e genre. Les vénus. 328. — 136^e genre.
 Les cythérées. 336. — 137^e genre. Les vénéricardes.
 339. — 138^e genre. Les cardites. 342. — 139^e
 genre. Les paphies. 346. — 140^e genre. Les
 mactres. 360. — 141^e genre. Les lutraires. 353. —
 142^e genre. Les capsés. 355. — 143^e genre. Les do-
 naces. 357. — 144^e genre. Les tellines. 362. — 145^e
 genre. Les cyclades. 366. — 146^e genre. Les lucines.
 371. — 147^e genre. Les ongulines. 374. — 148^e genre.
 Les bucardes. 375. — 149^e genre. Les isocardes.
 381. — 150^e genre. Les hiatèles. 385. — 151^e genre.
 Les tridagnes. 387. — 152^e genre. L'hippope. 390.
 — 153^e genre. Les trigonies. 392. — 154^e genre.
 Les arches. 395. — 155^e genre. Les cucullées. 400.
 — 156^e genre. Les pétoncles. 404. — 157^e genre.
 Les nucules. 408. — Acéphales d'une espèce parti-
 culière. 412. — 158^e genre. Les solens. 414. — 159^e
 genre. Les pandores. 419. — 160^e genre. Les san-
 guinolaires. 422. — 161^e genre. Les myes. 424. —
 162^e genre. Les glycimères. 427. — 163^e genre. Les
 érodones. 430. — 164^e genre. Les pholades. 431. —
 165^e genre. Les pétricoles. 439. — 166^e genre. La
 ruppellaire. 440. — 167^e genre. Le rupicole. *Idem*.
 — 168^e genre. Le saxicave. 441. — 169^e genre. Les

GÉNÉRALE.

7

fistulanes. 445. — 170^e genre. L'arrosoir. 449. — 171^e genre. Les tarets. 454. — 172^e genre. Les orbicules. 461. — 173^e genre. Le térébratule. 464. — 174^e genre. Les lingules. 468. — 175^e genre. Les anatifes. 470. — 176^e genre. Les balanes. 473. — 177^e genre. Les coronules. 475. — 178^e genre. Les tubicinelles. 475.

ACERA. Voyez **ERABLES**.

ACÈRES (les). Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*. III. 46. Sous-classe 3^e des insectes. Caractères auxquels on les reconnoît. VII. 96. — Leur description. 98. — Leur partage en deux ordres, les chélodontes et les solénostomes. 108. — Les chélodontes. 109.

ACERINE (l'). Espèce 15^e des poissons appelés holocentres. *Hist. des Poissons*. X. 360 et 403.

ACÉTABULE. Plante marine. 2 espèces. *Hist. des Plantes*. III. 243.

ACHE, *apium*. Genre 4 des plantes ombellifères. *Hist. des Plantes*. XVI. 259.

ACHILLÈES (les) ou mille-feuilles. Genre 155 des plantes composées. *Hist. des Plantes*. XIII. 131. — Espèces remarquables, l'achillée agérate ou l'eupatoire de Mesué. 132. — L'achillée d'Egypte est celle ptarmique ou l'herbe à éternuer. 133. — L'achillée mille-feuilles ou l'herbe au charpentier. 134. — Observations et espèces. 135. — 18 espèces de France. 136. — 47 espèces connues. 141.

ACHIRES (les). Poissons de l'ordre 3 de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poiss.* X. 155. — Ce que signifie ce mot à l'égard de quelques poissons. XI. 295. — Ils forment le genre 147; la première espèce est le barbu. 348. — Sa description. *Id.* — L'achire marbré. 348. — L'achire pavonien. *Idem.* — L'achire fascé. 349. 353. — L'achire deux lignes. 354. — L'achire orné. 350. 355.

ACHRAS. Genre 9 des plantes dites sapotiliers. *Hist. des plantes*. XVI. 203. — 5 espèces, et leurs propriétés. 203.

ACICARPHA (l'). Herse. genre 57 des plantes composées. *Hist. des Plantes*. XII. 176. — Espèce connue. 178.

ACIDES en général. Différentes espèces. IX.

419. — Comment on adoucit les acides. 426. — Les acides ne sont pas des sels. 428. — Démonstration de leur formation par le feu et l'air fixe. IV. 336. — Table des sels formés par ces acides. IX. 437. — Les acides n'agissent que par le feu qu'ils contiennent. XI. 370. — Effet des acides sur le mercure. XII. 69. 72. — Des acides; classe 5^e des minéraux, et de leurs différentes espèces. XVI. 192.

ACIDE aérien. Acide primitif. IX. 419. 449. — Où il réside. 421. — Ses effets sur les végétaux. 425. C'est, après le feu, le seul agent de la nature. 431. — Sa saveur. 440. — Tous les acides tirent de lui leur origine. 441. — Idées de M. Landriani sur cet acide. 444. — Ses différens effets. X. 10. — Autres effets. 61. — Il est le principe du sucre. 71.

ACIDE animal ou des animaux : il appartient aux végétaux comme aux animaux. IX. 426. — Il est produit par l'acide aérien. X. 65. — Propriétés des acides des animaux. X. 72.

ACIDE des végétaux. Les acides végétaux et les acides animaux, quoique les mêmes, ont encore des différences entr'eux. IX. 427. — Ils sont produits par l'acide aérien. X. 65. — Sur ceux du vinaigre et du tartre. 66.

ACIDE formique. Ce que c'est. *Hist. des Insectes*. I. 264.

ACIDE marin. IX. 420. — En quoi il diffère de l'acide vitriolique. X. 88. — L'acide marin ne se concentre pas aussi aisément que le nitreux et le vitriolique. 165. — Sublimé corrosif dans l'acide marin. XII. 78.

ACIDE méphitique. Ce que c'est. X. 66.

ACIDES minéraux. Ils contiennent de l'huile, contre l'assertion de Macquer. LVIII. 202.

ACIDE nitreux. À quel règne il doit être rappelé IX. 440. — Sa comparaison avec les acides, X. 168. — Son action sur presque tous les métaux. 170. — Il provient de l'acide aérien. 171. — Acide nitreux dans la craie. 183. — Il n'attaque que très-peu l'or, et ne le dissout point. XI. 10. 67.

GÉNÉRALE.

9

ACIDE oxalin, ou sel essentiel d'oseille. X. 68. (note.)

ACIDE phosphorique. Ce que c'est. IX. 425. — Ce que les chimistes entendent par cet acide. X. 75. — Expérience de M. Brongniard sur cet acide. — 74. Il est tout formé dans les animaux. 75. — C'est l'acide le plus actif qu'on tire des animaux. 90.

ACIDE sulphureux. Ses effets. IX. 476.

ACIDE vitriolique. Ses combinaisons. X. 12. 47. — S'il est l'acide primitif. 55. — Il domine dans tous les plâtres. VIII. 356. — C'est l'acide vitriolique qui forme le soufre avec le feu fixe. IX. 391. — Principes de Sthal sur ce sel. 422. — Comment on l'adoucit. 426. — Ses caractères. 451. — Exemple de celui formé par la nature seule. 453. — Ses variétés. 475.

ACIER. Manière de le faire sans fer. IV. 92. — Conversion du fer en acier. X. 384. — Deux sortes d'acier. 387. — Manière de le faire avec la fonte du fer, par la cémentation. 388. — Extrait d'expériences faites à ce sujet. 393. — Fers qui produisent les aciers les plus fins. 397. — Ce qu'on appelle de l'acier boursoufflé. 402. — Quels sont les éléments qui causent le changement du fer en acier. 404. — Effets de la trempe sur l'acier. 406. — L'acier trempé est très-dur et très-cassant. 412. — Comment on le polit. 413. — Ce que c'est que l'acier sauvage. 414. — Mines d'acier de Perse. 415. — Manière de damasser l'acier. 416. — Ses principales propriétés. 422.

ACINTLI (l'). Espèce 6 de la poule sultane. LIX. 258.

ACIPENSÈRE (l'). Structure particulière de ce poisson pour se procurer sa nourriture. *Hist. des Poissons*. 207. (note). Genre 9 des poissons abdominaux qui ont deux nageoires sur le ventre. 4^e esp. IV. 329. — Acip. esturgeon. 1^{re} esp. 331. Descript. générale des acip. *Id.* — Le schypa. esp. 2. 333. — L'ichthyocolle. esp. 3. 355. — Le sterlet. espèce 4. 376. — L'étoilé. espèce 5. 383.

ACISANTHÈRA. Genre 9 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*. XVII. 30.

ACENA. Genre 11 des rosacées. *Idem*. 104.

ACORO (l'). Coq de Madagascar. *XLI.* 182.

ACOLCHI (l') de Seba. Oiseau d'Amérique. *XLV.* 123.

ACONIT. Genre 17 des plantes dites renonculacées. *Hist. des Plantes.* XVIII. 344. — Espèces 5. 345. Leurs propriétés. 346.

ACONTIAS. Nom donné à plusieurs espèces de serpents ophidiens. *Hist. des Reptiles.* VI. 159.

AÇORES (les). G. 12 des plantes aroïdes. *Hist. des Plantes.* — VII. 445. Espèce remarquable. 446. — Espèces connues. 448.

AÇORES. Oiseaux qui sont en grand nombre dans les îles qui portent le même nom. *LXIV.* 128.

ACOTYLÉDONES. Notions sur ces plantes. *Hist. des Plantes.* III. 32. — Leurs caractères. 34. — Plantes sans cotylédons, sans feuilles et sans organes sexuels apparents. classe 1 des familles naturelles des plantes, et divisée en champignons, en algues et en hépatiques. IV. 17. *Voyez ces mots.*

ACOUPA. Espèce 7 du genre des poissons appelés chéilodiptères. *Hist. des Poissons.* IX. 325.

ACOUROA. Genre 87 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes.* XVII. 377.

ACRIDOPHAGES ou mangeurs de sauterelles. Peuple des déserts de l'Éthiopie, réduit à vivre de sauterelles; ce qui s'ensuit. XVIII. 41. *Idem.* XX. 250. — Le houhou, oiseau d'Égypte, est aussi acridophage. LIV. 23. Nom qu'on a donné aux mangeurs de criquets ou sauterelles. *Hist. des Insectes.* XII. 140.

ACROCHORDE (l'). Genre 23 des reptiles ophidiens. Description générale. *Hist. des Reptiles.* VII. 388. — L'acrochorde de Java. 390. — Tableau méthodique des acrochordes. VIII. 424.

ACROSTICHUM AUREUM. Espèce de fougère. Ses différentes coupes. *Hist. des Plantes.* I. 373.

ACRYDIENS, *acrydiana*. Espèce directe. *Hist. des Insectes.* III. 280. — *Idem.* V. 281. — Famille 43. Caractères qui les distinguent, et leur division en pneumore, truxale, criquet et tétrix. XII. 137.

ACTINEA (l'). Hétérophylle. Genre 96 des plantes composées. V. leur histoire. XII. 301. — Une espèce connue. 302.

GÉNÉRALE.

II

ACTIONS Humaines, toutes relatives à la société.
XXXV. 50.

ACTŒA. V. CHRYSOPHORIANE.

ADAM. Peinture de son état après sa création. XX.
50.

ADANSONIA. Arbre immense d'Afrique. *Hist. des Mollusques*. II. 381. — Il y a de ces arbres qui ont plus de cinq mille ans de vétusté. 382. — V. BAOBAB.

ADELE, *adela*. Insecte, espèce de papillon; ex. *alacita reaumurella*. *Hist. des Insectes*. III. 417.

ADELIA. Genre de la famille des jasminées. *Hist. des Plantes*. XV. 193.

ADELIES (les). Genre 14 des plantes dites euphorbes. *Hist. des Plantes*. IX. 372. — Espèces connues. *Id.*

ADENANTHES (les). Genre 3 de la famille des protées. *Hist. des Plantes*. XI. 207. — Espèces connues. 208.

ADENOSTEMMES (les). Genre 130 des plantes composées. *Hist. des Plantes*. XIII. 49. — 2 espèces connues. 50.

ADEPTE. V. ALCHIMIE. Pierre philosophale.

ADIANTHUM. V. CAPILLAIRE.

ADIMAIN ou la grande brebis du Sénégal. XXIX.
274.

ADIPOCIRE. Dénomination donnée par Fourcroy au blanc de baleine. *Hist. des Cétacés*. 279.

ADIVE (l'). Espèce de loup ou chien d'Asie et d'Afrique. XXIII. 232. — Ses ressemblances avec le chacal, espèce de chien sauvage. XXXIII. 168. — Sa description par plusieurs voyageurs. 170 (note). — Recherches à ce sujet. 178. — C'est le même animal que le panther des anciens. 180. — Description d'un adive. 182.

ADONANTHERA. V. CONDORI.

ADONIDE, *adonis*. Genre 7 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*. XVIII. 328. — 4 espèces. 329. — Propriétés. 330.

ADORIUMS, *adoria*. Insectes; ex. *adorium punctatum*. *Hist. des Insectes*. III. 229.

ADORIES (les). Genre 233 d'insectes de la famille

des chrysomelines. *Histoire des Insectes*. XI. 394.

ADOXA. V. MUSCATELLINE.

ADRESSE à l'académie française. XXI. 416.

ÆGLEFIN (l'). Espèce 2 des poissons osseux de la classe des gades. *Hist. des Poissons*. VI. 311. — Ses voyages et habitudes. 312. — Ses ennemis. 316. — Sa gloutonnerie et sa description. 318. — Qualité de sa chair. 319.

ÆNENGEN. Carrière près du lac de Constance, qui renferme beaucoup d'empreintes ou images de poissons. *Hist. des Poissons*. I. 402. (note). — Ce qu'a écrit sur cette carrière M. Saussure. *Idem*.

ÆRIDES (les). Genre 22 des orchidées. *Hist. des Plant*. IX. 255. — L'aéride odorante. 257. — L'aéride fleur de l'air ou araignée. 258. — L'aéride émue. 259. — Espèces connues. 260.

ÆRNES (les). Genre 3 des amarantes. Espèces connues. *Hist. des Plant*. XI. 258.

ÆSALES (les). Genre 118 des insectes. 1^{re} espèce de la dix-septième famille, les lucanides. *Hist. des Insectes*. X. 236. — Celui scarabéide. 237.

ÆSCHINOMÈNE, *agaty*. Genre 81 des plantes légumineuses. *Hist. des Plant*. XVII. 371. — 2 espèces.

ÆSHNE, *æshna*. Insecte du genre des libellulines; ex. *æshna forcipata*. *Hist. des Insectes*. III. 286. — Genre 305 de la famille des insectes appelés libellulines. En quoi ils diffèrent des agrions. XIII. 5. — 5 espèces. 6. — Variétés. 9.

ÆFFAISSEMENS. Ils sont la cause de ces larges ouvertures, de ces coupures qu'on trouve dans les rochers et dans les montagnes. I. 140. — Ils sont produits souvent par des tremblemens de terre. 146.

ÆFFINITÉS chimiques. Les chimistes les ont adoptées sans les comprendre. IV. 285. — Ce que c'est. 286. — Affinités, cause des précipitations chimiques. 339.

ÆFRIQUE. Ce qui pourroit arriver si on coupoit l'isthme qui sépare l'Afrique de l'Asie. I. 133. — Son intérieur nous est inconnu. 294. 298. — Quels sont les plus grands fleuves de l'Amérique. II. 87. Description des peuples de l'Afrique. XX. 241. —

Variétés dans la couleur et la forme des Africains. 244.

AGAGÈRES. Espèce d'hommes sauvages très-habiles à la chasse des éléphants et à celle des rhinocéros. XXVIII. 128 et 333.

AGALLOCHE (l'). Genre 27 de la famille des euphorbes. Sa description. *Hist. des Plantes*. X. 30 Son bois, et autres espèces d'agalloches. 31. — Deux espèces connues. 32.

AGAME (l'), *agama*. Genre 9 des sauriens. *Hist. des Rept.* III. 333. — Section 1. Les agames à queue comprimée. L'agame sourcilleux. 336. — Ses dimensions et sa description. 338. — Sur sa crête écailleuse. 341. — 1^{re} variété de l'agame sourcilleux. 343. — Deuxième variété. 344. — L'agame occiput-fourchu. 345. — Sa description. 346. — Ce qu'en dit Seba. 347. — L'agame sombre. 349. — Ses dimensions. 350. — L'agame à bandes, de l'Inde. 352. — En quoi il diffère de l'agame sourcilleux. 353. — Beauté de ses couleurs. 355. — 2^e section. Les agames proprement dits, celui des colons. 356. — Sa description. 357. — L'agame galéote. 361. — Sa description et ses habitudes. 363. — Ses variétés. 364. 373. — L'agame ombre. 375. — Sa description. 376. — Sa couleur. 377. — Ses dimensions, et ses variétés. 378. — L'agame ondulé. 384. — Sa description. 385. — Ses couleurs. 386. — Ses dimensions. 388. — L'agame hexagone. 389. — L'agame hérissé, de la nouvelle Hollande. 391. — Deux espèces; leurs descriptions, et dimensions. 393. — L'agame arlequiné à deux raies. 395. — L'agame à gorge safranée. 398. — L'agame rose-queue. 400. — Agame rude. 402. — Agame étoilé. 404. — 3^e sect. Agames orbiculaires ou les tapayes. 406. — Leur descript. 408. — L'agame à pierreries, ou à écailles tétraèdres. 410. — L'agame plissé. 412. — L'agame du Paraguay. 414. — Ce qu'en dit Nosedá. 415. — Ses dimensions. 418. L'agame hélioscope. 419. — Agame raboteux de l'Oural. 422. — Agame à gouttelettes. 426. — Agame à oreilles. 429. — Sa descript. 430. — Ses couleurs. 431. — Variété. 432. — 4^e sect. Les agames lézardets; l'agame marbré de Surinam. 433. 5^e sect. Les agames à queue prenante. 340.

Leurs habitudes. 443. — Addition à l'article de l'agame hérissé de la nouvelle Hollande. *Histoire des Reptiles*. VIII. 317. — V. la table méthodique. *Idem*. 336.

AGAMI (l'). Oiseau des Antilles. Tom. L. 5. — En quoi il diffère du faisan, du hocco, de la poule, des grues; sa descript. 8. — Quelle est sa propriété la plus caractéristique et la plus remarq. 10 (note.) D'où provient le son singulier que rend cet oiseau. 13. — Ses habitudes dans l'état de domesticité, d'après M. Vosmaër. 16. — Son combat avec le chien. 20. — De toute l'espèce emplumée, l'agami est l'animal le plus aisé à apprivoiser. 19. 21. Notice de M. de la Borde sur cet oiseau. 33. — L'agami d'Afrique, par Sonnini. 26. — L'agami, espèce de héron de Cayenne. — LVII. 195.

AGAPANTHUS (les). Genre 9 des lys. *Hist. des Plant.* VIII. 298. — Espèce remarquable. L'agapanthe d'Afrique, ou la tubéreuse à fleurs bleues. *Idem*. — Espèces conn. 299.

AGARICUS *edulis*, ou le champignon des couches. Sa description. *Hist. des Plaates*. II. 339. — *Idem*. III. 67. 18 espèces, 59. 24 autres espèces. 68.

AGATE (l'). Celle noire d'Islande, ou pierre de gallinace. IX. 349. — C'est une pierre demi-transparente; ses qualités. XIII. 76. Elle se trouve formée en petits lits, et contient des gouttes d'eau. 78. — Quelle est celle appelée *onyx*. 80. 96. — Agate du palais de l'empereur de la Chine, longue de quatre pieds. 81. — Agates pétrifiées. 82. — Leur distinction en orientales et en occidentales. 82. — Idées des anciens sur les agates. 84. — Nuances entre l'agate, le grès et la pierre à fusil. 381.

AGATHIDIE (l'). Genre 150 d'insectes, espèce 7 de la famille. 19. Les diapériales. *Hist. des Ins*. X. 319.

AGATHINES (les). Genre 64 des Mollusques-gastéropodes. *Hist. des Mollusques*. V. 353. 4 espèces. 354.

AGATHIS. Genre 335 des insectes de la famille des ichneumonides. *Hist. des Insectes*. XIII. 175.

AGATY. V. ARESCHINOMÈNES.

AGAVÈS (les). Genre II^e de la famille des narcisses. *Hist. des Plantes*. IX. 45. — Usage qu'on en fait. 46. — Esp. remarq. l'agavé d'Amérique. 47. —

L'agavé du Mexique. 48. — L'agavé fétide. 49. —
Espèce de France. Espèces connues. 50.

AGE Quel est le plus heureux d'après Fontenelle.
XIX. 399.

AGÉNÉIOSES (les). Genre 167 de poissons 1^{re}. esp.
celui armé. *Hist. des Poissons*. XII. 91. 92. Celui
désarmé. 91. 90.

AGERATES (les). Genre 76 des plantes composées.
Hist. des Plantes. XII. 225. — Trois espèces conn. 226.

AGINEIS (les). Genre 11 des euphorbes. *Hist. des
Plantes*. IX. 366. — Espèces connues. 367.

AGLOSSE ; *aglossa*. Insecte du genre des papillons ;
ex. phalagna pinguinalis. *Hist. des Insectes*. III. 414.
Genre 446 d'insectes de la famille des phalénites.
Pourquoi ainsi nommés. XIV. 229. 214. — Leurs
chenilles. 215. — L'aglosse de la graisse. 229.

AGNANTES (les). Genre 9 des plantes dites gati-
liers. *Hist. des Plantes*. XV. 215. — Trois espèces connues.
214.

AGNEAUX. Manière de les élever ; leur castration.
XXIII. 68.

AGNEAU-CHASTE (l'). Espèce de la famille des gati-
liers. *Hist. des Plantes*. XV. 205, 206.

AGNEAU d'Israël ou *daman*. V. ce mot.

AGOUTI (l'). Espèce de lapin, ou de gros rat. XXVI.
153. — Ses habitudes. 154. — Comment on le chasse. 155.
— Sa femelle. 156. — Sa description par M. de la
Borde. 157. — Il est particulier à l'Amérique. 159. —
Observations de M. Bajon sur ses parties intérieures.
161.

AGRE, *agra*. Insecte du genre des bombardiers ; *ex.*
agra ænea. *Histoire des Insectes*. III. 86. — 15^e
genre des insectes coléoptères. Leur description. VIII.
256. Espèce 1, l'agre bronzée. 2, la rufipède. 257.
— 3, l'acuminée. 258.

AGRION, *agrion*. Insecte du genre des libellulines ;
ex. agrio virgo. *Hist. des Insectes*. III. 287. Genre
307 des insectes dits libellulines. 2 espèces. XIII. 15.

AGRIPAUMES ou cardiaques (les). Genre 34 des
plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*. XV. 361. — 2
espèces de France. 362. — 6 espèces connues. 363.

AGRIPEENNE (l'), ou l'ortolan de riz. Ses voyages. XLIX. 47. — Plumage des femelles. 48. — Ses variétés. 50.

AGROSTEMNA. V. NIELLE.

AGROSTIS (les). 20^e genre des graminées. *Hist. des Plantes*. VII. 155. — Espèces remarquables. 156. — Espèces de France. 158. — Espèces connues. 161.

AGUA (l'). Espèce de crapaud; sa description. *Hist. des Reptiles*. VIII. 196. 209.

AHU. 4^e espèce de gazelle, décrite par Olearius. XXX. 270.

AI (l'). Animal du Brésil. Pourquoi on lui a donné l'épithète de paresseux. XXXII. 127. — Sa description et ses différences avec l'unau. 129. — Il offre l'image de la misère innée. 133. — Réflexion sur sa lenteur à marcher. 134. — Preuve de son insensibilité physique. 140. — Expérience qui prouve qu'il est vivace. 141. — Pays qu'il habite. 142. — Ce que dit M. de la Borde de ce quadrupède. 145.

AFRIE (l'). de la Cochinchine. 7^e genre des chèvre-feuilles. *Hist. des Plant.* XIV. 148. — Espèce conn. 149.

AIGLES (les) en général. Sur la hauteur à laquelle ils s'élèvent dans l'air. XXXVII. 55. 225. — 11 espèces en Europe, dix au Brésil, une en Afrique et la dernière aux grandes Indes. 206. — Il faut réduire à six, les onze espèces d'Europe, et de ces six trois seulement doivent conserver le nom d'aigles; savoir, l'aigle doré ou grand aigle, l'aigle commun ou moyen, et l'aigle tacheté ou petit aigle. Les trois autres sont l'aigle à queue blanche ou pigargue, l'aigle de mer ou balbuzard, et le grand aigle de mer ou l'orfraie. Différences entre ces espèces. 208. — L'aigle est plutôt un oiseau des pays froids que des climats chauds. 220. (note.) — Ses convenances physiques et morales avec le lion. 221. — Son haleine. 223. — On s'en sert pour la chasse. 224. — Son nid. 226. V. LE GRAND AIGLE. — Les aigles habitent la terre ferme dans les deux continents. 258. — Leur aversion pour le pain. 258. (note.) — Description anatomique de leurs parties intérieures. 259. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux aigles.

GÉNÉRALE.

17

330. — Notes sur les pontes des aigles. **LX.** 335.

AIGLE (l') à dos noir, par Sonnini. **XXXVIII.** 7.

— Sa description par Brown. 8. — Le petit aigle moucheté de blanc. 9. — Lieux où on le rencontre. —

— L'aigle de la Chine. 12. — L'aigle du Japon. 15.

— L'aigle de Java. 19.

AIGLE blanc. (Observations de Sonnini sur l').

XXXVII. 323. — Albert le Grand est le premier qui en ait parlé. 325. — Il n'est point une variété du grand aigle. 324. — C'est le même que l'aigle blanc de la Louisiane, 326.

AIGLE (l') commun. **XXXVII.** 231. — Ses différences avec le grand aigle. 233. — Comparaison de l'aigle blanc et de l'aigle noir. 234. — Lieux où se trouve l'aigle, commun. 236. 247. — Énumération des dissimilitudes qui se trouvent entre eux. 244. — Détails intéressans sur cette espèce d'aigle et sur l'identité d'espèces de l'aigle brun et de l'aigle noir, par Sonnini. 244. — Leurs habitudes naturelles. 246. — Phénomène particulier à l'aigle commun. 247. — Variétés de l'aigle commun. 248.

AIGLE (l') d'Astracan. Sa description par Sonnini. **XXXVIII.** 5. — L'aigle couronné. Ses différens noms. 20. — Ses caractères propres et spécifiques. 22. — Sa description, par Edwards. 23. — Lieux où il se trouve. 24. — L'aigle noir huppé d'Amérique. Sa description. 29. — L'aigle destructeur, par Sonnini. 40. — Sa description. 41. — Ce n'est point un aigle pêcheur. 45.

AIGLE (l') de Gottingue, par Sonnini. **XXXVII.** 377. — Sa description. 378. — L'aigle moyen de la Guiane. **XXXVIII.** 53. — On en a fait un autour. 55. — Le petit aigle de la Guiane. 58. — Sur ses habitudes. 59. — Sa description par Mauduyt. 60. L'aigle plaintif, de la Terre-de-Feu. 83.

AIGLE (l') des grandes Indes, **XXXVII.** 330. — Détails sur cet oiseau de proie. 332. — L'aigle de Monte-Video. **XXXVIII.** 81. — L'aigle des États. 86. — L'aigle à ventre blanc. 87. — L'aigle à joues noires. 89.

ab. Tome I.

B

AIGLE (le grand) ou l'aigle doré, le plus grand de tous les aigles. XXXVII. 212. — Ce qu'en dit M. Hebert 214. — Sa description, 215, 225. — Pays qu'il habite. 216. — Ses convenances avec le lion. 221. — Son haleine. 222. — On s'en sert pour la chasse. 224. 256. — Son nid. 226. — Durée de sa vie, 228. — Le grand aigle de la Guiane. C'est le plus grand aigle commun. XXXVIII. 33. — Sa descript. par Sonnini. 35.

AIGLE (le petit). XXXVII. 250 — Sa description, 252. — Lieux où on le trouve. 253. — Ce qu'en dit Chardin. 254. (note). — Particularités sur cet aigle. 255 — Observ. de Sonnini sur l'oiseau que Buffon a appelé petit aigle d'Amérique. XXXVIII. 63. — L'aigle de la nouvelle. Hollande. 91.

AIGLE (l') de mer. Hist. d'un nautille papiracé qu'il a enlevé dans les airs. *Hist. des Mollusques*. III 162.

AIGLE (l') de mer. Espèce 7 du genre des poissons, appelés chéilodiptères. *Hist. des Poissons*. XIII. 203.

AIGREMOINE. Genre 12 des plantes rosacées. *Hist. des Plantes*. XVII. 105.

AIGRETTE (l'). Espèce de singe de la nature des babouins. XXXV. 304. — Pourquoi ainsi nommé. 306. — Ses caractères distinctifs. 309. — L'aigrette des Indiens. XLV. 15.

AIGRETTE (l'). Espèce 7 du genre des hérons. LVII. 160. — Grand usage que l'on fait de ses plumes soyeuses. 161. — Leur composition. 162. — Lieux où se trouve l'aigrette. 164. — La grande aigrette de Cayenne. 183. — Différences des habitudes de la grande et de la petite. 184. (note).

L'AIGRETTE ROUSSE. Espèce 2. LVII, 187. — La demi-aigrette. Espèce 3, 188.

AIGUE-MARINE. Espèce de cristal. XII. 386. — Lieux où on le trouve. 387.

AIGUILLAT (l') Espèce 24, sous-genre 3 des squales. Sa nomenclature. *Hist. des Poissons*. IV, 100. — En quoi cette espèce est particulièrement remarquable. 101. — Mers qu'il habite. 102. Sa description. 103. — Ses piquans. 104 (note) — Note sur ses habitudes, par Sonnini. 105.

GÉNÉRALE.

19

AIGUILLE aimantée. Sa direction. III. 263. — Ses variations. XIV. 344. — Sa déclinaison, et son inclinaison. 371. 384. — Son action différente. 449. — Les Français sont les premiers qui aient fait usage de cette aiguille. XV. 25. — Faits et notes sur sa déclinaison. 26 et suiv. — D'où dépendent les variations à cet égard. 40. — Observations pour déterminer la véritable déclinaison, de l'aiguille aimantée. 47. — Causes des variations. 50. — De son inclinaison. 55. — Lieux où cette inclinaison est réelle, et ceux où elle est plus marquée. 59. — Sur les bandes sans déclinaison. 61. — Variations, à cet égard. 65. — Table de la déclinaison, des aiguilles aimantées. 103. 284. — Tables sur leur inclinaison, dans les derniers tems. 244. *Id.* XVI. 5. — Nouvelles tables sur sa déclinaison, par Sonnini. 44. — Explication des cartes magnétiques. 55. — *V. AIMANT, BOUSSOLE, FER.*

AIGUILLE DE MER (l'). Espèce de poisson du genre des syngnathes. *Hist. des Poissons.* V. 225. — Sa synonymie. *Idem.* — Espèce 5 du genre des poissons appelés sphyrènes. XII. 321. 326.

AIGUILLON. Celui des insectes, et liqueur venimeuse qui l'accompagne. *Hist. des Insectes*, I. 262. — D'où vient cette liqueur. 263. — Précautions à prendre pour s'en garantir. 265.

AIGUILLONS (les) dans les plantes. Ce que c'est. *Hist. des Plantes.* I. 296. — Leurs dispositions. 297. — Leur formation. 298. — Résultats à cet égard, et leurs usages. 301. — Leurs divisions. II. 150.

— *AIL. V. AULX.*

AILES. Observ. sur celles des insectes. *Hist. des Ins.* I. 244. II. 75. 158. — Son que certains insectes font entendre pendant leur vol. 159. — Des ailes vaginales. 163. — Nombre des ailes, etc. 169. — Ailes lépidoptères ou farineuses. 171. — Leurs couleurs. 174. — Nervures des ailes. 179. — Ailes gymnaatères. 180. — Appendices alaires. 181. — Rem. sur les ailes des oiseaux. LXII. 378. — Comparaison entre l'aile de l'oiseau et la nageoire du poisson. *Hist. des Poissons.* II. 228. 229.

AIMANT (l'). Montagnes d'aimant. III. 262. — Celle de Sibérie chez les Baschkires. IV. 85. — Effets de l'ai-

B 2

mant sur le platine. V. 172. — Son action sur le fer et des pierres d'aimant. X. 235. — En quoi diffèrent les masses d'aimant des roches de fer. 237. — Propriétés de l'aimant et idées des anciens sur ce minéral. XIV. 337. — Comparaison des forces magnétiques et électriques. 338. — Sur les poissons électriq. 347. — Usage des deux forces électrique et magnétique pour la guérison de plusieurs maux. 352. — Rapport sur les travaux à ce sujet de l'abbé le Noble. 353. — Sur l'identité des forces électrique et magnétique. 365. — Phénomènes de la direction de l'aimant. 369. — Sa déclinaison et son inclinaison. 371. — Sur les pôles magnétiques. 373. — Remarques sur les observations magnétiques. 375. — Expériences sur l'aimantation, par M. de Rozières. 379. — Causes qui peuvent changer la direction de l'aimant. 386. — De la nature et de la formation de l'aimant, et son étymologie. 391. — Son affinité avec les mines de fer. 394. — Formation des premiers aimans. 395. — S'il circule dans l'aimant une matière particulière. 398. — Système des physiciens au sujet des tourbillons autour de l'aimant. 402. — Sur les blocs d'aimant. 405. — Lieux où se trouvent ses mines. 408. — De l'attraction, et de la répulsion de l'aimant. 411. — Effets de ses forces sur le fer. 415. — Expériences à ce sujet, et sur l'action du fer. 416. — Comment on augmente la force attractive de l'aimant. 434. — Quels sont les meilleurs aimans. 437. — Répulsion dans l'aimant. 438. — Divers procédés pour produire et compléter l'aimantation du fer. XV. 5. — Des aimans artificiels. Procédé de M. Epinus. 12. — Expérience avec les aimans artificiels. 21. — De la direction de l'aimant et de sa déclinaison. 24. — Bons effets de l'application de l'aimant dans les maladies nerveuses, et addition au traité de l'aimant par Sonnini. 76. — Usages qu'en faisoient dans ce sens les anciens. 77. — Nouvelle preuve de sa force directive vers les pôles; découverte due à la France. 79. — Théorie des Chinois sur l'aimant. 91. — Cartes magnétiques avec leurs explications. 55. *Voyez AIGUILLE AIMANTÉE, BOUSSOLE, FER, MAGNETISME.*
 - AINARDS. Petites ficelles qui servent à la fabrication

des filets des pêcheurs. *Hist. des Poissons*. II. 383. — Comment on les fait. 384.

AIR. Les mouvemens de l'air dépendent principalement de la chaleur du soleil. II. 270. — Cause des courans contraires dans l'air. 284. — Faits et réflexions qui prouvent que l'air, quoique compressible, est également dense à toutes hauteurs. 287. — Son épaisseur totale. 289. — Conche de l'atmosphère à l'entour de la terre. 290. — Ce qui en résulte. 291. — Prodigieux effets de la séparation de l'élément de l'air et de l'élément de l'eau. III. 280. — L'air est le premier aliment du feu. IV. 236. 240. — Sa fluidité. 238. — Effets de la chaleur sur l'air. 239. — Matières qui s'enflamment et se consomment sans le secours de l'air renouvelé. 241. — Effets réciproques de l'air et du feu l'un sur l'autre. 244. — Qualités de l'air. 290. — Ses connexions avec le feu, et ce qui en résulte. 291. — Effets de la chaleur des animaux sur l'air. 293. — Effets de celle des végétaux. 294. — L'air contribue lui-même à cette chaleur. 296. — Sur la grande quantité d'eau contenue dans l'air. 319. — L'eau est pour l'air ce que celui-ci est pour le feu. 321. — Il entre comme principe dans la composition de tous les sels. 333. Il est encore plus fluide que le mercure. VI. 41. — Rapport de la pesanteur du feu à celle de l'air. 60. — Son action sur les pierres à fusil et sur les cailloux. XIII. 388. 389. — Différentes modifications de l'air. *Hist. des Mollusques*. I. 102. 103. — Influence de l'atmosphère sur les végétaux. *Hist. des Plantes*. I. 329. 330. — Ce qu'il produit sur l'enfant qui vient de naître. XVIII. 256. — La qualité de l'air peut influer sur la durée de la vie. XIX. 20. — L'air de Moscovie. XX. 237. — L'air est une des causes qui rendent l'instinct de l'oiseau différent de celui des quadrupèdes. XXXVII. 54. — Idées physiques d'Homère, 22^e livre de son *Odyssée*, sur l'effet de l'air sur les poissons hors de l'eau et entassés sur un sable aride. *Hist. des Poiss.* I. 382 (note). — Expériences sur la tanche pour reconnoître combien il y a d'air dans tout le corps des poissons, et combien cet air est nécessaire. II. 176. — La même expérience sur une carpe. 174. — Autres expériences qui prouvent que

l'air mêlé avec l'eau, a la principale part à la respiration des poissons, 175.

AIR fixe. IX. 173. 187. — Il est le premier principe salin. 419. — Il est l'acide primitif. 449. — Rôle que lui font jouer les chimistes IV. 308. — Air fixe des minéraux. Air fixe considéré sous la forme élastique, et sa comparaison avec l'eau et la terre. 314.

AIR inflammable. Ce que c'est XIV. 22.

AIRAIN de Corinthe; ce que c'étoit. XI. 238. — Sur l'airain, ou le bronze. 242.

AIRELLE, ou MIRTILLE. Genre 14 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*. XVI. 243. — Cinq espèces et leurs propriétés. 244.

AIZOON. Genre 4 des plantes dites ficoïdes. *Hist. des Plantes*. XVI. 381.

AJUGA. V. BUGLES (les).

AKIS, *akis*. Genre des insectes pimélaires; ex. *akis reflexa*, *collaris*. *Hist. des Insectes*. III. 168. — Genre 128 d'insectes. 6^e espèce de la 18^e famille, les piméliaires, quatre espèces. *Hist. des Insectes*. X. 267.

AKOUCHI (l'). Espèce de lapin, qui diffère de l'agouti en ce qu'il a une queue. XXVI. 162. — A Cayenne, on appelle l'agouti le lièvre, et l'akouchi le lapin. 164.

AKPA (l') des Groenlandais. Oiseau de l'espèce des pingouins. Sa description. 72. 411 (note).

ALABASTRITE. Espèce d'albâtre. XVI. 223.

ALAGTAGA. 3^e espèce de gerboise. Sa description. — XXXII. 245. Son habitation et ses habitudes. 296. — Trois principales variétés dans l'alagtaga. 302. — Particularité anatomique de cet animal. 305.

ALANGIUM. V. ANGOLAN.

ALAPI (l'). Espèce de fourmillier. XLIX. 374.

ALATÈRE. Genre 16 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*. XVII. 228.

ALATLI (l'). 2^e grande espèce des oiseaux martins-pêcheurs du nouveau continent. LVI. 264.

ALATUNGA (l'). Espèce du genre des poissons appelés scambres. V. ce mot.

ALBATRE. Sur le véritable albâtre et celui d'Italie. — VIII. 267; Ses espèces, son poli. 268. — Il n'est pas

toujours blanc. 269. — Idée de sa formation, et tems nécessaire pour le former. 270. 280. — Sur l'albâtre oriental. 276. — Note de Guettard sur celui d'Aix. *Id.* — Sur celui des îles de Malte et de Goze. 277. — Décomposition des albâtres. 282. — Pourquoi ils ont quelque transparence. 285. — Autre espèce. 287. — Sel dans l'albâtre. 314. — Remarques sur l'albâtre. XVI. 219. — De l'alabastrite. 223.

ALBATROS (l'). C'est le plus gros des oiseaux d'eau. LXII. 322. — Attributs qui le distinguent. 323. — Sa corpulence l'a fait appeler mouton du Cap. 324. — Sa description. *Idem* et 326. — Comment on le prend. 327. — Lieux où on le trouve. 329. 335 (note). — Son vol. 332 (note) — Variétés. 333. — Note sur les albatros, par Sonnini. 335. 339. — Celui bleu noirâtre à bec jaune, par Sonnini. 341.

ALBATROSSES (les). Oiseaux de la mer Glaciale. LX. 321.

ALBOURS (le mont). Farnoux volcan d'Asie, auprès du mont Taurus. II. 412.

ALBUCA (les). Genre 16 des plantes dites Aphodèles. *Hist. des Plantes*. VIII. 359. — Espèces connues. 361.

ALBULE (l'). Espèce 2 du genre des poissons appelés muges. XII. 383. 390.

ALBUMEN (l'). C'est la nourriture de la première enfance des plantes. *Hist. des Plantes*, I. 121. — Sa description et sa division. II. 114.

ALBUNÉE, *albunea*. Insecte du genre des paguriens. — *Albunea symnista*. *Hist. des Insectes*. III. 30. — Il est aussi du genre des insectes exochrates. V. 147. — Sa description. VI. 171. — Ses espèces sont toutes exotiques et sont deux, l'albunée symniste et l'albunée écussonnée. 172.

ALBURNE. (l'). Espèce 4 du genre des poissons appelés centrôpoines. *Hist. des Poissons*. X. 260 et 278.

ALBUTHECA. Espèce de melon d'eau. *Hist. des Plantes*. XIV. 286.

ALCATRAZS (les). Oiseaux petits cormorans. LXIV. 118.

ALCE. Ce que signifie ce mot, et quel animal il désigne. XXX. 95.

ALCHIMIE. XI. 55. — On ne peut rien tirer des livres d'alchimie. *Idem.*

ALCHIMILLA. V. PIED-DE-LION.

ALCINE (l') perfoliée. Genre 192 des plantes composées. *Hist. des Plantes.* XIII. 223. — Une espèce connue. 224.

ALCOS (les). Animaux domestiques, chiens du Mexique et du Pérou. XXIII. 182. — Leur description. 183. — Deux espèces. 184.

ALCYON. Nom ancien de l'oiseau appelé martin-pêcheur. LVI. 162. — Ce que les anciens entendoient par les jours alcyoniens. 163. 167. — L'alcyon est le même oiseau que le martin-pêcheur. 164. — Leur comparaison. 165. — Le tems des amours de l'alcyon. 167. 175. — Ses propriétés, et fables à ce sujet. 180. — Anecdote relative. 194 (note). On a tort d'attribuer à l'alcyon seul l'instinct de suivre les vaisseaux. 323. — V. MARTIN-PÊCHEUR.

ALCYON. Plante marine *Hist. des Plant.* III. — 254.

ALECTRE (l') du Cap. Genre 14 des plantes dites rhinantacées. *Hist. des Plantes.* XV. 78. — Une espèce connue. *Idem.*

ALEOCHARE (l'). Genre 85 d'insectes Espèce 12 de la famille II, les staphyliniens. *Hist. des Insectes.* IX. 376. — Leurs espèces. 378.

ALEPIDOTE. Nom d'un poisson osseux du genre des rhombes décrits par Linnæus. *Hist. des Poissons.* VI. 206. — Sa description. 207.

ALETRIS (les). Genre 1^{er} des plantes dites asphodèles *Hist. des Plantes* VIII. 301. — Espèces remarquables, l'alettris farineux. 302. — L'alettris odorant, et espèces connues. 303.

ALEVRITE (l'). Genre 20 des plantes dites euphorbes. *Hist. des Plantes.* IX. 404. Esp. comm. 405.

ALEYRODE, *aleyrodas*. Insecte particulier; ex. *tinea prolella*. *Hist. des Insectes.* III. 264. Espèce 2 d'insecte de la famille des aphidiens. Leur description. XII. 342. — Il y a, par an, 7 générations de ces insectes qui peuvent produire 195, 310 ou 200,000 insectes. *Id.* et 349. — Leurs habitudes. 343. — Leur description. 345. — Celui de l'éclair. 342.

ALGAËL. Espèce 7 de gazelle. XXX. 276. 334.

340. V. GAZELLE.

ALGÆ. Genre de plante marine, décrit par Tournefort 9 espèces. *Hist. des Plantes.* III. 241.

ALGUES (les), *algæ*. Leur anatomie. *Hist. des Plantes.* II. 340. — Famille des plantes dites cryptogames. III. 75. — Sect. I. Product. filamenteuses, ou gélatineuses. Fructifications cachées. Gen. 1. Bysses ou moisissures. *Id.* Esp. 76. Gen. 2. Conserve. 78. — Gen. 3. Nostoc. 81. — Gen. 4. Tremelles. *Id.* — Sect. II. Substances membranées, ou coriaces: fructifications incertaines. Genre 5. Ulve. 83. Genre 6. Fucus ou varec. 83. — Sect. III. Substances coriaces, ou crustacées. Genre 7. Cyathus. 62. Genre 8. Hypoxylon. 93. — Genre 9. Sphæria. *Id.* Genre 10. Lichen, 94. — Famille II, de la 1^{re} classe des plantes dites acotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. IV. 24.

ALIBOUFIER, STYRAX. Genre 4 des plaqueminières. *Hist. des Plantes.* XVI. 212.

ALIDRE. Nom donné à une couleuvre des Indes. *Hist. des Reptiles.* VIII. 214.

ALIMENS. Ils sont le principe des molécules organiques. XVII. 86. — Leur influence sur la durée de la vie. XIX. 402. — Peuples qui mangent de la terre pure, lorsqu'ils sont pressés par la faim. *Hist. des Reptiles.* II. 356. — Variétés des goûts de l'homme à l'égard des aliments. *Hist. des Mollusques.* II. 228. 230 et 234.

ALISIER, crataegus. Genre 6 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes.* XVII. 92. 4 espèces et leurs propriétés. 93.

ALISMES (les), ou plantains d'eau. Genre 3 de la famille des plantes dites butomes. *Hist. des Plantes.* VIII. 198. — Esp. remarqu. le plantain d'eau. 199. — Espèce de France. 200. — Espèce connue. 201.

ALKAKENCE, ou COQUERET. Genre 9 des plantes dites solanées. *Hist. des Plantes.* XVI. 62. — Ses propriétés. 63.

ALKALIS, en général. Ils doivent leur formation à la chaleur constante de l'animal et du végétal, d'où on les tire. IV. 336. — Ce sont des principes salins et non des

sels. IX. 428. — 3 sortes d'alkalis. 436. Des alkalis et de leurs combinaisons. X. 76. — Des alkalis, classés 6 des minéraux et de leurs différentes espèces. XVI. 196.

ALKALI caustique. Ce que c'est. X. 90.

ALKALI FIXE VÉGÉTAL. Ses différences avec l'alkali fixe animal ou le natron. X. 82. D'où on le tire. 84. 86.

ALKALI MINÉRAL OU MARIN. Le feu est le principe de la formation de cet alkali. IV. 336. — L'alkali minéral est le seul que la nature présente dans un état libre et non neutralisé. X. 76. — V. NATRON.

ALKALI VOLATIL (l'), ou l'eau de Luce, qui est de l'alkali volatil uni à l'huile de succin, le meilleur remède contre la morsure de serpents et des vipères venimeux. *Hist. des Reptiles*. V. 73.

ALLAITEMENT. Le lait des animaux peut suppléer à celui de la femme. XVIII. 260. Avantages de l'allaitement maternel. 307.

ALLAMANDA. Genre 18 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*. XVI. 187.

ALLANTOÏDE (l'). Si cette membrane existe dans le fœtus humain. XVIII. 180. — Sur l'allantoïde de la truie, de la jument, etc. XXII. 122. 125.

ALLELUIA ou PAIN DE COUCOU. Genre 5 des plantes geraines ou geranium. *Hist. des Plantes*. XVIII. 226. Esp. 2. 227. — Propriétés. 228.

ALLIONIA. (les) Genre 5 de la famille des belles-de-nuit. *Hist. des Plantes*. XI. 287. — Espèce connue. 288.

ALLÓPHYLLUS. Genre 18 des plantes guttiers. *Hist. des Plantes*. XVIII. 280.

ALMADEN. Bourg d'Espagne, remarquable par sa mine de mercure. XII. 20.

ALOES (les). Genre 5 des pl. asphodèles. Comment on les distingue. *Hist. des Plantes*. VIII. 308. — Forme bizarre de leurs feuilles. 309. — Leur culture. 310. — Trois extraits d'aloës. 311. — Vertus médicamenteuses de l'aloës. 312. — Esp. remarquable. L'aloës à tige bifurquée et esp. connues. 313.

ALOSE (l'). Troisième espèce des poissons appelés chupées. — Sa nomenclature et sa description. *Hist. des Poissons*. XIII. 37. — Lieux qu'elle habite, 39. — Ses habitudes. 41.

ALOUATE (l'). Esp. de singe du nouv. monde, de la famille des sapajous. XXVI. 4. — Manière de le chasser. 110. — Son adresse à panter ses plaies. 111. — Ses caractères distinctifs. 114. — Observations sur cet animal. 121. — Sur son os hyoïde. 122. — Descript. de son organe de la voix. 125. — L'alouate a les mêmes caract. que l'ouarine. XXXVI. 115. — Sa dénomination. de singe rouge à Cayenne, et de singe hurleur. 116. — Sa descript. 117. — Sa chasse et sa nourriture. 119. Sur son état de domesticité. 120. — Particularités de sa trachée-artère. *Id.* — Note particulière sur cet animal. 121. — Descript. anatomique par Camper, de l'organe de la voix de l'alouate. 123. — Rem. de Daubenton sur ses ouvertures nasales, et la description de deux. 133. — Ce qui distingue principalement l'alouate des autres singes. 134.

ALOUETTE (l') Cet oiseau a été plus anciennement répandu dans les Gaules qu'en Italie. L. 258. — Sa synonymie. *Id.* — Deux espèces connues chez les Grecs; l'une avec huppe et l'autre sans huppe. 260. — Chant de celle-ci. 261. — Sur l'antipathie de l'alouette pour la constellation *arcturus*. 263. — Principaux attributs de l'alouette. 264. — Sa descript. 265. — Particularités des mâles. 266. — Nid et ponte des femelles. 268. — Soins qu'elles prennent de leurs petits. 270. — Manière de les apprivoiser et de les nourrir. 271. — Leur manière de voler. 274. — Comment elles sont transportées en Virginie et ailleurs. 275. — Cause de leur éloignement et de leur retraite. 277. — On les trouve dans presque tous les pays habités des deux continents. 278. — Piéges dont on se sert pour les prendre; le filet d'alouette est le plus ordinaire. Sa descript. 279. — Fécondité de cette esp. d'oiseau, qualités bonnes et mauvaises de sa chair. 284. — Sa longueur et son vol. 285. Ses variétés. — 1°. L'alouette blanche, d'où elle vient, et où on la rencontre. 286. 2°. L'alouette noire. 289. Addition à ces var. de l'alouette, par Sonnini. 10. L'alouette isabelle. 291. — 20. L'alouette à longs pieds. 30. L'alouette à bec croisé. 292. — L'alouette noire à dos fauve. 294. — Le cuje-lie. 296. — La farlousé ou l'alouette des prés. 304.

— L'alouette pipi. 317. — Chant du mâle. 319. — La locustelle. 322. — La spipolette. 324. — La girole. 330. — La calandre ou grosse alouette. 333. — La cravatte jaune, ou calandre du Cap de Bonne-Espérance. 340. — Le hausse-col noir, esp. 2. 343. — L'alouette à joues brunes de Pensylvanie. 347. — Sa descript. 348. — La calandre de Sibérie. 350. — La calandre de Mongolie. 352. — Le kogou-aroure : ces deux esp. de calandres sont décrites par Sonnini. 354. — La rousseline ou l'alouette des marais. 356. — La ceinture de prêtre ou l'alouette de Sibérie. 359. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux alouettes. 1^o. La variole. 362. — 2^o. La cendrille. 364. — 3^o. Le sirli. 366. 4^o. — Le cochevis ou grosse alouette huppée. 368. — 5^o. Le lulu ou petite alouette huppée. 382. — La coquillade, esp. d'alouette. LI. 5. — L'alouette rougeâtre, par Sonnini. Oiseau qui a rapport au cochevis. 11. — L'alouette du Portugal. 13. — L'alouette huppée de la côte de Malabar. 14. — La petite alouette grise de Gingi. 16. — L'alouette de Tartarie. 18. — Autre esp. d'alouette décrite par M. Gmelin sous le nom d'*alauda mutabilis*. 20. — L'alouette d'Yelton. 22. (Toutes ces dernières esp. d'alouettes sont décrites par Sonnini.) — ALOUETTE (l') de mer. Sa descript. LVIII. 165. — Ses habitudes. 166. — Ses voyages. 167. — Lieux qu'elle habite. 168.

ALPACA. V. PACA, LAMA et VIGOGNE.

ALPES (les). Étendue des glaces dans une longueur de plus de 60 lieues sur 20 et 30 de largeur, qu'on trouve au-dessus de ces montagnes. III. 438.

ALPHÉE (l'), *alpheus*. Genre des ins. exochètes. *Hist. des Insectes*. V. 158. — Genre 26. Sa desc. VI. 245. — Esp. l'alphée avare, l'alphée tamule, l'alphée rapace. 244. — L'alphée de Malabar. 245. — Addition. 377 — Insecte du genre des homardiens, *alpheus avarus*. *Ins.* III. 33.

ALPINIES (les). Genre 7 des pl. dites balisiers. Esp. remarq. L'alpinie galanga. *Hist. des Plantes*. IX. 289. — Espèces connues. 290.

ALPISTES (les), *phalaris*. Genre 12 des graminées.

Hist des Plantes. VII. 121. — L'alpiste roseau. 122. — Espèce de France. 123. — Espèces connues. 124.

ALSINE. V. MORGELINE.

ALSTONIA. Genre 6 des pl. dites plaqueminières. *Hist. des Plantes*. XVI. 214.

ALSTROEMERIES (les). Genre 18 de la fam. des narcisses. *Hist. des Plantes*. IX. 68. — Trois esp. l'alstroemerie *pelegrina*, l'alstroemerie *pulchella*, et l'alstroemerie *ligtus* 69. — Esp. connues. 70.

ALTAVILLE (la raie). Esp. 13. V. RATE.

ALTEA. V. GUIMAUVE.

ALTISES, *alticæ*. Ins. du genre des galéruques. — *Crioceris nigricornis*; *galeruca ulmi*. *Hist. des Insectes*. III. 229. — Insecte du genre des chrysomélines. XI. 337. — Leurs larves. 338. — G. 235. des ins. de cette fam. établi par Geoffroy. XII. 5. — 31 esp. 6.

ALUCITES (les). Ins. papillon. *Hist. des Insectes*. III. 417. — Genre 435 de la famille des rouleuses; leurs chenilles, XIV. 243. — 3 espèces. 253.

ALUMINE. Esp. de pierre. XVI. 229. 230.

ALUMINITE. *Id.* 226.

ALUN. Il est le premier des vitriols à base terreuse. IX. 472. — Sa composition. X. 13. 36. — D'où il se tire. 14. 44. — Il n'y a pas de mine d'alun. 19. — Sur sa cristallisation. 20. — Alun de glace ou alun de roche. 21. 39. — Sur l'alun de la Tolfa. *Id.* Sur d'autres carrières. 22. — Mines de pierre d'alun. 25. — Ses propriétés tant pour la médecine que pour les arts. 32. — Sur ses fabriques. 33. — Usage qu'en faisoient les anciens. 38. — Travail de Chaptal sur les variétés de l'alun. 40. — Patcara, esp. d'alun. 43. — Sur l'alun de plume. 17. 31. 38. 46.

ALURNE, *alarnus*. Insecte du genre des galéruques; ex. *alarnus grossus*. *Hist. des Insectes*. III. 231. — Genre 237 de la famille des ins. chrysomélines. Celle grosse. XII. 17.

ALUYNE (l'), ou l'armoïse amère. *Hist. des Plantes*. XIII. 75.

ALVARD (mines d') en Dauphiné. VI. 126. (note).

ALVARDE (l'), ou sparthe. Genre 72 des graminées. *Hist. des Plantes*. VII. 361. — Espèces connues. 362.

ALVEOLE (l'). Espèce de pierre. Sa description. *Hist. des Mollusques*. IV. 330. 331 (noté).

ALYSIE (les). Genre 337. d'ins. de la famille des ichneumonides. *Hist. des Insectes*. XIII. 177

ALYSSON. Genre 17 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*. XVIII. 56.

AMAJOUA. *Hist. des Plantes*. XIV. 105.

AMANDES. Cellesamèresont un poison pour les poules et autres animaux. XII. 154.

AMANDIER, *amygdalus*. Genre 44 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*. XVII. 159. — 5. esp. 160. — Leurs propriétés. 161.

AMARANTHES (les), *amaranthi*. Ordre 3, famille 37 de la classe 4 des plantes dites dicotylédones. Leur description, ou leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*. IV. 286. — Famille 39 XI. 243. — Section 1. Feuilles alternes nues. Genre 1. Les amarantbes. 245. — Leurs couleurs. 246. — Leur culture. 247. — L'amaranthe tricolore, et celle à longs épis. 248. — Celle paniculée et celle bleue. 249. — Celle épineuse et esp. de France. 250. — 21 esp. conn. 251. — Genre 2. Les célosies ou passe-velours. 253. — Genre 3. Les aérées. 258. — Genre 4. Le digera des champs. 259. — Sect. 2. Feuilles opposées, nues. Genre 5. L'irésine célosie. 260. — Genre 6. Les cadetaris. 261. — Genre 7. Le pupalia hérissé. 264. — Genre 8. Les amaranthines. 265. — Genre 9. Les illecébres. 268. — Sect. 3. Feuilles opposées, munies de stipules. Genre 10. Les panarines. 270. — Genre 11. Les hermaires. 273. — Genre 12. Les anychies. 275. — Genre 13. Le lithophile mousse. 276. — Genre 14. Le polychroa. 277.

AMARANTHINES (les). Genre 8 de la famille des amarantbes. *Hist. des Plant.* XI. 265. — La compherme ou amarantbe globuleuse. 266. — 10 esp. conn. 267.

AMARYLLIS (les). Genre 5. de la fam. des narcisses. *Hist. des Pl.* IX. 15. — Esp. rem. L'amaryllis à fleurs en croix, vulgairement croix de St. Jacques, lis de St. Jacques. 17. — L'amaryllis grénésienne. 18. — L'ama

ryllis de la reine et l'amaryllis belle-dame. 19. — L'amaryllis rayée, et celle jaune. 20. — Esp. conn. 21.

AMAZONE (l'). Oiseau de l'esp. du bruant, qui se trouve à Surinam. XLIX. 95.

AMAZONES. Esp. de perroquets. LXIII. 317. — Leurs différences d'avec les autres. 318. — Leur nid et leur ponte. 320. — De tous les perroquets d'Amérique ce sont les plus susceptibles d'éducation. 323. — Hist. détaillée du perroquet amazone né à Rome en 1801. 325 (note). — L'amazone à tête jaune. 329. — Ses variétés ou esp. voisines. 331. — Le tarabé ou amazone à tête rouge. 334. — Celle à tête bleue. 336. — L'amazone jaune ou perroquet d'or. 340. — L'ourou-couraou. 342. — Ses variétés. 344. — L'amazone à capuchon jaunâtre, par Virey. 353. — L'amazone à calotte rouge par le même. 354.

AMBASSE (l'). Espèce 12 du genre des poissons appelés centropodes. X. 263. 290.

AMBAZOMBI (l'), ou poisson méchant et sorcier; nom que les nègres ont donné au poulpe colossal d'Afrique, et leurs craintes à ce sujet. *Hist. des Mollusques*. II. 279. 280.

AMBELANIA. Genre 6 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*. XVI. 186.

AMBIR (l') ou l'AURIFLAMME. Espèce 4 du genre des pois. appelés mules. Sa description. *Hist. des Poissons*. IX. 85.

AMBRE GRIS. Il paroît être un bitume. IX. 233. 244. — S'il se trouve dans le sein de la terre. 234. — Il se trouve le plus souvent dans le fond de la mer. 235. — Il est plus abondant que l'ambre jaune. 236. — Morceau extraordinaire. *Id.* — L'œux où la mer le rejette en plus grande quantité. 237. — Ambre gris d'Amérique. 239. — Son odeur. 241. — Il sert de nourriture aux cétacées. 241. — Différentes opinions sur sa nature. 243. — Temps où on le trouve en plus grande quantité. 245. — Sur l'appétit véhément de presque tous les animaux pour l'ambre gris. 247. — Il a été regardé comme d'origine animale. 252. — Remarque des pêcheurs à cet égard, sur les baleines. 254. — Pourquoi l'ambre gris renferme dans sa substance des becs de sèche. 256. —

Conclusions à tirer à ce sujet sur l'ambre gris. 258. — Lettre de M. Donadei sur ce bitume. 259. — Deux esp. 261. — Question et réponses relativement à 360 onces d'ambre gris retiré d'un cachalot femelle. 263. — Sur la fausse opinion de M. Aublet, qui prétend que l'ambre gris n'est que le suc épais et durci du cuma, arbre de la Guiane Française. 265. — Sur sa fabrication. 266. — Comment on l'éprouve. 267. — Recherche sur l'ambre gris. *Histoire des Mollusques*. I. 323. — Opinions sur son origine. 325. 370. — Examen de celle de Sonnini. 326. — Preuves tirées de plusieurs auteurs de voyages, pour faire voir que l'ambre gris n'est que l'excrément de certains cétacées. 328. — Autres preuves tirées des auteurs modernes. 346. — Extrait du mémoire du docteur Faujas de Saint-Fond, sur l'ambre gris. 348. — Ce qu'en dit Romé de Lisle. 354. — L'ambre gris se vend à Londres 24. f. l'once. 353. — Becs de sèche et d'autres mollusques coriaces qu'il contient et qu'on a pris pour des becs d'oiseaux. 356. — Différentes esp. 359. — Erreur de Rumphius; sur l'ambre gris. 363. — Ce que dit Aublet de son origine. 367 (note). — Preuve que ce n'est pas un bitume. 369. — Sur une prétendue île entièrement formée d'ambre gris. 372. — Auteurs qui ont prétendu qu'il étoit dû à des rayons de miel. 375. — C'est la seconde substance que produit le cachalot macrocéphale. Sa description. *Hist. des Cétacées*. 282. — Il se présente en boules irrégulières dont le diamètre varie. 285. — L'ambre gris renferme presque toujours des becs; ou plutôt des mâchoires de mollusques avec des taches. 286. — Différentes opinions sur sa production. 287. — Parties du cachalot, où il se trouve. 290. — Son odeur. 291. — Comment les pêcheurs connoissent que le cachalot qu'ils ont sous les yeux contient de l'ambre gris. 293. — Sur celui qui flotte sur l'Océan, ou que les vagues ont rejeté sur le rivage. 294. — Ce qu'il devient étant gardé plusieurs mois, et comment on le falsifie. 296. — Ses usages en médecine. 297, et dans le commerce. *Id.* — Sa valeur en vente. 298.

AMBRE JAUNE. V. SUCCIN.

AMBRETTE (l'). Fleur du grand-seigneur. *Hist. des Plantes*. XII. 150. AMBROISIE.

AMBROISIES (les). Genre 211 des plantes composées. *Hist. des Plantes.* XIII. 258. — Espèce remarquable; l'ambroisie maritime. 259. — Une esp. de France; 5 esp. connues, 260.

AMBROZINIE (l'), de Bassi. Genre 1 des plantes aroïdes. *Hist. des Plant.* VII. 404. Espèce connue. 405.

AME Son essence. XVIII. 236. — Son existence, 238. — Sa comparaison avec la matière. 242. — Preuves de son immatérialité. 253. — Peinture de l'ame extérieur de l'homme. 385. — La situation de l'ame peut être connue à l'inspection des changemens du visage 409. — L'ame considérée comme principe spirituel. XXI. 321. — *Voy.* ce mot. — L'ame ne réside pas dans le diaphragme, mais dans le grand nerf sympathique. XXX. 122. — L'ame réside particulièrement dans le cerveau. *Hsit. des Mollusques.* I. 210. (note). — D'où dépend l'exercice de ses actes particuliers. XXXV. 44.

AMELLES (les). Genre 200 des plantes composées. *Hist. des Plantes* XIII. 244. — 3 espèces connues. 245.

AMENLA. rocher de cailloutage. Sa description, VIII, 207 (note.)

AMENTACÉES (les), *amentaceæ*. Ordre 4, famille 28 des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes.* IV. 215. — Famille 32 des plantes. Pourquoi on les a ainsi appelées. X. 256. — Caractère abstrait de cette famille, et végétaux qu'elle fournit 258. — §. 1. Fleurs hermaphrodites. Genre 1. Le fothergil. 259. — Genre 2. Les ormes. 260. — Genre 3. Les planères. 271 — Genre 4. Les micocouliers ou celtis. 272. — §. 2. Fleurs dioïques. Genre 5. Les saules. 279. — Genre 6. Les peupliers. 290. Genre 7. Les ciriers. 309. — §. 3. Fleurs monoïques. Genre 8. Les bouleaux. 315. — Genre. 9. Les charmes. 326. — Genre 10. Les châtaigniers. 331. — Genre 11. Le hêtre, 351. — Genre 12. Le chêne. 338. — Genre 13. Les noisetiers ou coudriers. 407. — Genre 14. Les liquidambards. 411. — Genre 15. Le comptonia à feuilles de cétérach. 416. — Genre 16. Les platanes. 418. *Voyez* ces différens noms.

AMÉRICAINS. Ce sont une seule et même race

Tab. TOME I.

C

d'hommes. Raisons de cette uniformité. XX. 425. — Sur leur première origine. 431.

AMERIMNON. Genre. 80 des pl. dites légumineuses. *Hist. des Plantes*. XVII. 373.

AMÉRIQUE. Descript. des peuples de cette contrée. XX. 316. — L'Amérique septent. est très-déserte. 321. — Tableau généalogique des générations mêlées des Européens et des Américains. 407. — Leur ressemblance avec les Kamtschatkales. 414. — Leurs usages et habitudes. 425.

AMÉRIQUE méridionale. Animaux qu'elle contient. XVIII. 74. — Tableau de la zoologie des crustacées de cette partie du globe. *Hist. des Poiss.* V. 343.

AMETHISTE (l'). Esp. 3 d'oiseau mouche. LIII. 160. — L'émeraude améthiste. Esp. 13. 188.

AMETHISTÉE (l') bleue. G. 2 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*. XV. 255. — Une esp. connue. 256.

AMETHYSTE. Espèce de cristal. XII. 371. — Ses minières. 373. — Ses esp. connues chez les anciens. 375.

AMIANTE (l'). Substance talquéeuse. Ses différ. avec l'asbeste. XIII. 222. — Disposition de ses filamens. 223. — Son incombustibilité. 224. — Ses mélanges. 225. — L'art de le préparer et d'en faire usage. 230. — Manière d'en faire de la toile. 232. — Montagne d'amiante. 237. — Lieux où on le trouve. 238. Sur l'amiante. XVI. 301.

AMIANTOÏDE (l'). Espèce de pierre. XVI. 302.

AMIE (l'). Nom donné à un poisson de l'espèce des caraux. *Hist. des Poissons*. VII. 409.

AMIES (les). Genre 155 des poiss. *Hist. des Poissons*. XI. 399. — Celle chauve. 399. 400.

AMITIÉE. Attachement du chien pour son maître. XXI. 338. — L'amitié peut ne pas naître de l'ame. 339. — Elle appartient exclusivement à l'homme : le chien n'a que de l'attachement, ainsi que les femelles pour leurs petits. 340.

AMMANNIA. Genre. 13 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*. XVII. 32.

AMMI. G. 3 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*. XVI. 320. — 2 espèces ; leurs propriétés, 321.

AMMOBATE. (l') Serpent décrit par Séba. *Hist. des Reptiles.* VI. 360.

AMMODYTE (l') de Surinam. Serpent décrit par Séba. *Hist. des Reptiles.* V. 115.

AMMODYTE Fausse description qu'on a donnée de ce poisson. *Hist. des Poissons.* II. 200. — Ses écailles. 201. — Genre 33 des poissons osseux. VI. 134.

AMMONIAC (l'). XVI. 197. *Voy.* Sel ammoniac.

AMMONITE (l'), pierre découverte par Ferdinand Bayer le fils, ayant toutes les apparences d'un argonaute. *Hist. des Mollusques.* IV. 20. Knorr a aussi publié de ces ammonites qu'il regardoit comme un genre mitoyen. 21. — Superbe ammonite, dont toutes les formes rappellent assez rigoureusement celles de l'argonaute, par Knorr. 25. — Il est difficile d'assigner précisément à quel genre des nautilites ou des ammonites appartiennent les cloisons isolées des nautilites, et le lieu où est placé le siphon. 327. — Ammonite mi-partie. Sa description 302.

AMMONITES (les). Genre 8 des mollusques céphalopodes. *Hist. des Mollusques.* V. 16. — Difficultés de leur description, et la cause. 17. — Pourquoi de tous tems ces coquilles ont excité l'étonnement des observateurs. 19. — Lieux où ces coquilles se trouvent. 20. — Ammonites dont la surface est lisse. 2^e espèce, 20.

AMNIOS (l'). XVIII. 179. — Si la liqueur que contient cette membrane est une nourriture que le fœtus reçoit par la bouche. 185.

AMOMES (les). Genre des plantes dites balisiers. *Hist. des Plantes.* IX. 280. — Espèces remarquables: l'amome gingembre. 282. — L'amome cardamome et celle à grappes. 283. — L'amome graine de paradis. 284. — L'amome zédoaire; la zédoaire des pharmacies, et espèces connues. 285.

AMORPHA. Genre 56 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes.* XVII. 331.

AMOUR. Peinture de (l'). XXI. 334. — Son moral n'en vaut rien. 335.

AMPELITE (l'). Concrétion secondaire qui se forme par sécrétion dans les grandes masses de schiste ou d'argile. Minières d'ampelite. VIII. 255.

- AMPELOPSIS.** *Hist. des Plantes.* XIV. 173.
- AMPHIBIES (animaux).** *Voy. PHOQUES, MORSES et LAMANTINS, et l'Hist. des Rept.* I. 13, 25.
- AMPHIBOLE.** Espèce de pierre. XVI. 269.
- AMPHISBÈNES (les).** Genre 24 des reptiles dits ophi-diens. Description générale. *Hist. des Rept.* VII. 393.—Particularités sur ces rept. 394. — Contes bizarres qu'on fait sur eux. 397. — Remarques de Schneider sur leur anatomie. 399 — L'amphisbène blanchet. 401. — Ses variétés. 404. — Celui enfumé. 406. — Ses variétés. 408. — Tableau méthodique des amphisbènes. VIII. 425.
- AMPULLAIRES (les).** Genre 68 des mollusq. dits gas-téropodes. *Voy. leur hist.* V. 371. — 2 espèces, 373.
- AMPUTATION** singulière; sa parfaite guérison. *Hist. des Rept.* VIII. 303.
- AMSTERDAM** (la ville d'). Couches de terre qu'on y a trouvées en fouillant un puits. I. 335.
- AMYGDALOIDES.** Espèce de pierre. XVI. 323.
- AMYGDALUS.** *Voy. AMANDIER.*
- AMYGDALUS persica.** *Voy. PÊCHER.*
- AMYMONES (les).** Insectes de l'espèce des mono-cles, décrit par Muller. *Hist. des Insectes.* III. 18. — 6 espèces. L'amymone satyre. IV. 271. — L'amymone silène et celui mœnas. 272. — L'amymone saune et celui bacchante. 273. — L'amymone thyas. 274.
- AMYRIS.** Genre 12 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes.* XVII. 184. — 4 espèces. *Id.* — Leurs propriétés. 185.
- ANABASES (les).** Genre 12 de la famille des plant. dites artoches. *Hist. des Plantes.* XI. 28. — 5 espèces connues. 29.
- ANABLEPS (les).** Genre 152 des poissons : celui de Surinam. *Hist. des Poissons.* XI. 381. — Sa description, et singularité de sa conformation. 382. — Ses yeux. — 383. — Ses habitudes. 388.
- ANACA (l')** Espèce 5 de perruche ou de perroquet à queue longue et égale. XIV. 45.
- ANACAMPSUS.** *Voy. ORPIN-ROSE.*
- ANACARDE.** Genre 2 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes.* XVII. 173.

ANACICLES (les) Genre 153 des pl. composées. *Hist. des Plantes*. XIII. 115.—2 esp. de France, et 5 espèces connues. 116.

ANAGYRIS. *Voy.* BOIS PUANT.

ANALCIME. Espèce de pierre. XVI. 271.

ANALOGIE. Elle est un moyen utile pour juger les effets de la nature. XXI. 106.—Estimat. de sa valeur. 109.—Avantages de l'esprit d'analogie. *Hist. des Plant.* III. p. 26 de l'Avant-propos.

ANALYSE. C'est le seul moyen dont on se soit servi, jusqu'à ce jour, dans la science des probabilités, pour déterminer et fixer les rapports du hazard. XXI. 163.

ANANAS (les). Genre 16 de la famille des narcisses. *Hist. des Plant.* IX. 58.—Esp. remarq. L'ananas à couronne. 60.—Sa culture en Europe. 62.—Comment on le multiplie. 63.—Espèces connues. 65.

ANARHIQUES (les). Genre 37 des poisons de la classe des osseux. *Hist. des Poissons*. VI. 169.—3 esp. savoir l'anarhique loup, l'anarhique karrak et l'anarhique pantherin. *Id.*

ANARNAKS (les). Ordre 2, genre 4 des cétacées. Esp. L'anarnak groenlandais. *Hist. des Cétacées* 35.—Description de celui-ci. 252.

ANASPE, *anaspis*. Insecte du genre des mordellones; ex. *mordella ruficollis*. *Hist. des Ins.* III. 184.—Genre 174. des ins. Espèce 3 de la famille 26 des mordellones. 416.—10 espèces. 417.

ANASSER. Genre 27 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*. XVI. 196.

ANASTATICA. *Voy.* JEROSÉ.

ANATIFES. (les) Genre 175 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusq.* VI. 470.—L'anatife lisse. 472.

ANATOMIE. Méthode à suivre en anatomie comparée. Sa grande utilité. *Hist. des Ins.* I. 34.—Description de toutes les parties externes et internes de l'homme. XXI. 64.—Comment on a étudiée d'abord l'anatomie XXIV. 265.

ANATOMIE VÉGÉTALE (gravure d') exécutée d'après le tableau original déposé au Muséum national d'histoire naturelle. *Hist. des Plantes*. I, à la fin.—Fragment d'anatomie végétale. II. 337.

ANAUACES (les). Genre 80 des mollusques dits gastéropodes. *Voy.* leur histoire. V. 430. — Six espèces. 431.

ANCHOIS. Espèce 6 du genre des poissons appelés clupéés. Sa nomenclature. *Hist. des Poiss.* XIII. 46. — Comment on les apprête. 47. — Leur description. 48.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCIENS (les). Leurs connoissances en histoire naturelle. I. 50. 60. Ils voyoient mieux que nous la nature telle qu'elle est. XVIII. 343. — Sur bien des choses ils étoient plus avancés que nous. *Hist. des Moll.* I. 98 et 165. — Eloge de leurs travaux. II. 176. — Ce qu'ils savoient sur les végétaux. *Hist. des Plantes.* I. 29. — Grand cas qu'ils faisoient des poissons. *Hist. des Poiss.* I. 65 — Ce qu'ils pensoient des monstres d'Afrique. II. 77. — Noms qu'ils ont donnés aux œufs des poissons. 188.

ANCISTRUM. Genre 10 des rosacées. *Hist. des Plant.* XVII. 104.

ANCOLIS, aquilegia. Genre 18 des renonculacées. *Hist. des Plant.* XVIII. 347. — 8 espèces et leurs propriétés. 348.

ANGRE. Espèce 41 du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poiss.* IX, 389. X. 94. — D'où lui vient ce nom. 97.

ANDIRA. *Voy.* ANGELIN.

ANDRACHNÉES (les) Genre 10 des euphorbes. *Hist. des Plantes.* IX. 365. — Espèces connues. 366.

ANDARÉSES (les). Genre 1 des gatiliers. *Hist. des Plantes.* XV. 211. — 3 espèces connues. 212.

ANDREDERA. Genre 11 des arroches. *Hist. des Plant.* XI, 27. — Espèces connues. 28.

ANDRÈNE, andræna Insecte particulier. *Hist. des Ins.* III, 372. — Genre 408 des insectes de la famille des andrénètes. 4 espèces. XIII, 362.

ANDRENÈTES (les). Insecte particulier, famille 20. *Hist. des Insectes* III, 369. V, 314. — Famille 7 des insectes; leur descript. XIII, 355. — Leurs habitudes, 357. — Genre 406 des hylées, 360. — Genre 408 des andrènes, 362. — Genre 409 des halictes, 364. — Genre 410 des sphécodes, 368. — Genre 411 des nomies, 369. — Genre 411 des dasypodes, *idem*.

ANDRÉOLITES. Espèce de pierre. XVI, 265.

GÉNÉRALE.

39

ANDROMÈDE. Genre 4 des bruyères. *Hist. des Plantes.* XVI, 233.

ANDROPOGONS (les) ou BABOVS. Genre 30 des graminées. *Hist. des Plantes.* VII. 201. — Espèces remarquables. 202. — Espèces de France. 205. — Espèces connues. 206.

ANDROSACE, ou ANDROSELLE. Genre 10 des lisérons. *Hist. des Plantes.* XVI, 119. — 4 espèces, 120.

ANDROSACÉES (les). Genre 15 des lysimachées. *Hist. des Plantes.* XIV, 377. — 7 espèces de France, 378. — 10 espèces connues, 380.

ANDRYALES (les). Genre 28 des plantes composées. *Voy. leur hist.* XII. 41. — Une espèce de France. 42. — 6 espèces connues. 43.

ÂNE (l'). Son hist. Il ne paroît être qu'un cheval dégénéré; preuves. XXII. 277. — Examen de la question s'il est de la même famille, ou un animal différent. 280. — L'âne est un âne, et non un cheval. Comparaison dans son traitement avec celui du cheval. 295. — Ses qualités 296. — Il n'est pas sujet à la vermine. 299. — Son développement successif. 300. — Ses différentes races. 302. — Les ânes de l'Inde. 305. — Ceux de Maduré. 306. — Anes sauvages. 309. — Comment on chasse ceux du Pérou. 311. — Ses propriétés et usages auxquels on peut l'employer. 312. — Sur sa peau. 313. — Variétés que l'âne a subies. 339. — Son accouplement avec l'ânesse. 357. — Il a réussi en Amérique. XXV. 11. — Il n'a pu multiplier en Canada. 22. — Races d'ânes particuliers en Afrique et en Asie. XXIX. 349. — Anes particuliers. 356.

ÂNEI (l'). Espèce 107 du genre des poiss. appelés labres. *Hist. des Poiss.* IX. 149 et 290.

ANÉMONE. Genre 5 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes.* XVIII. 323. — 10 espèces, 324. — Leur culture et leurs propriétés, 326.

ANÉMONES DE MER. Leurs bras sont certainement ornés de capsules. *Hist. des Mollusques.* IV. 117.

ANET. Genre 5 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes.* XVI. 260.

ANGALA-DIAN (l'). Oiseau de l'espèce des grimperaux. LVI. 31. — Sa description, 33.

ANGELIN, ANDIRA. Genre 82 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*. XVII. 274.

ANGÉLIQUE SAUVAGE. Genre 1 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*. XVI. 255. — Ses propriétés. 256. — Genre 23 des mêmes plantes. 286. — Deux espèces et leurs propriétés. 287.

ANGELOT (l'). Espèce 34 des squales; sa nomenclature. *Hist. des Poiss.* IV. 159. — Sa description. 141. — Notice de Sonnini sur ce poisson. 143.

ANGELSLANG. Nom d'un reptile ophidien de l'espèce des orvets, décrit par Valentin. *Hist. des Rept.* VII. 295.

ANGLETERRE. Elle étoit autrefois jointe à la France. I. 356. — *Id.* III. 112. 115. — Détails sur ses charbons de terre. IX. 122.

ANGOLAN. Genre 1 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*. XVII. 58.

ANGOLI (l'). Esp. 3 de la poule sultane. LIX. 251.

ANGRECS (les) ou epidendrons. Genre 19 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*. IX. 236. — Espèces remarquables; l'angrec en coquille; l'angrec rameux. 257. — L'angrec nocturne. 258. — L'angrec cilié, 259. — Espèce connue. 240.

ANGOURIES (les). Genre 7 des plantes appelées courges. *Hist. des Plantes*. XIV. 259. — 3 espèces connues. 260.

ANGUILLES. Leur origine dans l'ergot et dans la colle faite avec de la farine. XVIII. 26 et 39. — Anguille très-grande, conservée pendant assez long-temps dans une fosse qui ne contenoit pas une moitié de mètre (environ deux pieds) cube d'eau. *Histoire des Poissons*. II. 54. — Expériences sur le transport des anguilles d'une eau dans une autre. 22. — Comment on en a guéri d'une maladie produite par la trop grande chaleur. 41. — Description des écailles de l'anguille. 202. — Les juifs ne mangent pas d'anguilles, parce qu'ils les comprennent dans la classe des poissons sans écailles, dont il leur est défendu de manger. 204. — Usage que faisoient les paysans de plusieurs pays du Nord, des

écailles des anguilles. 204. — Plusieurs auteurs n'ont pas connu les organes de la génération de l'anguille. 205. — Ses différentes dénominations. VI. 46. Éloge de sa beauté. 49. — Honneurs que lui ont rendus les anciens. — 50. — Sa description. 53. — Sa peau et d'où lui vient le nom murène. 54. — Ses autres parties. 55. — Ses couleurs. 56. — Son agilité. 58. — Ses parties intérieures 59. — Ses différentes grandeurs et son accroissement. 60. — Expériences à ce sujet, de M. Septfontaines. 61. 71. — Ses voyages. 62. — Sa nourriture. 65. — Comment elle sort du corps de l'esturgeon qui l'a avalée. 66. — Comment elle se glisse sur terre pour se nourrir des petits vers des prés et de quelques végétaux. 67. — Comment elle peut, pendant un assez long tems, rester hors de l'eau sans périr. 68. — Son industrie dans la formation des terriers qu'elle creuse dans la terre molle des lacs et des rivières. 69. — Son ouïe et lieux qu'elle fréquente. 72. — Sa pêche. 73. 76. 105. — Cas que faisoient les anciens de l'anguille dans leurs repas, et quels sont ceux qui en ont défendu l'usage. 74. — Sur la quantité d'eau qui lui est nécessaire. 79. — Changemens qu'elle éprouve dans l'eau. 80. — Ses maladies. 81. — Ce qui lui arrive alors. 82. — Sa vitalité et durée de sa vie. 83. — Comment elle se perpétue et se régénère. 85. — Précis des opinions diverses émises à ce sujet. 86 (note). Sur les œufs de l'anguille. 94. — Sa fécondité. 96. — Tous les climats peuvent lui convenir. 98. — Ses variétés. 99. — Le pimpereau et le guiseau. 101. — L'anguille chien. 102. — L'anguille du Nil. 50. 104. — Description des différentes méthodes mises en usage pour leur pêche. 106. — Manière de pêcher l'anguille à la ligne. 113. — Manière de la pêcher à la nasse ou au verveux. 116. — Multiplicité considérable des anguilles. 119. 121. — Manière de les prendre dans les lagunes de Commachio. 120. — L'anguille tachetée, la myre, la murène tachetée, la murène myre, 3^e et 4^e esp. 123. — Description de la myre. 124. — Le congre ou la murène congre. Esp. 5. 127. — Ses habitudes. 130. — Ce qu'en dit Redi. 131. — Comment on la prend. 132. — Comment on la fait sécher. 133. — L'anguille de sable. 136.

ANGUINES (les). Espèce 12 des plantes appelées courges *Hist. des Pl.* XIV. 289 — 6 espèces conn. 290.

ANHINGA (l'). Oiseau du Brésil et de la Guiane. Sa description. LX. 105 — Caractère singulier des plumes de sa queue. 306. — Espèce particulière. 308. — L'anhinga roux. 310.

ANIMALES (matières) Classe 3 des matières qui originellement formoient le globe. III. 338.

ANIMAUX. Méthode artificielle pour leur division, et examen de celle de Linnæus. I. 45. — Remarques sur l'*Hist. des animaux* par Aristote. 55. — Dans quelle contrée du Nord les premiers animaux terrestres ont pris naissance? III. 375. — Ceux qui habitent aujourd'hui le midi, sont venus du nord. 179. 385. — Raisons de ce fait. 181. 185. 188. — Leur défaut d'industrie. 392. — Ils étoient plus grands qu'ils ne sont aujourd'hui. — 377. — Aucuns de ceux propres et particuliers aux terres méridionales de notre continent, ne sont trouvés dans les terres méridionales de l'autre 384. — Animaux géans. 385. — Usages que l'homme tire des animaux. IV. 32. — Sur 300 espèces d'animaux quadrupèdes, et 1500 esp. d'oiseaux qui peuplent la surface de la terre, les 19 ou 20 que l'homme a choisis font plus de bien sur la terre que toutes les autres esp. réunies 33. Les sauvages n'ont point d'animaux domestiques. 54. — Empire de l'homme sur les animaux. 35 — Géans dans plusieurs esp. d'animaux. 98 — Il y a des animaux si bruts, qu'ils préfèrent de languir dans leur ingrate terre natale, à la peine qu'il faudroit qu'ils prissent pour se giter plus commodément ailleurs. 117. — Effets de la chaleur des animaux sur l'air. 293. — Travail des animaux à coquille sur l'eau. 324 — Durée de leur vie. 325. (note). — Différences dans la reproduction des animaux, des végétaux et des minéraux. VII. 361. — Acides des animaux. X. 65. — Leurs propriétés. 72. Leur génération spontanée, effet de la cristallisation. XVI. 80. — Comparaison des animaux et des végétaux. XVII. 5. — L'animal est l'ouvrage le plus complet de la nature, et l'homme en est le chef-d'œuvre. 6. — Ce qu'il faut pour faire l'*hist. de l'a-*

nimal. 11. — Principales différences entre les animaux et les végétaux 12. 24 — Leurs ressemblances. 15. — Leur comparaison sous d'autres faces 16. — Moyen de reconnoître et de distinguer les espèces d'animaux. 17. — Comparaison des animaux et des végétaux, relativement au produit. 19 — Leur comparaison pour le lieu, la grandeur et la forme. 22 — Rapports des végétaux et des animaux avec les minéraux 28 — Petits êtres organisés à l'infini. 35. — Leur graine et son produit. 38 — Ce qu'est le corps d'un animal; son développement 58. — Sa nutrition; trois questions à ce sujet. 60. — Solution de la 1^{re}, 61 — Solution de la 2^e, 62. — Solution de la 3^e, 65. — Effets de la nutrition, 67 — Sur la génération des animaux. 74. *Voy.* GÉNÉRATION. — Examen de la division d'Aristote, des animaux en trois espèces. 115. — Ce qu'on doit entendre par le mot animal. 367. — Variétés dans leur génération. XVIII. 1. — A quoi on peut attribuer la multiplication prodigieuse des petits animaux. 6. — Différences pour la génération entre les animaux qui multiplient beaucoup et ceux qui multiplient moins. 8 — La copulation est le moyen par lequel la plus grande partie des animaux se perpétue. 12. — Il se forme des productions nouvelles chez eux, aux tems de leur multiplication. 15 — De nouvelles productions précèdent la génération dans le corps de chaque animal. 17. — Génération dans la plupart des gros animaux. 16. — Tems marqués pour la génération chez presque tous les animaux, à l'exception de l'homme. 21. — Un seul acte de la génération épuise les uns et les fait mourir: il amaigrit les autres: d'autres engendrent plus souvent. 22. — Le tems de la génération varie. 23. — Causes de la génération dans les animaux et dans les végétaux. 24. — A quoi il faut faire attention pour reconnoître les parties fondamentales et essentielles du corps de l'animal. 143 — Comparaison de l'homme avec les animaux. 245, 246. — Pourquoi ils ne parlent pas. 248. — Résultats de leurs opérations. 250. — Exemples d'animaux qui ont vécu le double de l'âge ordinaire. XIX. 392. — Siége du toucher chez les animaux. XX. 46. — Discours sur leur nature. XXI. 257. — Leurs propriétés et leurs facultés

communes au végétal. 238. — 1^{re} division de l'animal, dans l'état de mouvement ou de repos, dans celui de la veille ou du sommeil. 240. — Deux parties dans l'économie animale, l'une agissant toujours, l'autre n'agissant que par intervalle. 242. — Comparaison et différences du corps de l'homme avec celui des animaux. 245. — Le physique de nos actions. 255. — Celui de celles des animaux. 261. — Explications de leurs actions et sensations. Ils ont le sentiment, même à un plus haut degré que l'homme. 284. — Les animaux n'ont qu'un moyen d'avoir du plaisir. 289. — La santé des animaux est plus ferme que celle de l'homme : quelles en sont les causes. 293. — Preuve par l'odorat, que les animaux ont le sentiment à un plus haut degré que nous ne l'avons. 295. — Ils ont la connoissance de leur existence actuelle; mais ils n'ont pas celle de leur existence passée. 296. — Sur leur mémoire. 302. — Si leurs rêves sont une preuve de leur mémoire. 310. — Distinction entre leurs rêves et les nôtres. 317. — La réflexion ne leur appartient pas. 318. — Leurs passions comparées avec celles de l'homme. 331. — Leurs passions particulières. 334. 337. — Leurs amours et leur jalousie. 336. — Passions qui leur viennent de l'éducation, de l'imitation, de l'exemple. 337. — Leur attachement à l'homme. 338. — Ce que c'est que leur amitié. 340. — Leur orgueil et leur ambition. 341. — Leur talent d'imitation. 343. — Leur éducation. 346. — Leur industrie. 347. — Leurs sociétés. 353. — Leur prévoyance. 361. — Explication des faits qui y sont relatifs. 365. — Ignorance des animaux sur le passé. 370. — Sens de l'ouïe chez eux. Impression que fait sur eux la musique 373. — Sur leur voix; c'est par l'inspiration qu'ils la forment. 377. — Degré de chaleur qu'ils peuvent supporter, et expériences à ce sujet, 379. — Animaux vivans dans l'eau bouillante, 384. — Des animaux domestiques, et leur comparaison avec les animaux sauvages. XXII, 65. — Empire de l'homme sur les animaux, 66. — Ils sont plus ou moins familiers, 67. — Ils ont tous été créés en même tems, 285. — Leur

dégénération, 315. — Pourquoi elle est plus marquée chez eux que chez l'homme, 321. — Trois causes y contribuent ; la température du climat, la qualité de la nourriture et l'esclavage. 323. — Influence de la nourriture sur les animaux, 328. — L'état de domesticité contribue beaucoup à faire varier leur couleur, 331. — Les animaux sauvages ne sont pas sujets à de si grandes altérations que les animaux domestiques, 334. — D'où viennent leurs variétés, 336. — Énumération des variétés des grands et petits animaux, 357. — Changement dans l'espèce même, 345. — Raisons d'analogie sur lesquelles sont fondées les présomptions à ce sujet, 350. — Le genre des animaux cruels est l'un des plus nombreux et des plus variés, 571. — Les deux cents espèces peuvent se réduire à quelques souches principales. Leur séparation relative aux deux continents de l'univers, 575. — Réduits à quinze genres et quels ils sont 376. — Dix genres et quatre espèces isolées des oiseaux particuliers au nouveau monde, 381. — Indices de l'ancienne origine des dix genres d'animaux de l'Amérique méridionale, et signes de leur dégénération, 387. — Ce qui est nécessaire pour rendre raison de l'origine de ces animaux, 395. — Table des rapports de la fécondité des animaux quadrup. 432. — Fécondité dans les animaux d'espèces mixtes, 440. — Preuves que les animaux d'espèces très-différentes se prennent d'une forte passion, 455. — Pourquoi les animaux qui n'ont qu'un estomac, ne peuvent vivre de végétaux seuls, et objection à ce sujet détruite. XXIII, 7 et 8. — D'où vient la diversité de leurs appetits, 10. — Leur perfection dépend en général de celle du sentiment, 164. — Ceux éphémères sont plus sujets que les autres aux variétés et aux altérations de tout genre. 176. — Il semble que certains climats adoucissent la nature et embellissent la forme de tous les animaux. XXIV, 27. — Oreilles des animaux domestiques et sauvages, 34. — Nombre des animaux quadrupèdes dans toute la terre, 43. — Animaux communs aux deux continents, 57. — Des animaux sauvages, 57, 63, 64. — Leur différent caractère suivant le climat qu'ils ha-

bitent. 59. — Causes des différences entre les animaux des deux continents. 67. — Pourquoi les quadrupèdes sont si petits dans le nouveau monde, 69. — Nomenclature des animaux du nouveau monde, 77. — Ces animaux pourroient naître, dans le fond, les mêmes que ceux de l'ancien monde. 96. — Différence entre la végétation des os des animaux, et celle des parties solides des végétaux, 96. — Les molécules organiques ou les parties vivantes de la matière passent des végétaux aux animaux. 98. — Cornes et défenses des autres animaux comparées au bois du cerf. 102. — Espèces les plus nombreuses d'animaux, leur fécondité et les dégâts qu'elles occasionnent, 196. — Animaux carnassiers, 243. Sensibilité des animaux; distinction à ce sujet, 248, 249. — Leur nourriture, 285. Comment la nutrition se fait, 286. — Animaux de l'ancien continent, XXVI. Animaux du nouveau monde, 39. — Il n'y a dans ces contrées que 40 espèces d'animaux qui y soient propres et naturels, 43. — Où se trouvent les animaux domestiques, 40. — Industrie et société des animaux; celle du castor, XXVI, 93. — L'influence du climat se manifeste chez les animaux par des caractères très-sensibles, 171. — Leur dégénérescence, lorsqu'ils sont captifs, 223. — La nature nous étonne encore plus par ses exceptions que par ses lois dans l'histoire des animaux, XXVII, 267. Différences entre ceux sauvages et ceux domestiques. XXIX, 86. — Variétés de forme dans leurs cornes, 90, 251. — Causes de la dégénération des animaux domestiques, 92. — Misère de certains animaux comparée à celle de l'homme, XXXII, 134. — L'éducation des animaux, XXXV, 49. — Presque tous les animaux craignent l'homme et le suivent, XLI, 2. — Ce qu'il faut faire pour les connoître avec exactitude, 4. — Observations sur le mélange de différentes espèces, XLVII, 223 et suivantes. — Ce n'est que par les mâles qu'on peut ennoblir ou relever les races, ainsi que dans l'homme, 225. — Comment de très-petits animaux peuvent résister à la grande froideur des hivers. LII, 169 (note). — Exemple de la vénération

des hommes pour divers animaux, LVII, 303. — Réflexions sur le culte qu'on a rendu à plusieurs animaux, LVIII, 175, 187. — C'est l'homme qui a détruit leur société, 331. — D'où viennent les différens caractères nouveaux dans la même espèce d'animal, LIX, 24. — Observations relatives au mot *espèce* dans les animaux, LX, 37. *Voy.* ESPÈCES — La nature ignore toutes les distinctions qui rendent les animaux plus ou moins beaux, 305. — Uniformité de leur genre de vie, de leurs habitudes et de leurs amours, 313. — Analogies entre les animaux et les végétaux, LXIII, 17, et LXIV, 150. — 2 espèces d'imitation dans les animaux, LXIII, 29. — Difficultés de la classification des animaux, LXIV, 129. — Expériences qui prouvent que les animaux qui restent plusieurs mois sous terre, dans l'état d'engourdissement et de jeûne absolu, perdent peu de leur substance par la transpiration. *Hist. des Reptiles*, I, 205. — Ressemblance entre les premiers développemens de la plante et ceux de l'animal. *Hist. des Plantes*, I, 15. — De l'irritabilité chez les animaux, 269. — Comment les animaux contribuent à la dissémination des graines, II, 84. — Leçons de conduite que l'homme reçoit des animaux. *Hist. des Rept.* IV, 183. — Comparaison de ses erreurs avec celles de certains animaux, 184. — L'hist. des animaux marins est bien loin d'être connue. *Hist. des Mollusq.* III, 19. — Observations sur l'organe de la vue chez les animaux, et anecdote à ce sujet, 85. (note). — Notes sur l'universalité du tact chez les animaux et chez l'homme, 219. — Ils créent la matière calcaire, 238. — Le globe entier n'est que le résultat de l'animalité, 389. — Animaux cachés dans la profondeur des mers ou au sein des forêts de l'Amérique, et qui nous sont inconnus, 390. — Preuves qu'il y a eu des animaux qui ont préexisté à d'autres, 391. — Les petits animaux, dès l'antiquité, ont excité l'émulation des observateurs. *Hist. des Mollusq.* IV, 6, 7. — Comment M. Lapepède explique les différences entre les animaux vivipares et les ovipares. *Hist. des Rept.* I, 210. — Fait à ce sujet, 214. — Des animaux sans vertèbres ou à sang blanc; les mollusques, 2^e division dans le règne animal. *Hist. des Mollusq.* I, 16.

— Animaux invertébrés, 18, 43. *Voy. INSECTES.* — Division générale par Lamarck, des animaux en deux espèces, en ceux à colonne vertébrale et à sang rouge, et ceux sans vertèbres et à sang blanc, 23. — Temps et pays où l'animalité se développe avec plus d'énergie. 90. — Modes qu'adoptent les êtres créés, pour leur génération et pour leur multiplication, 91. — Anecdote à ce sujet, d'un Empereur de la Chine, 92 (note). — Animaux produits de la pourriture, 112. — Tableau des auteurs qui successivement ont écrit sur le règne animal, 145 et suiv. — Les différens services que l'homme a tirés des animaux, 172. — Influence magnétique de la sèche et d'autres animaux, 194, 195 (note). — Les arts ont apporté de grandes modifications dans le transport et la colonisation des animaux, 304. — Une seule différence, mais constante, et se répétant par des générations successives, doit constituer les espèces et les genres d'animaux, 67 (note). *V. QADRUPÈDES.* — Preuve tirée du cheval, que les animaux s'accoutument à toutes sortes de températures *Hist. des Poiss.* II, 25. — Quels sont ceux qui paroissent ne pas pouvoir résister à une température différente de celle à laquelle ils ont toujours été exposés, 26. — Effets de l'engourdissement de quelques-uns, 27. — Deux grandes manières de considérer l'univers animé. II, 82. — Les animaux, et sur-tout les oiseaux et les poiss. peuvent nous dévoiler quelques faces de cet ensemble de relations merveilleuses et nécessaires qui dérivent de la première des lois dictées par la nature, 225. — Habitude principale chez tous les animaux qui influe sur toutes les autres; c'est la manière de se mouvoir, 226. — La quantité de sang dans les animaux est toujours en raison de la perfection de leur respiration, 281. — Divisions zoologiques données par Lefrancq de Berkley. *Hist. des Ins.* V, 10. — Exposition par le même, des rapports des classes inférieures ou de celles des animaux sans vertèbres, 11. — Suppositions sur leur dégénération et leurs changemens. *Hist. des Reptiles.* VIII, 277.

ANIMAUX SPERMATIQUES. Ce que c'est. XVII, 82. — Leur découverte et ce qu'en ont dit différens auteurs, 194. — Singulière observation à ce sujet, de M. Plantade, déguisé

déguisé sous le nom de *Dalénpatius*, 203. — Observations d'Andry à ce sujet, 217. — Examen comparatif du système des œufs et de celui des vers spermatiques, 212. — Difficultés particulières à dernier système, 218. — Ce ne sont pas des parties organiques vivantes contenues dans la semence, 231. — Leur grosseur et leur longueur, 236. — Ce ne sont que des corps organisés, 326. — Ce qu'a écrit Lœuwenhoek sur ces animaux, 331. — Hartsoëker n'est pas le premier auteur de la découverte des animaux spermatiques, 337. — Extrait d'une lettre à ce sujet, d'Huygens, 338. — Si ce sont de véritables animaux, 366, 376. — Sur leur queue, 387. — Remarques sur ces animaux, 400. — Comment on peut les considérer, 421. — Leur marche et leur mouvement, XVIII, 135. — Manière de les voir, 229. — Si les animaux spermatiques sont le germe de la fécondité. *Hist. des Mollusques*, II, 36.

ANIS (les). Oiseaux du Brésil. LIV, 124. — Leurs caractères génériques, 125. — L'ani des savanes. 1^{re} espèce, 127. — Ses habitudes, 129. — Observations de Vieillot sur cette espèce, 130 (note). — L'ani des palétuviers. Espèce 2, 132. — Extrait d'une lettre de M. Deshayes, sur cet oiseau de Saint-Domingue, 134.

ANIS ÉTOILÉ. *Voy. ILLICRUM*.

ANISODON (l'). Espèce 35 des *squales*, décrit par Lacépède. *Hist. des Poissons*. IV, 145. — Sa description, 146.

ANNEAU (l'). esp. 4 du genre des poissons appelés holacanthès. XI, 202, 209.

ANNE CAROLINE. Poisson du genre des mugilomores. *Hist. des Poissons*. XII, 398. — Pourquoi ainsi nommé. 399. — Sa description, 401.

ANNELE. Ce que signifie ce mot en histoire naturelle. *Hist. des Reptiles*, V, 222.

ANODA. Genre 11 des plantes malvacées, ou mauves. *Hist. des Plantes*. XVIII, 192.

ANODONTES (les). Genre 132 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusq.* VI, 312. — Leur animal. 313. — Leurs usages, 315. — Deux espèces, 316.

ANOLIS (les). Espèce particulière de lézards. Leur description. *Hist. des Rept.* III, 181. — Leur descrip-

Tab. TOME I.

D.

tion. IV, 50. — Deux esp. 53. — Sect. 1. L'anolis bimaculé, 55. — Ses dimensions, 59. — Ses variétés, 62. — L'anolis charbonnier, 64. — L'anolis rayé, 66. — Sect. 2. L'anolis roquet ou rouge-gorge, 69. — Ses dimensions, 72. — Ses habitudes, 73. — Description de l'anolis par Nicolson, 79. — L'anolis à points blancs de l'Amérique méridionale, 84. — L'anolis goutteux, 87. — L'anolis doré, 89. — Reptiles qu'il ne faut pas rapporter à l'anolis doré, 75. — Variété de ses couleurs, 97. — L'anolis sputateur, 99. — Ses habitudes, 101. — 1^{re} variété, 102. — 2^e variété, 103. — Tableau méthodique des anolis. VIII, 369.

ANOMIES (les). Genre 119 des moll. dits acéphales. *Hist. des Mollusq.* VI, 239. — Détails, 241. — Celle pelure d'oignon ephippium, 242.

ANONES (les). Famille 102 des plantes. *Voy.* leur hist. VI, 62. — Leur description. XVIII, 358. — Genre 1, anone, *anonæ*, 359. — 2^e unona, 360. — 3^e uvaria, 361. — 4^e cananga, et 5^e xilopia, 361.

ANONIS. *Voy.* ARRÊTE-ŒUR.

ANONYME (l'). Animal de la Lybie, inconnu à tous les naturalistes, et qui a des rapports avec le lièvre et avec l'écureuil. XXVII, 203. — Son nom est *fernec*, suivant Sonnini, 205.

ANOSTOME (l') Espèce 2 du genre des poissons appelés characins. *Hist. des Poissons*, XII, 260, 270.

ANSERINES (les). *Chenopodium*. Genre 19 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 47. — Le bon henri ou l'épinard sauvage, 48. — L'anserine Botride, *idem*. — L'anserine du Mexique. L'ambroisie, thé du Mexique. 49. — L'anserine vermifuge et celle du chili, 50. — L'anserine fétide, 51. — 13 espèces de France, *idem*. — 27 espèces connues, 55.

ANTA (l') *Voy.* TAPIR.

ANTENNES (les). Ce que c'est. *Hist. des Insectes*, I, 129. — Considérations sur le siège de l'odorat dans ces parties. II, 4. — Si les antennes sont le siège du toucher, 52. — On appelle antennes la première partie antérieure du corps des insectes à étuis, 61. — Structure, insertion, figure, direction, connexion, proportions et nombre des antennes, 86.

ANTENNULES ou **PALPES** (les). Ce que c'est. *Hist. des Insectes*. II, 130.

ANTHEMIS. V. les **CANOMILLES**. *Hist. des Plantes*. XIII, 117.

ANTHÈRE (l'). Ce que c'est dans les plantes. *Hist. des Plantes*, I, 41. — Sa description dans les fleurs. II, 34, 175. — Son attache, sa direction, 176. — Sa forme, 177. — Sa proportion, sa superficie et sa situation mutuelle, 178. — Ses loges et leurs ouvertures, 179.

ANTHERURA. Genre de plantes. *Hist. des Plantes*, XIV, 62.

ANTHERICS (les). Genre 6 des plantes dites asphodèles. *Hist. des Plantes*, VIII, 318. — I. Phalangium; 319. — L'antheric à deux couleurs, 320. — L'antheric rameux, 321. — L'antheric lis de St-Bruno, 322. — II. Bulbine et l'antheric frutescent, 323. — III. Narthecium, *id.* — L'antheric des marais, 324. — IV. Sciloides, l'antheric renflé, 325. — 6 espèces de France, 326. — 55 espèces connues, 327.

ANTHIAS (l'). Espèce 2 du genre des poissons appelés lutjans. *Hist. des Poissons*. X, 167 et 199. — Superstition des peuples à son sujet, 200. — Manière de le pêcher, 201.

ANTHIE, *anthia* Insecte du genre des graphipterides; ex. *Anthia sexguttata*. *Hist. des Insectes*. III, 83. — (les Anthies). En quoi ils diffèrent des carabs, VIII, 231. — Espèces. 1^o L'anthie maxillaire, 232. 2^o L'anthie thoracique, 3^o L'anthie frangée, 4^o L'anthie six-taches, 233. — 5^o L'anthie coureuse, 6^o Celle errante, 7^o Celle sillonnée, 8^o Celle à dix taches, 234. 9^o Celle allongée, 10^o Celle languissante, 11^o Celle exténuée, 235.

ANTHIREA. Genre des milanais. *Hist. des Plantes*. XIV, 57.

ANTHIRRIMUM. Voy. **MOUFLIER**.

ANTHISTERIES (les). Genre 54 des graminées. *Hist. des Plantes*. VII, 213. — Espèce remarquable, 214. — 4 espèces connues, 215.

ANTHOCERE. Genre 3 des plantes dites hépathiques. *Hist. des Plant.* III, 116. — 3 espèces, 117. *id.* IV, 42.

ANTHOPHILES (les). Division 2 de la 2^e tribu des insectes. *Voy.* leur histoire, XIII, 255.

ANTHOPHORES (les). Genre 414 d'insectes de la famille des apiaires. *Hist. des Insectes*. XIII, 375. — 3 espèces, XIV, 45.

ANTHOSPERMES (les). Genre 10 des plantes dites rubiacées *Hist. des Plantes*. XIII, 357. — Espèce remarquable. L'anthosperme d'Ethiopie, 358. — 3 espèces connues *Id.*

ANTHRACIENS (les). Famille 87 des insectes, qui comprend les genres anthrax et mulion. *Hist. des Insectes*, XIV, 302. — Genre 483. Les mulions, 303. — Genre 484. Les anthrax, 304.

ANTHRAX. Insecte du genre des papillons ragionides; ex. *Anthrax morio*. *Hist. des Insectes* III, 442. — (les Anthrax.) Genre 484 d'insectes de la famille des anthraciens. *Hist. des Insectes*. XIV, 304.

ANTHRENE, *Anthrenus*. Insecte du genre des nécrophages; ex. *anthrenus musæorum*. *Hist. des Insectes*. III, 118. — Genre 63 d'insectes, espèce 4 de la famille 10^e des nécrophages. IX, 211. — Leurs larves, 214. — Comment on s'en garantit, 216. — Leurs espèces, 218.

ANTHRIBE, *anthribus*. Insecte du genre des bruchèles; ex. *Anthribus latirostris*. *Hist. des Insectes*. III, 193. — (les Anthribes.) Genre 179 d'insectes. Leur description. XI, 32. — 9 espèces, 34.

ANTHYLLIDE Genre 41 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*. XVII, 300.

ANTICHORUS. Genre 3 des plantes tiliacées ou tilleuls. *Hist. des Plantes*. XVIII, 165.

ANTILOPES (les). 10^e espèce de gazelles, XXX, 282. — Leurs races ou espèces différentes, 284. — Description de ces animaux par M. Pallas. XXXI, 6. — Ses remarques sur leurs parties extérieures, 10. — La chèvre bleue, espèce d'antilope, 53.

ANTIMOINE. Sa fusibilité. V, 160. — C'est une terre métallique, et non pas un métal. XII, 91. — Comment il est fourni. *Id.* — Antimoine crud, 92, 94, 95 — Où se trouvent les mines d'antimoine. *Voy.* MINES D'ANTIMOINE. Foie d'antimoine et verre d'antimoine,

96. — L'antimoine natif, 98. — Note à ce sujet, de M. Sonnini. *Id.* — Sur le régule d'antimoine, 100. — Etat dans lequel ce minéral se présente dans le sein de la terre, 101. — Usage, en médecine, des préparations d'antimoine, 111. — Mercure que l'on tire de l'antimoine. XII, 84. — Concrétions de l'antimoine. XIV, 171. — De l'antimoine et de ses différentes espèces. XVI, 176.

ANTIPAROS (Détails sur la caverne d'), III, 19.

ANTRACITE. Charbon minéral. Ses esp. XVI, 140.

ANYCHIES (les). Genre 12 de la famille des amaranthes. *Hist. des Plantes.* XI, 275. — Espèces connues. 276.

AODONS (les). Genre 4 des squales. Trois espèces : l'aodon masassa, l'aodon kumal, et l'aodon cornu. *Hist. des Poissons.* IV, 154. — Toutes les trois espèces décrites par Lacepède, 155 et 157.

AOURNIERS (les) Fruit du cournouillier sauvage ou des bois. *Hist. des Plantes.* XIV, 169.

AOUROU - COURAOU (l'). Espèce 5 des amazones perroquets. LXIII, 342. — Ses variétés, 344.

APALACHINE. Genre 11 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes.* XVII, 223.

APAR (l') ou le Tatou à trois bandes. Sa description. XXVII, 277. — Celle de Fabius Columna est imparfaite, 281.

APARGIES (les). *Voy.* LIONDENTS (les).

APE. Nom par lequel les Anglais désignent les singes sans queue. XXXV, 111.

APENNINS (monts). Ce que dit Soldani de ces monts. *Hist. des Mollusques.* IV, 9.

APEREA (l'). Animal du Brésil, qui paroît tenir du lapin et du rat. XXVI, 165. — Le cori est le même que l'aperea, 167.

APHANES. *Voy.* PERCE-PIER.

APHIDIENS, *aphidii*. Insectes. *Hist. des Insectes.* III, 263. — *Idem.* V, 275. Famille 49 des insectes. XII, 338. — Sous cette dénomination sont compris les pucerons, les aleyrodes et les thrips. *Voy.* ces mots.

APHODIE, *aphodius*. Insectes du genre des coprophages; ex. *aphodius fossor*. *Hist. des Insectes.* III,

141. — Genre 204 d'insectes, espèce 5 de la 14^e famille, les coprophages. *Hist. des Insectes*. X, 117. — 36 espèces, 119.

APHRITES (les). Genre 521 d'insectes de la famille des syrphies. *Hist. des Insectes*. XIV, 358.

APHYE (l'). Espèce 4 des poissons appelés gobies. *Hist. des Poissons*. VII, 208. — Les anciens appeloient de ce nom les petits poissons qu'ils supposoient nés de l'écume de la mer. — Sa description, 179. C'est aussi le nom d'un poisson cyprin. XIII, 87.

APIAIRES, *apiariæ*. Insectes d'un genre particulier. *Hist. des Insectes*. III, 373. — Apiaires parasites, 374. — Apiaires eucères, 376. — Apiaires podaliries, 377. — Apiaires souterraines, pariétines, crassipèdes, 378. — Apiaires perce-bois, *xylocopé*, 379. — Apiaires melanides, ochracées, cératines, 380. — Apiaires mégachiles, 381. — Apiaires cylindriques, coniques, cardeuses, 382. — Apiaires rases, coupeuses, maconnes, 383. — Apiaires euglosses, 384. — Apiaires bourdons, 385. — Apiaires domestiques, *apes*. 386. — *Id.* V, 315. Famille 78 des insectes ou abeilles en général et éloge de leur industrie, XIII, 371. — Genre 413, les eubères, 373. — Genre 414, les anthopores, 375. — Genre 415, les mélectes, 377. — Genre 417, les épeoles, 377. — Genre 428, les cératines, 379. — Genre 419, les mégachiles, *idem*. — Genre 420, les xylocopes, 388. — Genre 421, les euglosses, 391. — Genre 422, les bourdons, 392. — Genre 423, les abeilles, 404. — En quoi elles diffèrent des bourdons, *idem*.

APIVORE (l'). Espèce d'insecte, le fléau des abeilles domestiques. *Hist. des Insectes*. I, 187.

APIUM. Voyez ACHE.

APLUDES (les). Genre 73 des graminées. *Hist. des Plantes*. VII, 363. — 5 espèces connues, *idem*.

APLYSIES (les). Genre 27^e des mollusques. *Hist. des Mollusques*. V, 158. — Leur description historique, 159. — Leur description physique, 160. — Observations de M. Fleuriau de Bellevue, sur ces animaux et sur la nature chimique de la liqueur colorante qu'ils répandent, 162. — 6 espèces, 170.

APOCINS (les). *apocineæ*. Huitième ordre. 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*. V, 124. — Genres voisins de la famille des apocins, 136. — Famille 61 des plantes. XVI, 162. — § 1. Ovaïres doubles, fruits à deux follicules, semences non aigrettées. Genre 1. Pervenche, *vinca*, 163. — Genre 2. Matelea, 165. — Genre 3. Ochroria, 166. — Genre 4. Tabernaemontana, et genre 5. Cameraria, 167. — Genre 6. Frangipanier, 168. — § 2. 2 ovaïres, fruits à deux loges, semences aigrettées. Genre 7. Nerion ou laurier rose, 170. — Genre 8. Echites, 172. — Genre 9. Ceropegia, et genre 10. Pergularia, 173. — Genre 11. Stapelia, 174. — Genre 12. Periploca, 176. — Genre 13. Apocin, 177. — Trois espèces et leurs propriétés, 178. — Genre 14. Cynanchum, 179. — Genre 15. Asclepias, 181. — § 3. Ovaïres simples, fruits en baies ou en capsules. Genre 16. Ambelania, Genre 17. Pacoufia, 186. — Genre 18. Allamanda, 187. — Genre 19. Melodinus, 188. — Genre 20. Gynopogon, *idem*. — Genre 21. Rauwolfia, 189. — Genre 22. Ophioxylum, 190. — Genre 23. Cerebra, *idem*. — Genre 24. Carissa, 192. — Genre 25. Noix vomique, 193. — Genre 26. Théophrasta, 195. — Genre 27. Anasser, 196. — Genre 28. Fagrea, *idem*. — Genre 29. Geleium, 197. — **APOIDS**, *apoids*. Espèce de papillon. *Hist. des Insectes*. III, 407.

APODES. Nom donné aux poissons qui n'ont pas de nageoires ventrales. *Hist. des Poissons*. III, 5.

APOGÉE (l'). Sur son mouvement. IV, 358.

APOGONS (les). Genre 101 de poissons; les écailles grandes et faciles à détacher; sommet de la tête élevé; deux nageoires dorsales; point de barbillons au-dessous de la mâchoire inférieure. — Celui rouge et le roi des rougets. *Hist. des Poissons*. IX, 100.

APONOGETONS (les). Genre 7 des plantes naiades. *Hist. des Plantes*. III, 229. — Genre 14 des plantes dites aroides. VII, 449. — Espèces remarquables, 450. — Espèces connues, 451.

APŒRETICA. Genre 4 des plantes savonniers. *Hist. des Plantes.* XVIII, 302.

APPAT DE VASE (l'). Poisson osseux de l'espèce des ammodytes. *Hist. des Poiss.* VI, 135. — On l'appelle aussi anguille de sable, 136. — Ses habitudes, 137. Sa pêche, 138. — Ses principales formes, 59. — Sa couleur, 140.

APPELET (l'). Espèce de filet dont on se sert pour la pêche du maquereau. *Hist. des Poiss.* VIII, 81.

APPENDICE GÉNITAL. Ce que c'est chez les poissons. *Hist. des Poissons*, II, 50.

APPETIT de Werner. Espèce de pierre. XVI, 226.

APPÉTIT. Ce qu'est ce besoin chez l'homme et chez l'animal, XXI, 278.

APRON (l'). Espèce 4 du genre des poissons appelés diptérodons. *Hist. des Poissons*, X, 157 et 161. — Lieu qu'il habite, et ses habitudes, 163.

APTERODICHES, apterodicera. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes.* III, 69. — V. 202. — Sous-classe 4 des insectes. VIII, 56. — Ordre 1, les thysanoures, 57.

APTERONOTES (les). Genre 29 des poissons osseux. *Hist. des Poiss.* VI, 23. — L'apteronote passan, 24. — Sa description, 25. — Sa lanière charnue, 26.

APUA (l'). Espèce 21 du genre des poissons appelés bodians, X, 508 et 514.

APUS, *limbus apus*. Insecte particulier. *Hist. des Ins.* III, 16. — Sa définition, par Cuvier, IV, 63. — Ce qu'en dit Bosc, 186. — Observations additionnelles, 190. — Fait particulier du docteur Mortimer, 192. (note). — L'apus cancriforme, 193. — L'apus prolongé, 195.

APUTE-JUBA (l'). Espèce 3 de perriche ou perroquet à queue longue et inégale, LXXIV, 58.

AQUAQUA (l'). Nom qu'on a donné, au Brésil, au crapaud perlé. *Hist. des Reptiles*, VIII, 179.

AQUILEGIA. Voy. ANCOLIE.

AQUILICIA. Genre 14 des plantes azédaracks. *Hist. des Plantes.* XVIII, 248.

ARAËES (les). Leur portrait et leurs habitudes décrits

par différents voyageurs, XX, 194. — Différens lieux qu'ils ont habités, 252. — Utilité qu'ils savent tirer des chameaux qui font leur richesse. XXIX, 17. — Leurs courses dans les déserts, 18. — Leur manière de pirater sur terre, 20. — Comment ils instruisent et élèvent leurs chameaux, *idem*.

ARABES (les). Leur terrain, I, 346.

ARABIQUE (l'). Espèce 6 du genre des poissons appelés centropomes. *Hist. des Poissons*, X, 261, 280.

ARACATIS (les). Oiseaux originaires des climats chauds de l'Amérique, LVI, 62. — Le grigri, espèce 1, 63. — Le koulik, espèce 2, 67. — L'aracari à bec noir, espèce 3, 70. — L'aracari bleu, espèce 4, 72. — L'aracari à bec uni, par Sonnini, 74. — L'aracari à gorge bleue, par le même, 75. — Le barbican, 76. — Variété du barbican, par Sonnini, 78. — Le bec de fer, par le même, 79. — Le cassican, 82.

ARACHIS. Genre 40 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 299.

ARACHNIDES (les). S'ils doivent être séparés des insectes et former une classe particulière. Préface du 1^{er} vol. de l'*Hist. des Insectes*, 9. — Leur définition, même histoire. III, 48. Famille 2 de la section 1 des insectes appelés chélodontes. Leurs caractères particuliers. VII, 144. — Nouveau genre appelé atype, 168.

ARADA (l'). Espèce de fourmillier, XLIX, 366. — En quoi il diffère des fourmilliers, 367. — Son plumage, 369. — Autre espèce d'arada, 370.

ARADES (les). Insectes de la famille des cimicides. — Genre 270; leur description. *Hist. des Insectes*, XII, 246. — Espèce 7, 247.

ARADO. Espèce de lézard galonné des Antilles. *Hist. des Reptiles*, III, 178.

ARAIGNÉE. Atachement qu'elle a pour ses œufs. *Hist. des Ins.* I, 140. — Elle est, de tous les insectes qui se nourrissent de leur semblable le plus meurtrier, 172. — Détails sur ses travaux pour se procurer sa nourriture, 173. — Ses combats avec les mouches, 175. — Son long jeûne, 176. — Combat entr'elles, 177. — Araï.

gnées appelées vagabondes, 179. — Leurs ennemis, 180. — Anecdote sur l'araignée de la prison de *Pellisson*, 181. — Espèce d'araignée amphibie qui pratique un solide logement dans la vase aquatique, 221. — Ses tissus faits avec les fils d'araignée, 363. — L'araignée domestique à longues pattes, de *Geoffroy*, II, 18. — Parties sexuelles des araignées, et leurs manières de s'accoupler, 235. — Leur manière industrieuse d'envelopper leurs œufs, 254. — Insectes du genre des arachnides, araignées vagabondes. *Hist. des Ins.* III, 49. — Araignées lousps et araignées sauteuses, 50. — Araignées tapisnières, 51. — Araignées filandières, 55. — Araignées tendueuses, 56. — Araignées crabes ou latérigrades, 57. — Travail sur les araignées par *Walckenaer*, 59. — Il les a divisées en 18 familles, 60. — Tableau de l'industrie des araignées, VII, 149. — Les *Migales*. *Voy.* ce mot. Description des araignées et leurs différences avec les mygales, 170. — Avec les faucheux, 171. Différence des araignées, quant à leur genre de vie, avec les autres animaux, 172. — L'industrie est leur caractère distinctif, 173. — En quoi elles diffèrent par leur structure des autres insectes, 174. — Description de leurs yeux, 176. — Description du corselet et de l'abdomen, 177. — Elles sont très-carnassières et ne vivent que de rapines, 178. — Leurs habitudes, 180. — Structure des organes propres à former leur toile, 181. — Forme de ces toiles, et comment elles les construisent, 182. — Celles filandières et celles vagabondes, 185. — Accouplement des araignées, et sur-tout des tendueuses, 186. — Leurs ennemis, 188. — Maladies des araignées domestiques, et danger de leur morsure, 189. — Observation à ce sujet, 190. — Morsure de la Tarentule, 191. — Utilité que l'on tire de la soie que filent les araignées, 192. — Détail de ce qu'ont écrit les anciens sur ces insectes, 193. — Ce qu'en a dit *Aristote*, *idem*. — Division des araignées, par *Olivier*, en huit grandes familles. Première, araignées tendueuses, 198. — Deuxième, filandières, 199. — Troisième, tapisnières, lousps, vagabondes, 200. — Quatrième, phalanges, 201. — Sixième, crabes, 202. — Septième, aquatiques, et huitième, sauteuses, 203. —

Walckenaer en admet 18. 1^{er}. Orbiformes, 204. — 2^e, spiraliformes. 3^e, rétifformes. 4^e, filiformes, 205. — 5^e, napiformes, 206. — 6^e, tapiformes. 7^e, caméri-formes, 207. — 8^e, celluliformes. 9^e, tubiformes, 208. — 10^e, claustraliformes. 11^e, grottiformes. 12^e, cordiformes, 209. — 13^e, nayades, 210. — 14^e, cour-reuses. 15, chasseuses, 211. — 16^e, voyageuses. 17^e, sauteuses, 214. — 18^e, chercheuses, 215. — 1^o *Arai-gnées tapissières*. — 1^{re}. Celle érythrine, 215. — 2^e, celle senoculée, 216. — 3^e et 4^e, celle des caves et celle aquatique, 217. — 5^e, celle satinée, 218. — 6^e, celle cor-ticale, 220. — 7^e, celle nourrice, 221. — 8^e, celle atroce, 222. — 9^e, celle amaranthe, 223. — 10^e, celle alôme: — 11^e, celle errante. — 12^e, celle nocturne, 224. — 13^e, celle *lucifuge*. — 14^e, celle lapidicolle, et 15^e, celle reluisante, 225. — 16^e, celle labyrinthique, 226. 17^e celle domestique, 227. — 18^e, celle privée. — 19^e, celle agreste. — 20^e, celle veloutée, 228. — 2^o *Araignées filandières, idem*. — 21^e, celle aphane, 229. — 22^e, celle sisaphe, 229. — 23^e, celle crypticole, — 24^e, celle triangulifère. — 25^e, celle découpée, 230. — 26^e, celle peinte. — 27^e, celle crépelée, 231. — 28^e, celle teinte. — 29^e, celle gentille. — 30^e, celle caroline. — 31^e; celle jolie, 232. — 32^e, celle gracieuse. — 33^e, celle bienfaisante, 233. — 34^e, celle obscure. — 35^e, celle notée. — 36^e, celle ponctuée. — 37^e, celle orticole, 234. — 38^e, celle mouchetée, 235. — 39^e, celle bi-ponctuée, 236. — 40^e, celle rayée, 237. — 41^e, celle couronnée, 238. — 42^e, celle ovale, 240. — 43^e, celle verte. — 44^e, celle phalangiste, 241. — 45^e, celle triangulaire, 242. — Son accouplement, 244. — Tra-vail de sa toile, 247. — 46^e, la montagnarde, 248. — 47^e, la thoracique, 249. — 5^o. *Les araignées tendueuses*. — 48^e espèce, l'étendue, 249. — 49^e, l'angulaire, 250. — 50^e, la bicornue, 251. 51^e, la bossue. — 52^e, la croi-sée. — 53^e, la bituberculée, 252. — 54^e, la dromadaire, 253. — 55, celle mellitagre; et 56^e, celle myagrie, 254. — 57^e, celle diadème, 255. — 58^e, celle alsine. — 59^e, celle quadrille, 256. — 60^e, celle scalaire. — 61^e, celle apocise, 257. — Variétés de celle - ci, 258.

— 62^e, celle ombraticole; ses variétés, 259. — 63^e; celle cratère. — 64^e, celle agalène, 260. — 65^e, celle myabore. — 66^e, celle triguttée. — 67^e, celle drypte, 261. — 68^e, celle acalyphe. — 69^e, celle céropège, 70^e, celle adiante, 262. — 71^e, celle diodie. — 72^e, celle tubuleuse, 263. — 73^e, celle calophylle. 74^e, celle inclinée, 264. — 75^e, celle antriade. — 76^e, celle cucurbitine, 265. 77^e, celle conique. — 78^e, celle de Ménard, 266. — Particularités sur cette espèce d'araignée, 268. — 79^e, celle fasciée, 269. — 80^e, celle soyeuse, 270. — 81^e, celle pâle, 271. — 82^e, celle mamelonnée. — 83^e, celle fastueuse. — 84^e, celle variable, 272. — 84^e bis, celle à broches, 273. — 85^e, celle pilipède, 274. — 86^e, celle plumipède. — 87^e, celle militaire, 275. — 88^e, celle épineuse. — 89^e, celle fourchue. 90^e, celle cancre. 91^e, celle armée, 276. — 92^e, celle à quatre épines. — 93^e, celle voûtée. — 94^e, celle arquée, 277. — *Araignées crabes ou latérigrades*. — 95^e, l'émeraude, 278. — 96^e, celle ornée. — 97^e, celle rose, 279. — 98^e, celle hétérophthalme. 99^e, celle oblongue, 280. — 100^e, celle argentée. — 101^e, celle rhombifère. — 102^e, celle tigrée, 281. — 103^e, celle cespiticole. — 104^e, celle flamboyante. — 105^e, celle chas-seuse, 282. — 106^e, celle paresseuse. — 107^e, celle bilinéa. — 108^e, celle tronquée, 283. — 109^e, celle arrondie. — 110^e, celle échancrée. — 111^e, celle floricole, 284. — 112^e, celle violette. — 113^e, celle citron. 285. — 113^e bis, celle calycine. — 114^e, celle crétée. — 115^e, celle enfumée, 286. — 116^e, celle ombellicole. — 117^e, celle Diane. — 118^e, celle mignarde. — 119^e, celle arlequine, 287. — 120^e, celle jardinière. — 121^e, celle rurale, 288. — 122^e, celle dorée. — 123^e, celle tarentule, 289. — 124^e, celle allodrome, 292. — 125^e, celle agrétyque. — 126^e, celle vorace. — 127^e, celle agile, 293. — 128^e, celle à sac. — 129^e, celle prompte. — 130^e, celle corsaire, 294. — 131^e, celle lugubre, 295. — 132^e, celle admirable, 296. — 133^e, celle bordée. — 134^e, celle frangée, 297. — *Araignées sauteuses*. — 135^e, celle rouge, 297. — 136^e, celle tardigrade. — 137^e,

celle jardinière, 298. — 138^e, celle chevronnée. — 139^e, celle psylle. — 140^e, celle entourée. — 141^e, celle virgulée, 299. — 142^e, celle pubescente. — 143^e, celle lettrée. — 144^e, celle triponctuée. — 145^e, celle noire, 300. — 146^e, celle chalybeyenne. — 147^e, celle cuivrée. — 148^e, celle nidicole. — 149^e, celle frontale. — 150^e, celle lunulée, 301. — 151^e, celle bicolor. — 152^e, celle rusée. — 153^e, celle des mous-ses. — 154^e, celle sanguinolente, 302. — 152^e, celle fourmi. — 156^e, celle festonnée. — 157^e, celle apla-tie, 304.

ARAL (le lac). La description, II, 196.

ARALIE, *aralie*. Famille 66 de la classe 4 des plantes dicotylédones. Leur description et leurs diffé-rentes espèces. *Hist. des Plantes*. V, 165. — XVI, 249. — Genre 1. Gastonia, *idem*. — Genre 2. Polys-cias, 250. — Genre 3. Aralie, *idem*. 4 espèces, et leurs propriétés, 251. — Genre 4. Cussonia, 2 espèces, 252. — Genre 5. 6 Panax, *idem*.

ARAS (les). Perroquets du nouveau continent. C'est, de tous ces oiseaux, le plus grand et le plus magnifiquement paré. LXIII, 270. — Lieux qu'ils habitent 271. — Leurs espèces, et caractères qui les distinguent des autres per-roquets du nouveau monde, 273. — L'ara rouge, 275. — Lieux qu'il habite, et sa description, 279. — Ses habi-tudes naturelles, 282. — Son nid, sa ponte et soin de ses petits, 286. — Singulière manière des sauvages des An-tilles, de prendre vivans les aras, 288. — Comment on les apprivoise, 289. — Usage que les Indiens font de leurs plumes, *id*. — Ils sont plus sujets que les autres perroquets à l'épilepsie, ou mal caduc, 290. — L'ara bleu, 293. — Sa description, 296. — L'ara verd. Il est rare, 298. — Sa description, 301. — Il est aimable par ses mœurs sociales et la douceur de son naturel, 302. — Ses habitudes, 303. — Sa jalousie, 304. — Sa nourriture, 305. — Il est très-adroit à se servir de ses pattes, 306. — Ses narines et son bec, 307. — Sa variété de races, 308. — L'ara militaire, *id*. — L'ara noir, 311. — Additions à l'article des aras, par Virey, 313. — Leur analogie avec la famille des singes alouates du nouveau continent.

314. — L'ara obscur d'Afrique, 315. — L'ara de Surinam, 316.

ARAU (l') ou KARA, oiseau des mers du Nord. LXIV, 114.

ARAUNA. Espèce 28 du genre de poissons appelés lutjans. *Hist. des Poissons*. X, 220 et 221.

ARBOUSIER. Genre 5 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 253. — Trois espèces, 254. — Leurs propriétés, 255.

ARBRES, en général. Leur chaleur intérieure IV, 294. — Idées sur la manière dont les arbres croissent, VI, 181. Leur écorcement pour augmenter leur solidité, 277. — Expériences à ce sujet sur les arbres fruitiers, 292. — Défectuosité de la méthode de marquer les arbres que l'on veut réserver dans les bois à couper, 437. — Recherches sur la cause de l'excentricité des couches ligneuses, quand on coupe horizontalement le tronc d'un arbre, VII, 5. — Comment on peut reconnoître si des arbres transplantés souffrent, lorsqu'ils se trouvent dans une situation contraire à celle qu'ils avoient dans la pépinière, 7. — Expériences pour prouver qu'ils croissent plus du côté du nord que du côté du midi, 11. — Sur l'excentricité des couches ligneuses vers le midi, 9, 16. — Expériences qui prouvent que différentes circonstances produisent des variétés considérables dans l'accroissement de ces couches, 11. — La vraie cause de l'excentricité des couches est la position des racines, et quelquefois celle des branches, 17. — Nœuds des arbres et leur origine, 18. — Plusieurs observations qui prouvent que l'augmentation d'épaisseur des couches est indépendante de l'exposition, 19. — Ce que prouvent de plus ces observations, 21. — Conclusions, 30. — I^{er} effet de la grande gelée sur les arbres, le double ou le faux aubier, 38. — II^e effet de la gelivure entrelardée, 46. — Observations sur la fente des arbres suivant la direction de leurs fibres par les fortes gelées, 47. — Désordre qu'occasionne le soleil sur les arbres, après les fortes gelées, 66. — Objections détruites à ce sujet, 69. — Précautions à prendre pour éviter les funestes effets des

fortes gelées, 74. — Ce que c'est que la galle des arbres. *Hist. des Insectes*, I, 153. — Sur quelques arbres d'une grosseur énorme, et très-anciens. *Hist. des Mollusques*, II, 383. — Erreur de Hales et de Linnæus sur la moelle des arbres. *Hist. des Plantes*, I, 192. — Quelle est la seule différence essentielle qu'il y a entre les arbres et les herbes, 200. — Expériences de M. Coulomb, qui prouve que la sève monte dans les arbres par les tubes qui avoisinent le canal médullaire, 320. — Les grands arbres laissent après leur mort des traces plus durables de leur existence, II, 97. — Elle s'annonce chez eux de loin, 99.

ARBRE au POIVRE, ou Agneau-chaste de la famille des plantes dites gatiliers. *Hist. des Plantes*, XV, 205, 206.

ARBRE DE DIANE. Ce que c'est, et comment on le forme, XI, 221, 222.

ARBRE DE JUDÉE. Voy. GAINIER.

ARBRE DE NEIGE. Espèce du genre des chionanthes, arbres de l'Amérique. *Hist. des Plantes*, XV, 164.

ARBRES FRUITIERS. On y distingue cinq différentes espèces de branches. *Hist. des Plantes*, I, 279.

ARBRES SOUTERRAINS, III, 69, 78.

ARBOUSTE D'ASTRACAN. *Hist. des Plantes*. XIV, 284.

ARBUTUS. Voy. ARBOUSIER.

ARCADIENS (les). Peuple qui prétendoit être le plus ancien de la terre, et antérieur à la lune. Passages tirés d'Ovide à ce sujet. *Hist. des Mollusq.* III, 301. (note).

ARC EN QUEBUE (l'). Oiseau d'Amérique. XLV, 126.

ARCHE DE NOÉ. Idées de M. Wistren sur cette arche, I, 279.

ARCHES (les). Genre 154 des mollusques dit *acéphales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 395. — Deux espèces, 399.

ARCTIQUE (l'). Espèce 18 du genre des poissons appelés salmons. *Hist. des Poissons*, XII, 115, 194.

ARCTOPUS. Genre 45 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 341.

ARCTOTHIQUE (l') rampante. Genre 197 des

plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 240. — Une espèce connue, 241.

ARCTOTIDES (les). Genre 196 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 231. — 60 espèces connues, 235.

ARDOISE. Ce que M. Buffon entend par la dénomination d'ardoise, I, 388. — Temps de la formation de ardoises, III, 206. — Comment elle est formée. 302. — Poissons et végétaux trouvés dans les mines d'ardoise, III 286. IV, 104. — Sa production, VIII, Les lits des ardoises, 139. — Carrières d'ardoise en France, 140. — Leur sécheresse, 151. — Quantité de mica qu'elles contiennent, 153. — Détails sur l'ardoise d'Angers, *idem*. — Impressions de poissons et peu de coquilles qu'on remarque sur les ardoises, 156. — Propriétés de l'ardoise, 158. — Sur l'ardoise d'Angleterre, 160. — Rapports entre les mines d'ardoise et celles de charbon de terre, par leur formation et par leur situation, IX, 72.

ARECS (les). Genre 5 de palmier. Leur description. *Hist. des Plantes*, VIII, 43. — Espèces remarquables. L'arec cachou, ou de l'Inde, 44. — Sa description, 45. — Usage qu'on fait de son fruit sous le nom de bétel, 46. — L'arec d'Amérique, ou palmiste franc, 47. — Le chou palmiste, 48. — Espèces connues, 49.

AREGE-NAGOU (l'). Variété de la vipère appelée *naja*. *Hist. des Reptiles*, VI, 71.

ARENARIA. V. SABLINE.

ARENGA (l'). Genre 10 de palmiers. Sa description. *Hist. des Plantes*, VIII, 65. — Usages qu'on en fait et ce qu'on en tire. 66. — Faits très-remarquables sur ce palmier, rapportés par Rumphius, au sujet de son fruit. 67. — Espèce connue, 68.

ARÊTE. C'est un filet considéré comme appendice de la glume ou de la balle de la fleur. *Hist. des Plantes*, II, 194.

ARETIDES (les). Genre 13 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 209. — Espèces connues, 210.

ARÉTILES (les). Genre 14 des plantes dites lysimachies.

chies. *Hist. des Plantes*, XIV, 374. — 5 espèces de France et 3 espèces connues, 376.

ARGALA (l'). Espèce de grue. Sa description, LVII, 53. — Lieux où elle se trouve, 54.

ARGALI (l'). Animal de Sibérie. XXV, 63. — Il est de la classe des cerfs. Sa description, par M. Gmelin, XXIX, 284 (note). — Ce sont, suivant Buffon, des moufflons vivans, 289.

ARGAN. Genre des plantes dites sapotiliers. *Hist. des Plantes*, XVI, 200.

ARGAS. Insecte du genre des tiques; ex. *acarus reflexus*. *Hist. des Insectes*, III, 66.

ARGEMONE Genre 2 des plantes dites papavéracées. 3 Espèces. *Hist. des Plantes*, XVIII, 7.

ARGENT. Expérience qui prouve qu'il est d'une sécheresse entière, VII, 394. — Pourquoi il ne se trouve pas, aussi communément que l'or, en poudre ou en paillettes, dans les sables et les terres, XI, 16. — Comment on le sépare de l'or, 65. — Sur l'essai de l'argent, 71. — L'or et l'argent n'ont toujours fait, dans la nature primitive, qu'une masse commune, 150. — Leurs propriétés communes, 151, 155. — En quoi ils diffèrent l'un de l'autre, et mines d'argent d'Hongrie, 156. — Comment l'argent se présente dans les mines secondaires, 158, 161. — L'acide nitreux le dissout, 159, 217. — Sur l'argent corné, 160. — Sur l'alliage de l'or avec l'argent, avec le cuivre, 162. — Avec le plomb, le fer, 164. — L'or et l'argent ne peuvent se convertir en chaux, 165. — Manière de les purifier, 166. — Deux sortes d'argent natif, 168. — Lieux où se trouvent les principales mines d'argent. *Voy. MINES D'ARGENT*. — Preuve que l'argent, tenu en fusion sur le feu, perd quelque chose de sa substance, 215; *idem.* et VI, 57. — Phénomènes qu'il offre dans ses dissolutions, XI, 216. — La pierre infernale est la seule préparation de l'argent que la médecine ait conservée, 217. — Action des acides sur l'argent, 218. — Les alkalis n'agissent sur l'argent qu'unis au soufre, 419. — Comment on emploie l'argent battu sur les autres métaux, 420. — Sur l'arbre de Diane, 421. — Moyens de séparer l'argent de l'étain,

Tab. TOME I.

E

431. — Transmutation du cuivre en argent. XII, 83. — Concrétions de l'argent, XIV, 145, 151. — Ses changemens dans le sein de la terre, 147. — La mine d'argent cornée, 2^e minéralisation, 148. — 3^e minéralisation en cristaux transparents, 149. — Extrait d'une lettre sur la réduction en métal pur, de l'argent minéralisé, 151. — Sur l'argent et ses mines, XVI, 148. — L'argent considéré au moral, XXI, 132.

ARGENTINES (les). Genre 191 de poissons. Espèce 1, la sphyrène. *Hist. des Poissons*, XII, 361, 363. — Espèce 2, celle bonuk, 361, 366. — Celle caroline, 362, 366. — Celle machnate, 362, 367.

ARGILITES. Espèce de pierre, XVI, 229. — Argilites composées, 274.

ARGILE. Celle, produite par le sable, est un des premiers élémens de la terre, I, 367. — L'argile et le sable sont des matières du même genre, 368. — Ce que M. de Buffon entend par le mot argile, 386. — Espèce de terre nécessaire pour former une colline d'argile, III, 246. — La production des argiles a précédé celle des coquilles et comment elle s'est faite, 288. — Expérience qui prouve que le grès en poudre se convertit en argile, IV, 111. — Son origine, VIII, 103. — L'acide se trouve dans toutes les argiles, 106. — La plus pure des argiles, 108. — Fouille faite à Montbard pour reconnoître les dépôts successifs et les différentes couches de glaise et d'argile, 110. — Deux sortes d'argile, 118. — La plus noire de toutes est appelée la pierre noire. En quoi l'argile diffère des schistes et de l'ardoise. 137. — Il n'est pas vrai que le fond du charbon de terre soit de l'argile, IX, 25. — Travail des chimistes sur l'argile, X, 6. — Pierres et concrétions vitreuses mélangées d'argile, XIII, 249. — Ce que dit M. Demestie, des couches argileuses, *id m.* — Leur formation, XVI, 107. — De l'argile, ou l'alumine des chimistes, 200. — Plantes des terrains argileux. *Hist. des Plantes*, 351.

ARGITHAUNES (les) Genre 3 des plantes dites euphorbes. *Hist. des Plantes*, IX, 345. — Espèces connues, 346.

ARGOLOSIA (l'), du Cap de Bonne-Espérance. Genre 17 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 140.

ARGONAUTES (les). Espèce de mollusques coriacés-testacés. Leurs caractères génériques. *Histoire des Mollusques*, III, 118. — L'argonaute papiracé. Sa synonymie, 119. — Les modernes n'ont point voulu reconnoître ce mollusque, 123. — Aristote l'a connu ; ce qu'il en a dit, 128. — Comment il décrit sa manière de naviguer, 130. — Ce qu'a dit sur le même sujet Mutien, cité par Pline, 132. — Pline, à son tour, a décrit l'argonaute, 134. — Belle description en vers qu'en a fait Oppien, 136. — Sur ce qu'en a dit Athénée, 137. — Elien l'a beaucoup mieux décrit, 138. — Description de Belon, 140. — Description par Odonus, médecin, 145. — On ne trouve point ce poisson dans les mers d'Angleterre, 146. — Aldrovande a fait sur ce poisson des recherches qui sont presque toutes critiques ou de simple littérature, 147. — Jonston n'a fait que copier Aldrovande, et répéter ses erreurs, 149. — Rumphius est l'auteur qui a le mieux développé l'histoire de l'argonaute papiracé, parce qu'il l'avoit vu assez fréquemment à Amboine, 151. — Traduction de l'article qui le concerne dans l'ouvrage de cet auteur, 152. — Sa coquille, 160. — Histoire particulière sur l'enlèvement par un aigle de mer de ce mollusque, 162. — Description d'un argonaute pris à Hitoe, 163. — Sur le médaillon qui décore le front de la première page de l'ouvrage de Rumphius, et qui présente la meilleure figure qui ait été tracée de l'argonaute, 168. — Gualtieri, en décrivant ce mollusque, a changé son nom en celui de cymbium ou gondole, 170. — Dessallier d'Argenville a confondu l'animal du nautille avec celui de l'argonaute, 173. — Linnæus est le premier qui a nommé ces coquilles argonautes, 179. — Favannes a confondu les argonautes, les nautilles, les spirales et les cornes d'Ammon, 181. — Plus que tout autre, il n'a voulu voir dans l'argonaute papiracé qu'un poulpe parasite, 183. — Sur l'article du dictionnaire de M. Valmont de Bomare, qui concerne le nautille

papiracé ou l'argonaute, 185. — De Born a adopté l'animal de l'argonaute pour un mollusque particulier, 191. — Bruguières a cru, comme d'autres, que l'hôte de la coquille de l'argonaute papiracé étoit son véritable propriétaire; 195. — Description qu'il donne de ce mollusque, 196 (note). — Il a le premier observé que l'argonaute est ovipare, 198. — Les modernes ont pris sur cet animal un parti moyen, et en accordant que ce ne pourroit être qu'un mollusque qui fût le véritable animal de l'argonaute, ils se sont réunis pour croire que cet animal, quel qu'il fût, étoit encore inconnu, et que celui qu'on rencontroit dans sa coquille étoit un poulpe spoliateur, 202. — Lamarck est le premier qui ait émis cette opinion, *idem*. — Cuvier pense de même, 403. — Bosc, au lieu d'un animal parasite, en loge deux dans l'argonaute, 205. — Sur le peu d'accord qui règne entre son opinion, ses descriptions et ses figures, 209. — Difficultés presque insurmontables qu'on éprouve, quand on veut se saisir des argonautes, 212. — Sur les deux qui existent au muséum d'histoire naturelle, dans les galeries, 213. — Examen de l'argonaute à grain de riz, 214. — Ses larges palmures, 216. Description de la navigation de l'argonaute, 217, 221. — Sa fuite, et comment il fait sombrer son petit vaisseau, 220. — Il est probable que ce mollusque peut recéler une portion d'air, comme le font d'autres habitans des mers, 222. — Fermeture de son manteau, 223. — Description de l'argonaute de la Méditerranée, 224. — Palmures des deux bras de derrière qui servent de voile à ce mollusque, 225. — Les argonautes constituent un genre particulier sous le nom de poulpes, 226. — L'organisation intérieure de ces mollusques est encore plus rapprochée des poulpes que leurs formes extérieures, 228. — Œufs que la femelle de l'argonaute recèle dans le vide de sa poupe, 230. — Disposition des palmures, lorsque l'argonaute se replie dans sa coquille, 231. — Ce sont ces palmures qui, par une transudation calcaire, forment les coquilles, et pourquoy les unes sont striées et les autres tuberculées, 232. — Formation des tubercules de la carène, 233. — Le

corps de l'argonaute ne transude pas de matière calcaire, 235. — Fait confirmatif, 236. — Mode particulier de la construction de la coquille de l'argonaute, 277, 278. — Comme les autres testacés, il est revêtu de sa coquille, avant sa sortie de l'œuf, 279. — Comment se font les accroissemens successifs de l'enveloppe testacée de l'argonaute, 282. — Ce mollusque resoude et raccommode lui-même sa coquille cassée, 284. — Dans son état de force et de santé, il se sert de ses bras pour se traîner au fond des mers ; mais il fuit les fonds remplis de rochers, 286. — Mers où on le rencontre, 287. — Description de sa coquille, pourquoi on l'a appelée nautile papiracé, 287. — Autre espèce, 289 (note). — Couleurs et mœurs de l'argonaute papiracé, 291. — Animaux dont il devient la proie, 292. — Comment il s'acharne sur sa proie, lorsqu'il l'a saisie, 293. — Sur l'argonaute de la Méditerranée, décrit par Shaw dans son journal, 295. — Ce qu'il en dit, 298. — L'argonaute étoit un animal sacré chez les anciens, 299. — Ce qu'en ont dit et écrit les poètes, et épigramme à ce sujet de Callimaque, 300. — Description de l'argonaute papiracé à la voile, planche 35, 303. — Description de l'argonaute papiracé coulant à fond, planche 36, explic. 305. — L'argonaute à grains de riz sorti de sa coquille et vu par le dos, planche 37, 307. — Sa synonymie, explic. *id.* — Sa description, 309. — Sa représentation vu par devant, planche 38, pag. 310. — Sur sa peau, 311. — Il a avec les poulpes les plus grands rapports par son organisation intérieure, 312, 313. — Ses bras tronqués repoussent et se régénèrent, *idem.* — Description de la coquille de cet argonaute, 314. — Cause des grains ou perlures qui sont sur cette coquille, 315. — Les anciens n'ont pas connu cette espèce d'argonaute, 316. — On la trouve dans les mers des grandes Indes, 317. — Ce qu'en ont dit les auteurs modernes, 318. — Il est très-probable que cet argonaute vient des mers d'Afrique, 320. — Explication des planches 37, 38 et 39, qui représentent l'argonaute à grains de riz, 323. — L'argonaute à oreilles, 326. — Ce qu'ont dit différens auteurs de sa coquille, 328. — Lieux où on rencontre cet ar-

gonaute, 330. — L'argonaute à sillons brisés, planche 40, pag. 332. — Sa description, 334. — Solution de la question si l'argonaute peut quitter à son gré sa coquille et s'en reconstruire une autre, 337. — Opinion d'Aristote à ce sujet, 338. — Sentiment opposé, et preuves, 339. — Ce que dit Halma d'une coquille informe d'argonaute, 341. — Difformités et accidens que présentent quelquefois ces coquilles, 343. — Ce que dit Rumphius d'un nautilaire rare et singulier, 345 (note). — Sur quelques coquilles d'argonautes dont les animaux ne sont pas encore connus, 347. — Coquille dite nautilaire vitré, 355 (note); — L'argonaute papier brouillard, sa synonymie, 358. — Sa description, 359. — Ses coquilles, 360. — Lieux où on le trouve, 362. — L'argonaute chiffonné, 364. — Sa description, 365. — Différences de sa coquille avec toutes les autres, *idem*. — Variété indiquée par Halma, 366. — C'est, selon Favannes, une variété de l'argonaute à grains de riz, 368. — Ce qu'il appelle nautilaire uni, 369. — L'argonaute croissant, 371. — Lister est le premier qui ait publié sa coquille, *idem*. — Sa description par Favannes, 372. — Autre argonaute qu'il a fait graver sous le nom de *petit nautilaire à grosses côtes*, 373. — L'argonaute écope de batelier. Sa synonymie, 375. — Seba a le premier parlé de sa coquille, 376. — Ce qu'en dit Favannes, 377. — Argonaute casque et carénaire, 379. — L'argonaute de Rimini, 380. — Il se trouve en masses dans les landes du Brabant, 382. — Sa description, 393. — Lieux où il se trouve, 384. — C'est le seul argonaute dont on rencontre l'analogue fossile, 385. — (Autres détails sur cet argonaute, IV, 11). — Les argonautes pétrifiés sont rares, III, 385. — L'argonautilaire plissé, 394. — Sa description, 395. — Sur les argonautites des vaches noires, 396. — L'argonautite étoilée, 403. — Sa description, 404. — L'argonautite carené, 405. — Pourquoi ainsi appelé, 406. — L'argonautite lisse, 408. — Lieux où on le rencontre, 409. — Explication de la planche 41, qui représente plusieurs argonautites, 410.

ARGONAUTES MICROSCOPQUES. Mollusques coria-

oés testacés : de quelques argonautes qui restent toujours petits : des corps pétrifiés qu'on peut rapporter en général au genre des argonautes, et des argonautes microscopiques. *Hist. des Mollusques*, IV, 5. — Sur quelques prétendus argonautes, 11. — Ni Scheuchzer ni Spada n'ont publiés d'argonautites, 12, 16. — Ferdinand Boyer le fils a publié un ammonite qui a toutes les apparences d'un argonaute, 20. — Si les ammonites sont un genre mitoyen entre les argonautes, les nautilites et les ammonites, 21. — Parmi les dix-sept espèces de coquilles microscopiques de Soldani, on ne trouve point d'argonautes, 37. — Coquilles ayant l'aspect des argonautes et fortement grossies au microscope, 38. — Planche 42, figure de coquilles microscopiques, dont la forme se rapproche des argonautes, pag. 38. — Les formes particulières de la coquille, dite carénaire, ne permettent pas de la mêler parmi les argonautes, 58. — L'argonaute cornu de Bosc n'est probablement qu'un vermiculaire, 62. — Rapport du nautilite avec l'argonaute, 114. — Ses différences, 130.

ARGONAUTES de Cram. Espèce de papillon. ex. *Papilio jasio*, etc. *Hist. des Insectes*, III, 393.

ARGOPHYLLUM. Genre 12 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 242.

ARGOUSSIERS (les). Genre 5 de la famille des plantes dites *chalefs*. *Hist. des Plantes*, XI, 223. — L'argoussier rhamnoïde, *idem*. — Celui de Canada. Espèce de France, 2 espèces connues, 225.

ARGULE, *argulus*. Insecte du genre des pseudopodes. ex. *Argulus charon*. *Hist. des Insectes*, III, 18. — Trois espèces, l'argule charon, celui dauphin et celui chevalier : leur description, IV, 277. — Description particulière de l'argule charon, 278. — Description particulière de celui chevalier, 280.

ARGUS (l'). Espèce 57 du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 187 et 245. — Espèce 19 du genre des poissons appelés *chétodons*, XI, 109, 143. — Espèce 25 du genre des poissons appelés *pleuronectes*, 280, 345.

ARGÛS (les). Espèce de papillons, et la manière de les imprimer. *Hist. des Insectes*, I, 314.

ARGÛS (l'). Espèce de faisan, XLII, 217. — Détails sur cet oiseau par Sonnini, 218.

ARGÛSE. Genre 11 des plantes dites *bourrâches*. *Hist. des Plantes*, XVI, 84. — Deux espèces, 85.

ARGYREIOSE. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 153. — Genre 141 des poissons. Une espèce, *le vomer*, XI, 247, 248.

ARILLE (l'). C'est ainsi qu'on appelle l'enveloppe de certaines graines. *Hist. des Plantes*, I, 120. — L'arille considérée comme partie du péricarpe, II, 230.

ARIMANON (l'). Espèce 10 de perruche à courte queue, LXIII, 255.

ARISTÉE (l). Espèce 97 du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 145 et 279.

ARISTÉE (l') bleue. Genre 9 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 119.

ARISTIDES (les). Genre 8 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 111. — Espèces remarquables, 112. — Espèces connues, 113.

ARISTOLOCHES (les), *aristolochiæ*. 4^e ordre, famille 39 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 294. Famille 41 des plantes. *Voyez* leur histoire, XI, 297. — Genre 1. Les aristoloches proprement dites, 298. — Celle à grandes fleurs, 300. — Celle odorante, *idem*. — Celle à gros fruits, 301. — Celle anguicide, 302. — Parti que tirent de cette aristoloché, en Amérique, les charlatans pour duper le peuple, 303. — L'aristoloché syphon, *idem*. — L'aristoloché élevée, 304. — Celle serpentine, 305. — Celle ronde, 306. — Celle longue et celle clématite, 307. — 2 espèces de France, et 29 connues, 308. — Genre 2. Les asarum, 311. — Genre 3. L'hypociste, 313.

ARITHMÉTIQUE. Essai d'arithmétique morale, XXI, 97. — Mesures arithmétiques, 182.

ARLEQUIN (l'). Espèce de colibri, décrit par Sonnini, LIII, 307.

ARMADILLE, *armadillo*. Insecte du genre des clo-

portides. ex. *oniscus armadillo*. *Hist. des Insectes*, III, 43. — (les Armadilles). Genre 9 d'insectes de la famille des cloportes. En quoi ils en diffèrent. VII, 47. — Espèces 10. L'armadille commun, 47. 20. L'armadille mélangé, 48. — 30. Celui tacheté, 49. — 40. Comparaison des glomérus avec les armadilles, 56.

ARMANDILLO. C'est le même animal que le tatou. Voyez ce mot.

ARMARINTHE. Genre 29 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 297. — Trois espèces, et leurs propriétés, *idem*.

ARMENIACA. Voyez ABRICOTIER.

ARMOISES (les) ou absinthés. Genre 141 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 66. — Espèces remarquables, l'armoise argentée, celle arborescente, 68. — Celle odorante et celle citronnelle, 69. — L'armoise de Perse, 70. — L'armoise de Judée, 71. — L'armoise glaciale et celle champêtre, 72. — L'armoise santonique et celle maritime, 73. — L'armoise bisannuelle, 74. — L'armoise absinthe, 75. — L'armoise vulgaire, et l'armoise estragon, 76. — L'armoise de la Chine, 77. — Vingt espèces de France, 78. — 71 espèces connues, 84.

ARMOSELLES (les). Genre 88 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 274. — Quatre espèces connues, *idem*.

ARNAK (la raie). Espèce 15. Voy. le mot RAIE.

ARNIGUES (les). Genre 115 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 413. — L'arnique de montagne ou tabac des Vosges, *idem*. — 4 espèces de France, 414. — 26 espèces connues, 415.

ARNOSERIDE (l') fluette. Genre 11 des plantes dites chicoracées. Espèce de France. *Hist. des Plantes*, XI, 392. — Espèce connue, 393.

AROÏDES (les). Leur anatomie. *Hist. des Plantes*, II, 372. — Les aroïdes ou gouets, famille 13 des plantes. VII, 399. — Genre 1. L'ambrosinie de Bassi, 404. — Genre 2, les zostères, 405. — Genre 3, les gouets, 408. — Genre 4, les calladions, 424. — Genre 5, les calles ou choucalles, 429. — Genre 6, les dracontes,

433. — Genre 7, la québite. 437. — Genre 8, les pothos, 432. — Genre 9, la lagunée de Cochinchine, 441. — Genre 10, la houttuynie à feuilles en cœur, 442. — Genre 11, les oronties, 444. — Genre 12, les acores, 445. — Genre 13, la lézardelle. 448. — Genre 14, les aponogetons, 449. — Genre 15, l'uvirandra, 452. — Genre 16, les potamots ou épis d'eau, 453. — Genre 17, l'hydrogeton hétérophylle, 457. — Genre 18, la ruppie maritime, 459.

AROME (l'), ou le fluide aromatique des plantes. *Hist. des Plantes*, I, 104. — 2 genres d'arome, 105.

AROUNA. Genre 95 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 385.

ARPAILLEUR. Nom qu'on donne à ceux qui vont à la recherche des paillettes d'or XI, 86.

ARRÊTE-BŒUF ou BURGRANDE, *anonis*. Genre 39 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 297.

ARRIAN (l'). Espèce de vautour des Pyrénées, XXXVIII, 128.

ARROCHES (les), ou Chenopodées. Ordre 2^e, famille 33 des plantes. *Hist. des Plantes*, XI, 5. — Leur fruit, 6.

— Leurs particularités, 7. — § 1. Une braie ou un drupe. Genre 1, les phytolaccas, 8. — Genre 2, les rivines, 11. — Genre 3, la microté flexible, 14. — Genre 4, la salvadore de Perse, 15. — Genre 5, la bosé à feuilles de lilas, 16. — § 2. Une noix petite, contenant une ou deux graines, n'adhérant point au péricarpe. Étamine, une à huit. Genre 6, la pétivière alliagée, 17. — Genre 7, les polycnèmes, 19. — Genre 8, les camaphrées, celle de Montpellier, 21. — Genre 9, la galiène d'Afrique, 23. — § 3. Une noix petite, recouverte par le périanthe et contenant une graine adhérent au péricarpe; cinq étamines. Genre 10, les baselles, 24. — Genre 11, l'anredra, 27. — Genre 12, les anabases, 28. — Genre 13, le caroxylum d'Afrique, 30. — Genre 14, les soudes, 31. — Genre 15, la chenolée diffuse, 38. — Genre 16, les épinards, 39. — Genre 17, l'acnide de Virginie, 42. — Genre 18, les bettes ou poirées, 43. — Genre 19, les anserines, 47. — Genre 20, les

arroches proprement dites ; celle halime , 58. — Celle du Bengale , 59. — Celle des jardins ou *bonne-dame*. Espèces de France , 60. — 13 espèces connues. 63. — § 4. Noix petites , recouvertes par le périanthe et contenant une graine adhérent au péricarpe , moins de cinq étamines. Genre 21 , la crucite. 64. — Genre 22 , les axyris , 65. — Genre 23 , les blettes , 66. — Genre 24 , la ceratocarpe des sables , 68. — Genre 25 , les salicornes , 69. — § 5. Noix petite , non recouverte par le périanthe. Genre 26 , les corispermes , 72.

ARROSOIRS (les). Genre 170 des mollusques dits *acéphales*. *Hist. des Mollusques* , VI , 449. — L'arrosoir de Java , 452.

ARSENIC, considéré comme demi-métal , X , 222. — pourquoi on a appelé cobalt les mines , dont l'arsenic fait la partie dominante , XII , 226. — L'arsenic considéré comme sel métallique , 273. — L'arsenic bleu , 274. — L'arsenic artificiel , 278. — L'arsenic vierge , 279. — Lieux où il se trouve , 280. — Lieux où se rencontre le plus souvent l'arsenic , 283. — Métaux avec lesquels il s'unit , 284. — C'est une des substances les plus actives du règne minéral , 287. — D'où vient sa puissance , *idem*. — Il est un des plus puissans minéralisateurs , 220. — Comment il agit comme poison , 291. — Il occasionne la phthisie chez les ouvriers qui le travaillent , *idem* (note). — Son état dans les mines métalliques , 293. — Manière de le recueillir et d'éviter ses vapeurs , 294. — Épreuves auxquelles les chimistes ont soumis la poudre arsenicale , 295. — Ce que c'est que le verre d'arsenic , et comment il se forme , 297. — Mines qui fournissent au commerce la plus grande quantité d'arsenic , 298. — Sur les différentes espèces d'arsenic , XVI , 177.

ART. Ses moyens pour altérer une espèce et en abréger la durée. *Hist. des Poissons* , I , 379. — L'homme a créé l'art , 387.

ARTEDIA. Genre 40 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes* , XXI , 331.

ARTENISIA. Voyez ARMOISE. *Hist. des Plantes* , XIII , 66.

ARTICHAUTS (les). Genre 42 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 83. — L'artichaut commun, 84. — Celui violet, celui rouge, celui blanc, celui sucré de Gènes, 85. — Détails sur leur culture, 86 — Comment on les conserve, 88. — L'artichaut cardon, 90. — 8 espèces connues, 91. — Artichauts de Jérusalem et d'Espagne, XIV, 284.

ARTICULATION singulière dans un squelette, XVIII, 195.

ARTILLERIE. Effets qu'elle produit sur les poissons, dans les combats de mer, *Hist. des Mollusques*, II, 353, 354.

ARTS (les). Ceux utiles, auxquels les sciences ont donné naissance, se sont conservés après la perte de celles-ci, IV, 19. — Les arts ont apporté de grandes modifications dans le transport et la colonisation des animaux. *Hist. des Mollusques*, II, 304.

ARADES (les). Insectes de la famille des cimicides. *Hist. des Insectes*, XII, 236. — Genre 270. Sa description, 246. — 7 espèces, 249.

ARUBA. Genre 11 des plantes *rutacées*. *Hist. des Plantes*, XVIII, 111.

ARUNCO (l'). Nom donné à une espèce de grenouille du Chili, découverte par Molina. *Hist. des Reptiles*, VIII, 134.

ARUSET (l'). Espèce 10 du genre des poissons appelés *holacanthés*. *Hist. des Poissons*, XI, 204, 215.

ASARUM (les). Genre 2 de la famille des plantes dites *aristoloches*. *Histoire des Plantes*, XI, 311. — Espèces de France et espèces connues, 313.

ASBESTE (l'). Substance talqueuse. Ses différences avec l'Amianthe, XIII, 222. — Son incombustibilité, 224, 229. — Ses mélanges, 226. (*Voy. AMIANTHE*).

ASBESTOÏDE (l'). Espèce de pierre, XVI, 298.

ASCAGNE (l'). Espèce de singe, décrit par *La-traille*, XXXVI, 95.

ASCALAPHE, ascalaphus. Insecte du genre des myrméleonides. Ex. *Ascalaphus barbarus*. *Hist. des Insect.* III, p. 288. — Genre 311 d'insectes de la famille des fourmillions. Leur description, XIII, 27. — Trois espèces, 28.

ASCIDIÉS (les). Genre 104 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 157. — Leur mode de fécondation et de génération, 158. — Leurs mœurs, 159. — Six espèces, 161.

ASCIRUM. Genre 1 des plantes millepertuis. *Hist. des Plantes*, XVIII, 281.

ASCITE (l'). Espèce 5 du genre des poissons appelés *pimelodes*. *Hist. des Poissons*, XII, 44, 55. — Comment ses œufs éclosent, 56.

ASCLEPIAS. Genre 15 des plantes dites apocins. *Hist. des Plant.* XVI, 181. — Six espèces, et leurs propriétés, 182.

ASELLE, *asellus*, insecte du genre des aselottes. *Ex. oniscus aquaticus. Histoire des Insectes*, III, 41. — VI, 348. — L'aselle ordinaire, seule espèce connue sous le nom de *squille aselle*, décrite par Degeer, 350. — Sa fécondation, 356.

ASELLOTES, *asellota*, insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 41; et V, 195. Famille 1 des insectes tétracères. — Description, VI, 346.

ASFÜR (l'). Espèce 6 du genre des poissons appelée *pomacanthes*. *Hist. des Poissons*, XI, 191 et 199.

ASIDE, *asida*, Insecte du genre des pimeliaires. *Ex. opatrum griseum. Hist. des Insectes*, III, 167. — Genre 130 des insectes, espèce 8 de la famille des pimeliaires. *Hist. des Insectes*, X, 269. — 2 espèces, 270.

ASIE. Ce qui pourroit arriver, si on coupoit l'isthme qui sépare l'Asie de l'Afrique, I, 133. — Quelles sont les plus hautes montagnes de l'Asie, II, 6. — Quels sont les plus grands fleuves de l'Asie, 83. — A la haute Asie appartient la première souche ou la tige commune des connoissances humaines, IV, 17. — Description de tous les peuples qui habitent l'Europe ou l'Asie, XX, 64, jusque et compris la page 238.

ASILE, *asilus*. Espèce de papillon. *Hist. des Insect.* III, 433. — Asiles-bourdons, luciformes. *Ex. Asilus gibbosus, aureus, idem.* — Asiles frelons, crabroniformes, 434. — Asiles nigripennes, *idem.* — Asiles tipuloides, 435. — Genre 486 d'insectes de la famille des asiliques, XIV, 307.

ASILIQUES, *asilici*. Espèce de papillon. *Histoire des Insectes*, III, 432. — V, 331. — Famille 88 d'insectes, XIV, 305. — Genre 485, les laphries, 306. — Genre 486, les asiles, 307. — Genre 487, les dasypogons, *idem*. — Genre 488, les dioctries, 308. — Genre 489, les gonypes, 309.

ASINDULES (les). Genre 470 d'insectes de la famille des tipulaires. *Hist. des Insectes*, XIV, 290.

ASIRIQUE, *asiraca*. Espèce d'insecte. *Ex. Del phax longicornis*. *Hist. des Insectes*, III, 259 — Genre 293 d'insectes de la famille des cicadaïes, XII, 316 — 9 espèces, 317.

ASOTE. Espèce 3 du genre des poissons appelés silures. *Hist. des Poissons*, XII, 6 et 20.

ASPALATHE. Genre 31 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 281. — 2 espèces, 282. — Genre 89 des mêmes plantes, 2 espèces, 380. — C'est une répétition du genre 31, décrit pag. 281.

ASPALAX. Espèce de quadrupède, XXV, 299. — *Voy. ZEMMI*. — Espèce de rat-taupo. *Voy. RAT*.

ASPARAGOIDES (les). Leur anatomie. *Hist. des Plantes*, II, 386.

ASPE (l'). Espèce 51 du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 89, 195. — Son poids et sa nourriture, 196.

ASPERGES, *asparagus officinalis*. Asperge commune, plante monocotylédone; sa coupe transversale. *Hist. des Plantes*, I, 374. — Ordre 2, famille 15 des plantes monocotylédones; leur description et leurs différentes espèces, volume IV de la même histoire, 127. — Famille 15 du second ordre des plantes, composée de 21 genres, distribués en quatre sections, VIII, 88. — Section 1, ovaire libre, fleurs hermaphrodites. Genre 1, les dragoniers, 90. — Genre 2, la dianelle, 97. — Genre 3, le ripogonum, 99. — Genre 4, le floscopa, 100. — Genre 5, la flagellaire, 101. — Genre 6, les asperges proprement dites, une vingtaine d'espèces, 103. — Espèces remarquables: celle à feuilles aiguës, celle distorte, 104. — Celle blanchâtre, celle hérissée et celle verticillée, 105. — L'asperge com-

mune, qui est de trois espèces; savoir, celle maritime, celle à feuilles menues, et celle cultivée, 106. — Variétés de celle-ci; savoir, l'asperge de Marchiennes et de Hollande, l'asperge violette et celle touteverte, 108. — Sur la multiplication et la récolte des asperges, 109. Comment on les mange, et leur usage en médecine, 110. — Espèces de France et espèces connues, 111. — Genre 7, les calixènes, 113. — Genre 8, la philesie, 115. — Genre 9, l'echmée, 116. — Genre 10, l'herberia, 117. — Genre 11, les medeoles, 118. — Genre 12, les trillium, 119. — Genre 13, la parisette, 121. Genre 14, les convallaires ou les muguets, 123. — § 2. Ovaire libre, fleurs dioïques. — Genre 15, les iragons, 130. — Genre 16, les salespareilles, *smilax*, 134. — Genre 17, les ignames, *dioscorea*, 140. — § 3. Perianthe adhérent à l'ovaire; fleurs hermaphrodites. — Genre 18, l'oncus, 144. — § 4. Perianthe adhérent à l'ovaire, fleurs dioïques. — Genre 19, les ombium, 146. — Genre 20, les taminiers, 147. — Genre 21, les rajania, 149. — Aspect général de la famille des asperges, IX, 413.

ASPERUGO. Voy. RAPETTE.

ASPERULES (les). Genre 5 des plantes rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 318. — Espèces remarquables, celle des champs, 319 — Celle rhubarbe, *idem*. — Neuf espèces de France, 320. — 13 espèces connues, 322.

ASPHALTE. Espèce de bitume, IX, 19, 198. — Sur l'asphalte des Grecs, 208. — Lieux où il se trouve, 210. — Description de celui d'Alais, 211.

ASPHODÈLES (les), *asphodeli*. Second ordre, famille 21 des plantes monocotylédones proprement dites. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 156. — Genre ayant des rapports avec la famille des asphodèles, 164. — Famille 21 des plantes, et leur histoire, VIII, 300. — § 1. Fleurs en épi, périanthe tubulé, racines fibreuses. — Genre 1, les aletis, 301. — Genre 2, le veltheimia, espèce remarquable, 304. — Genre 3, le sansevieria, espèce connue, 306. — Genre 4, le millea à deux fleurs, 307. —

Genre 5, les aloës, 308. — § 2. Fleurs en épi, périanthe à six divisions profondes et portant les étamines à leur base; racines fibreuses et tubéreuses, 317. — Genre 6, les anthériques, 318. — Genre 7, les asphodèles, proprement dites, 333. — Espèce remarquable : l'asphodèle rameuse, 334. — Espèces de France, 335. — Espèces connues, 336. — § 3. Fleurs en épi, racine bulbeuse, périanthe, calice, corolle tubulé à la base, 337. — Genre 8, les basilées, *idem*. — Genre 9, les jacinthès, 339. — Genre 10, les drimia, 346. — Genre 11, les lachénales, 348. — Genre 12, le phormium, vulgairement le lin de la nouvelle Zélande, 352. — Genre 13, les massonia, 355. — Genre 14, les pontédéria, 356. — Genre 15, les cyanelles, 358. — Genre 16, les albuca, 359. — Genre 17, les scilles, 363. Genre 18, les ornitogales, 370. — Genre 19, les eriospermum, 380. — Genre 20, les auxi, 381. — Genre 21, les tulbagia, 406. — Aspect général de la famille des asphodèles, IX, 420.

ASPIC (l'). Espèce de vipère commune. *Hist. des Reptiles*, VI, 103. — Celui du pays de Vaud, 104. — Variétés sur l'aspic, 140. — La vipère ammodyte est la même que l'aspic, 193. — Détails sur l'espèce d'aspic qui donna la mort à Cléopâtre, 213, 215.

ASPIC (l'). Espèce de lavande commune. *Hist. des Plantes*, XV, 323.

ASPIDOPHORES (les). Genre 83 des poissons dits osseux; leurs caractères distinctifs, premier et second sous-genre. *Histoire des Poissons*, VIII, 265. — Le cotte armé ou l'aspidophore armé, 266. — Le lisiza, seconde espèce, 271.

ASPISURE (l'). Poisson du 3^e ordre de la première division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 152. — Genre 138 des poissons, le sohar, XI, 236, 237.

ASPLENIUM. *Voy. CÉTÉRACH*.

ASPREDE (l'). Espèce 8 du genre des poissons apélés silures. *Hist. des Poissons*, XII, 7, 27.

ASSASI (l'). Espèce 24 du poisson baliste. Sa nomenclature et sa description. *Hist. des Poissons*, IV, 286.

ASSONIA.

GÉNÉRALE.

81

ASSONIA. Genre 33 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 212.

ASTATE, *astata*. Insecte du genre des sphex. *Ex. Tiphia abdominalis*. *Hist. des Insectes*, III, 336. — Genre 394 d'insectes de la famille des sphéguines, XIII, 292, 297.

ASTERES (les). Genre 98 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 309. — L'astère frutescente, 310. — Celle amelle et celle de la Nouvelle-Angleterre, 311. — Celle à grandes fleurs, ou celle de la Chine, vulgairement la reine-marguerite, 312. — 4 espèces de France, 316. — 102 espèces connues, 317.

ASTERIE. Espèce de pierre, XVI, 279.

ASTICOT. Nom d'un aliment dont on nourrit les jeunes faisans, à défaut d'œufs de fourmis, XLII, 181 (note).

ASTRAGENE. Genre 2 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 321.

ASTRAGOLOÏDE. Genre 61 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 337. — 2 espèces. *Id.*

ASTRANCE. Genre 43 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 338. — Deux espèces, et leurs propriétés, 339.

ASTRAPÉE, *astrapæus*. Insecte du genre des staphylinés. *Ex. Astrapæus ulmi*. *Hist. des Insectes*, III, 130. — Genre 74 des insectes; espèce de la 1^{re} famille, les staphyliniens, IX, 288.

ASTRONOMES. Ils ont été les premiers naturalistes. *Histoire des Mollusques*, IV, 348.

ASTRONOMIE. Progrès inconcevables de l'ancienne astronomie, IV, 12, 159. — Connaissance du premier peuple de l'univers en astronomie: il a trouvé la période lunisolaire de 600 ans, 157. — Temps qu'il a fallu d'études astronomiques pour trouver cette période, 12. — Eloge de l'histoire de l'Astronomie ancienne, par M. Bailly, 14. — Histoire abrégée de l'Astronomie, 159.

ATAJA (l'). Espèce 2 du genre des poissons appelés holocanthes. *Hist. des Poissons*, XI, 201, 208.

Tab. TOME I.

F

ATHAMANTHE. Genre 31 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 299. — 4 espèces, 300. — Leurs propriétés, 301.

ATHANASIES (les). Genre 148 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 104. — 21 espèces connues, 106.

ATHEUCUS. Insecte du genre des coprophages. *Atheucus sacer*. *Hist. des Insectes*, III, 140. — Celui sacré. Pourquoi ainsi appelé, X, 86. — Ses travaux, 98. — Genre 200. Sa description, 92. — 7 espèces, 94.

ATHERINES (les) Genre 192 des poissons. *Hist. des Poissons*, XII, 368, 370. — Espèce 1^{re}, l'atherine joel, *idem* — *L'atherine menidia*, 368, 374. — *L'atherine sihama*, 368, 375. — *L'atherine* gras-d'eau, 369, 375.

ATICK (l'), par Sonnini. Oiseau de la baie d'Hudson; espèce de bouvreuil, XLIX, 208.

ATINGUE. Espèce de poissons. (*Voy. DIONON*).

ATLANTIDE (l'île). Remarque sur sa submersion, III, 411.

ATMOSPHERE solaire. Preuve de son existence, III, 232.

ATOLLONS. Nom qu'on a donné aux provinces qui partagent les îles Maldives, I, 355.

ATOME, atomes. Insecte du genre des tiques. Ex. *Acarus parasiticus*. *Hist. des Insectes*, III, 68.

ATOTOTL (l'). Petit oiseau du lac de Mexico, LXIV, 110.

ATRACTOCÈRE, attractocerus. Insecte du genre des malacodermes. *Hist. des Insectes*, III, 109. — Genre 48 des insectes, 12^e espèce de la famille des malacodermes. IX, 137.

ATRACTYLES (les). Genre 33 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 58. — L'espèce de France et deux espèces connues, 59.

ATRAPHACES (les). Genre 2 de la famille des plantes dites oseilles, *Hist. des Plantes*, XI, 79. — Trois espèces connues, 80.

ATROPA. *Voy. BELLADONE.*

ATTAGAS (l'). Espèce de gelinotte, bien différente du

francolin d'Oline, XLII, 18. — Il est fort criard et caquette presque toujours, 19. (note) — Ce qu'en on dit les anciens, 20. — Son histoire d'après les mémoires modernes, 23. — Sa description, 25. — C'est un oiseau de montagne, 28. — Attagas domestiques, 29. — L'attagas blanc; ses habitudes, et lieux où il se trouve, 33. Ses différentes espèces, 35.

ATTAGÈNE; *attagenus*. Insecte du genre des nécrophages. ex. *dermestes trifasciatus*. *Histoire des Insectes*, III, 121. — (Genre 69 d'insectes, 10^e espèce de la 10^e famille, les nécrophages. IX, 243. 5 espèces, 244.

ATTELABE, *attelabus*. Insecte du genre des recticornes; ex. *attelabus coryli*. *Hist. des Insectes*, III, 196. — Insectes particuliers qui sont très-nuisibles aux pommiers, aux poiriers et à la vigne, XI, 66. — Le meilleur expédient pour diminuer le ravage de ces insectes, 68. — Ils forment le 183^e genre des insectes parmi les charançonites, 81. — Leurs différences, 82. — 22 espèces, 83.

ATHIS (l'), par Sonnini. Espèce d'étourneau, XLV, 98.

ATINGACU (l'), ou le Coucou cornu. Oiseau du Brésil, LIV, 108.

ATTRACTION. Attraction mutuelle des planettes, I, 201. — L'impulsion a besoin, pour opérer, du concours de l'attraction, IV, 188. — Comment s'opère le changement d'attraction en répulsion, 196. — La force expansive pourroit bien n'être réellement que la réaction de la force attractive, 197. — Explication des effets de l'attraction, 198 (note). — Preuve que l'attraction universelle agit sur la lumière, 202 (note). — Loi générale de l'attraction commune à toute la matière, 287. — Réflexions sur la loi de l'attraction, 353. — Newton a établi cette loi par ses phénomènes même, 354. — La loi de l'attraction suit exactement la raison inverse du carré de la distance, 356. — Calculs à ce sujet, 367. — Preuves que la loi de l'attraction ne peut être exprimée que par un terme, et non par deux ou par plusieurs, 367, 369. — L'attraction réciproque entre toutes les

parties de la matière, est la seule force primitive dans la nature, XIV, 295 — Ce qu'on conçoit des effets de cette puissance, 298. — Matières où elle réside, 331.

ATUN (l'). 10^e espèce du genre des poissons appelés scombres *Hist. des Poissons*, XIII, 287. — Sa description, 288.

ATYS (l'). Espèce de singe de l'ancien continent, XXXVI, 97.

AUBIER. Ce que c'est, et sa transformation en bois, VII, 25, 28. — Expériences à ce sujet, *idem*. — Les chênes crus dans les terrains maigres ont plus d'aubier que ceux crus dans les bons terrains. Preuves, 26. — Sur le double aubier, ou le faux aubier, et premier effet des gelées d'hiver, 38. — Changement du liber en aubier, et de celui-ci en bois; expériences à ce sujet par Duhamel. *Hist. des Plantes*, I, 175. — Différentes opinions à ce sujet, 176. — Ce qu'on appelle faux aubier, 181. — Sur l'aubier, 377.

AUCUPA. Genre 28 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 241.

AUGITE. Espèce de pierre, VI, 267.

AULOSTOMES (les) Genre 189 des poissons; celui chinois. *Hist. des Poissons*, XII, 353, 354. — Sa description, 355.

AULX (les). *Allium*. Genre 20 des plantes dites asphodèles *Hist. des Plantes*, VIII, 381. — 55^e espèce, 382. — Celles remarquables, dont l'ail poireau, 384. — 2^o. l'ail cultivé ou commun, 385. — Ses propriétés et ses dangers, 386. — L'ail rocambole ou la rocambole, l'ail jaune, 388. — L'ail échalote, ou l'échalote; l'ail d'ours, 389. — L'ail ciboule, ou la ciboule; la civette, 390. — L'ail oignon, 391. — L'usage de toute espèce d'ail est nuisible, 393. — L'ail moly, *idem*. — Espèces d'ail de France, 394. — 55 espèces connues, 400.

AUNE (l') Espèce de bouleau. *Voyez* ce mot.

AURA (l'), ou OURUA. Espèce de vautour, XXXVIII, 178. *Voyez* URUBA.

AURANTIA. *Voyez* ORANGERS.

AURÉOLE (l'), par Sounini. Oiseau de Sibérie, du genre des bruants, XLIX, 122.

AURICULAIRE. Genre 16 des champignons. *Hist. des Plantes*, III, 11.

AURICULES (les). Genre 66 des mollusques dits gastéropodes *Histoire des Mollusques*, V, 362. — Leur description, 363. — Quatre espèces, 364. — Description de celle dite *myosote*, par Draparnand, 366.

AURIFLAMME (l') 4^e espèce du genre des poissons appelés mulles. *Hist. des Poissons*, IX, 63 et 85. (*Voy. AUBIER*).

AURITE (l'). 3^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 113, 170.

AUROCHS (l'). Sa différence avec le bison, XXIX, 89. — L'urus ou l'aurochs, est le même animal que notre taureau commun dans son état naturel et sauvage, 112. — Le bison ne diffère de l'aurochs que par des variétés accidentelles, et par conséquent ils sont tous deux de la même espèce que le bœuf domestique, 113. — Identité d'espèce de l'aurochs et du bison, et description du premier par Pallas, 140 (note). — La race des aurochs ne se trouve actuellement qu'en Moscovie, 147. — Laquelle des deux races de l'aurochs ou du bison est la race première, la race primitive des bœufs, 156. — *Voyez BUFLE* (le).

AURONNE (l') mâle; celle de jardin. *Hist. des Plantes*, XIII, 69.

AURORE BORÉALE. Effets de quelques-unes, IV, 344.

AUTEURS. Leur division en deux classes, XXII, 39.

AUTEURS (Catalogue des) en botanique. *Hist. des Plantes*, VI, 183.

AUTOMNAL (l'). Oiseau de Surinam, du genre des linottes, par Sonnini, XLVII, 329.

AUTOUR (l'). Oiseau de proie qui ressemble à l'épervier par ses habitudes, XXXIX, 16. — Caractère qui lui est commun ainsi qu'aux pie-grièches, 17. — Manière de le connoître dans ses deux âges, 18, 25. — Comment on le prend, 19. — Lieux qu'il habite, 20. — Ses variétés, 22. — Il est difficile à apprivoiser, 24. — Sa cruauté, 45. — L'autour du Japon, décrit par H. Latham, 70. — L'autour de Java, décrit par le

même, 72. — Autre espèce décrite par Var-Ernest, 73. — Le petit autour de Cayenne, 74. — Le grand autour de Cayenne, 76. — Sa description par Mauduyt, 77.

AUTRUCHE (l'). Ce que deviennent les pièces de monnoies dans son estomac, XXXVII, 96. — Sa ponte, 169, note. — Ses rapports avec les quadrupèdes, XL, 212. — Recherches littéraires sur son ancienneté, 215. — Elle est le plus grand des oiseaux. Son poids, 218. — Ses ailes et sa conformation extérieure, 220. — Sa conformation intérieure, 223. — Les organes de la digestion, 225. — Propriétés de son urine, 230. — Viscères du bas - ventre, 231. — Organes de la génération, 234. — Organes de la respiration, 241. — Nature de l'épiglotte, et le larynx, 242. — Son cerveau, 243. — Ses sens externes, 244. — Sa place est de faire la nuance entre le quadrupède et l'oiseau, 245. — Sa fécondité, 246. — Son accouplement, 248. — Temps de sa ponte, 249. — Plusieurs expériences sur ses œufs, 250. — Leur nombre, 253. — Ses plumes, 256. — Vermine dans les plumes des oiseaux, 257. — Sa digestion, 258. — Dans quel sens on peut dire que l'autruche digère le fer, 259. — C'est parce qu'elle est privée du sens du goût, qu'elle avale des matières qui ne peuvent la nourrir, qui peuvent même lui être préjudiciables, 261. — Ce que deviennent ces matières dures. Sentiment de Perrault à ce sujet, 263. — Sentiment et preuves de Vallisnieri à ce sujet, 264. — Vertus qu'on a attribués à plusieurs des parties de l'autruche, 267. — Quel pays elle habite, 268. — Pourquoi on ne la trouve pas en Europe, 270. — Il n'y a guère de sujet d'histoire naturelle qui ait fait dire autant d'absurdités que l'autruche, 271 (note). — Peuples struthophages ou mangeurs d'autruches, 272. — Anecdotes à ce sujet, *idem*. — Trafic des œufs de l'autruche, 274. — Usages qu'en font les Turcs, 275, notes. — Mantèque, espèce d'huile figée qu'on tire de l'autruche par un trou fait à sa gorge, 276. — Trafic de sa peau et usage de ses plumes, 277. — Elle l'apprivoise aisément, 280. — On la monte comme un

cheval, 281. — Histoires à ce sujet, dont une prouve qu'elle court plus vite qu'un cheval, 282. — Industrie qu'il faut employer pour la chasser et la prendre, 284. — Manière dont les struthophages la prenoient, 285. — Ses habitudes, 187. Manière dont elle court, 286. — Sur l'ouïe de l'autruche, 288. — Sa voix, et comment, lors même qu'elle court le plus vite, on distingue le mâle de la femelle, 289, (note). — Pourquoi on a intérêt de chasser cet oiseau, 290, (note) — L'autruche de Magellan, ses différens noms, 291. — Lieux où elle se rencontre, 296 — Sa grosseur, 299. — Description de son corps, 301. — Rapidité de sa course, 302. — Sa nourriture, 303. — Sa propagation; erreur à ce sujet, et d'où elle vient, 304. — Sa ponte, 305. — Sa chair est bonne à manger, 307. — Ses plumes, *idem*. 308, (note). — Description de l'autruche de Magellan, observée par Molina au Chili, 309, (note).

AUTUMNAL (l'). Espèce 10 du genre des poissons appelés corrégonés. *Hist. des Poissons*, XII, 223, 244.

AVALETTE (l') Morceau de bois qui sert à la pêche duthon. *Hist. des Poissons*, VIII, 52.

AVALURE (l'). Espèce de maladie la plus ordinaire et la plus funeste des serins de Canarie, XLVII, 251.

AVERHOA. Voyez CARMBOLIER.

AVERANO (l'). Oiseau du Brésil, du genre des corélingas, XLIX, 321.

AVICULES (les). Genre 127 des mollusques dits *acéphales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 286. — Leur caractère générique, 287. — L'avicule perlière, huître perle et mère-perle, 291. — Deux espèces, 298. — Voy. PERLES.

AVENTURINE. Espèce de pierre, XII, 411; XIII, 80.

AVICENNES (les). Genre 12 des plantes dites *gatliliers*. *Hist. des Plantes*, XV, 218. — Trois espèces connues, 219.

AVEUGLE DE NAISSANCE (opération de Chéselden sur un), XIX, 417. — Sur les aveugles nés, 423.

AVIS VENATICA. Oiseau décrit par Belon, *LXIV*, 103.

AVOCATIER (l'). Espèce de laurier. *Voyez. LAURIER.*

AVOCETTE (l'). Oiseau singulier par le renversement de son bec, *LXI*, 6. — Le principal fonds de sa nourriture, 7. — Sa description, 8. — Lieux qu'il fréquente, 9. — Ses voyages, 10. — Sa couleur grise dans le 1^{er} âge, 12. — La grande avocette, par Sonnini, 14.

AVOINES (les). Genre 64 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 327. — Espèces remarquables, 328. — Espèces de France, 334. — Espèces connues, 336.

AVOIRA (l'). *Voy. ELAIS.*

AVORTEMENT. Observation sur le produit de celui d'une négresse ; il eut lieu dans les premiers jours de la conception, et la matrice fut disséquée, *XVIII*, 161. — Ses différences avec l'accouchement, 214.

AWATCHA (l'). Oiseau du genre des figuiers, qui habite le kamtschatka, *LII*, 108.

AXIA (l'). Genre 7 de la famille des belles de nuit. *Hist. des Plantes*, XI, 293.

AXINÉES. Nom donné par M. Poli à l'animal qui habite les mollusques petoncles. *Hist. des Mollusques*, VI, 405.

AXIS (l'). Animal connu sous les noms vagues de biche de Sardaigne, et de cerf du Gange, *XXIX*, 294. — Sa description par Belon, 295. — Ce qui le distingue du cerf et du daim, 296. — Il fait une nuance intermédiaire entre les deux, 299.

AXYRIS (les). Genre 22 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des plantes*, XI, 65. — Espèces connues, 68.

AYA (l') 7^e espèce du genre des poissons appelés bodians. *Hist. des Poissons*, X, 302, 315.

AYACA (l'). Oiseau du Brésil, de l'espèce des spatules, *LXIV*, 108.

AYE-AYE (l'). Exclamation des habitants de Madagascar, que Sonnerat a appliquée à un animal qui se trouve dans la partie ouest de cette île, *XXXIII*, 99.

— Son caractère principal. un des plus singuliers, 100.

— Ses dimensions et sa couleur, 101.

AYENIA. Genre 35 des plantes malvacées, ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 213. — Trois espèces, 214.

AYLANTHUS. Genre 25 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 198.

AZALÉES. Genre 3 des plantes dites rosages. *Hist. des Plantes*, XVI, 222. — Cinq espèces et leurs propriétés, 225.

AZEDARACHS (les), *melicæ*. § 1. Feuilles simples; leurs différens noms. *Hist. des Plantes*, VI, 5. — § 2.

Feuilles composées; leurs différens noms, 9. — Genres qui ont des rapports avec la famille des azedarachs, 13.

— Famille 3 des plantes acotyledonnes. § 1. — Feuilles simples. Genre 1. winterania ou canelle blanche, XVIII, 239. — Genre 2. Symphonia, 241. — 3^e tin, 242. — Genre 4. Geruma, *idem*. — 5^e. quivisia, et 6^e. turrea, 243. — § 2. Feuilles composées. Genre 7, ticorea, et 8^e, sandoricum. Genre 9, trichilia, et 10^e, elcaja, 245 — 11^e guarea, et 12^e ekebergia, 246. — 13^e azedarach, 2 espèces et culture, 247. — 14^e aquilicia, et § 3. Genres rapprochés des azedarachs, genre 15, swietenia, 248. — 16^e cedrela, 249.

AZEL. Poisson qui est fort friand d'ambre et qui meurt après en avoir mangé. Les pêcheurs lui fendent alors le ventre et en tirent l'ambre. *Histoire des Molusques*, I, 342.

AZIERS (les). Genre 70 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 90. — 6 espèces connues, 91.

AZORELLA. Genre 5 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 348.

AZUR (le petit) ou gobe-mouche-bleu des îles Philippines. Espèce 7. L. 81.

AZURIN (l'). Espèce de merle de la Guiane, XLVI, 295. — Sa description, 296. — On le trouve aussi placé parmi les fourmilliers, XLIX, 344.

AZUROR (l'). Espèce 1 des poissons *cæcio*. Sa description. *Hist. des Poissons*, VIII, 32.

AZURUX (l'). Oiseau du Canada, espèce de bruant, XLIX, 103.

B.

BABIROUSSA (le). Espèce de sanglier, XXXI, 231. — Sa description, 232. — Ses défenses, 233. — En quoi il diffère du sanglier, 235. — Lieux où il se trouve, 236.

BABOUCARD (le). Oiseau de la première espèce des martins-pêcheurs de moyenne grandeur de l'ancien continent, LVI, 227.

BABOUINS (les). Troisième espèce de singe, XXV, 53. — Il a été pris mal-à-propos pour l'hyène, XXVII, 8, 17. — Babouins, le papion, ou babouin proprement dit, le mandrill, et l'ouanderou, XXXV, 11. — Le magot ou cynocephale fait la nuance entre les singes et les babouins, 12. — La papion ou babouin proprement dit, 222. — Ce qu'a dit Sparrman des babouins, 234, (note). — Celui des bois, 237. — Trois espèces, 238. — Celui à longues jambes, 240. — Le mandrill, 248. — Le babouin à museau de chien, 243. — Le singe de Moco est le même, 282. — Le babouin à queue très-courte, XXXVI, 230. — Le babouin à queue de porc, 232.

BACCHANTES (les) Genre 91 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 290. — La bacchante à feuilles d'iva, 291. — Celle de Virginie et celle du Brésil, 292. — 14 espèces connues, 293.

BACCILLE. Genre 3 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 298. — Trois espèces et leurs propriétés, 299.

BACHA (le). Oiseau, espèce de buse de l'Afrique australe, XXXVIII, 295. — Sa description et ses habitudes, 294.

BACKELÉYS. Espèce de bœufs dont les Hottentots se servent pour la guerre et pour garder les troupeaux, XXIX, 130.

BACKER (le), où begeteur des habitans d'Oeland et de Gothland, espèce d'hirondelle de mer, LXIV, 119. — Sa description et son instinct, 120.

BACLANS (les). Nom que l'on donne aux cormorans

qui habitent les lacs des environs de Selenginskoi, LX, 58.

BACOPA. Genre 4 des plantes dites *portulacées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 369.

BACTRIS (les). Genre 7 des palmiers; leur description. *Hist. des Plantes*, VIII, 57. — Espèces remarquables, le bactris de la Guiane, 58. — Le bactris élevé, 2 espèces connues, 59.

BACULITES (les) Genre 11 des cephalopodes. *Hist. des Mollusques*, V, 33. — Leur description, 34. — La baculite vertébrale, 35.

BADAMIERS. Genre 10 de la famille des plantes dites *chalefs*. *Hist. des plantes*, XI, 235. — Le badamier catoppa, 236. — Celui des Molusques et celui à feuilles étroites, 237. — Celui au vernis, 238. 5 espèces connues, 239.

BADIANE Voy. ILlicyUM.

BADINAGE (le). Nom qu'on a donné à une chasse des canards en Lorraine, LXI, 306.

BAENAK (le). Espèce 19 du genre des poissons appelés *bodians*. *Hist. des Poissons*, X, 307, 323.

BAGASSIER (le) de la Guiane. Genre 31 de la famille des *orties*. *Hist. des Plantes*, X, 164. — Espèce connue, 165.

BAGLAFECHE (le). Oiseau d'Abyssinie, de l'espèce des gros-becs, XLVII, 53. — Singularité de son nid, *idem*. — Sa conformité avec le toucan - courvi, *idem*.

BAGRE (le) Espèce 1 du genre des poissons appelés *pimelodes*. *Hist. des Poissons*, XII, 43.

BAGUENAUDIER. Genre 62 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 338. — 4 espèces et leurs propriétés, 339.

BAIE DE HUDSON. Sa température, II, 168. — Ce que dit l'auteur de l'histoire des Deux-Indes, de cette baie, qu'on regarde comme la route la plus courte pour aller de l'Europe aux Indes Orientales, et aux contrées les plus riches de l'Asie, 176. — Les eaux de cette baie communiquent avec la mer Pacifique, IV, 181.

BAIES (les). Impossibilité de les définir d'une manière précise. *Hist. des Plantes*, II, 77. — La baie,

bacca, est composée de plusieurs noix ligneuses, 212.
— Autres espèces de baies, 213.

BAIKAL (le). Nom donné à un poisson osseux du genre des comephores. Sa description. *Hist. des Poissons*, VI, 189.

BAILLAGE DE LA MONTAGNE. Partie de la Bourgogne. Sa description, I, 358.

BAILLEMENT. Quelles en sont les causes, XVIII, 399.

BAILLÈRES (les) TRIKIS. Genre 183 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 200. — Trois espèces connues, *idem*.

BAINS DE St.-FILIPPO, près de Sienne, célèbres par la singulière manufacture de médailles et de bas-reliefs qu'y a établie le docteur Leonardo Vegni, par la poudre calcaire, VIII, 303.

BAJAD (le). Espèce 17 du genre des poissons appelé pimélodes. *Hist. des Poissons*, XII, 66.

BAKKA-MUNA (le). Espèce de chouette de Ceylan, XI, 154. — Sa description, 155.

BALANÈS pour peser le fer, et même la chaleur, VI, 44. — Balance contraire pour peser des boulets rouges refroidis, 46.

BALANES (les). Genre 176 des mollusques, dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 473. — Le balane-tulipe, 474.

BALBISIES (les). Genre 202 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 246. — Une espèce connue, 247.

BALBUZARD (le). Oiseau de proie ou aigle de mer, XXXVII, 274. — Sa différence d'avec les aigles, 275. — Ses habitudes, 277, 282. — Erreurs à son sujet, 279. — Pourquoi on l'a appelé aigle de mer, 280. — Sa vue, 281. — Aventure à ce sujet, 284. (note). — Description de ses parties intérieures, 287. — Ses variétés, 288. — Erreurs d'Aristote et de Pline à ce sujet, 299. — Le balbuzard de la Caroline, XXXVIII, 76.

BALE (la). Ce que c'est *Hist. des Plantes*, II, 193.

BALÉINES (les). Les anciennes étoient plus grosses que celles d'aujourd'hui, III, 389. — Leur existence postérieure à celle des éléphants, 391. — Des auteurs regardent l'ambre gris comme des déjections de la baleine, IX, 252. — Remarque des pêcheurs à cet égard, 254. — Jamais les baleines n'attaquent les vaisseaux; anecdote à ce sujet. *Hist. des Mollusques*, II, 317, 318. — Sur la pêche des baleines et sur les combats qu'elles livrent aux poulpes, 332, 348. — Description de son combat avec le squalé scie. *Hist. des Poissons*, IV, 135. — Genre 1 du premier ordre des cétacées. *Histoire des Cétacées*, 31. — Sous-genre 1, point de bosse sur le dos. Espèce 1, la baleine franche. Espèce 2, la baleine nordcaper. — Sous-genre 2, une ou plusieurs bosses sur le dos. Espèce 3, la baleine noueuse. Espèce 4, la baleine bossue, 32. — Nomenclature de la baleine franche, 43. — Sa longueur, 45. — Domination qu'elle exerce dans l'Océan, 46. — L'homme lui fait une vraie guerre navale, 48. — Description de la baleine franche, *idem*. Son poids, la femelle plus grosse que le mâle, 49. — On peut la comparer à une espèce de cylindre. Ce qu'on appelle *évents*, 50. — Leur usage, 51. — Description de l'organe qui sert à la baleine à lancer l'eau jusqu'à quarante pieds au-dessus de sa tête, 52. — Description de sa bouche, 53. — Son intérieur assez vaste dans une baleine pour que deux hommes aient pu y entrer sans se baisser, 54. — Sa langue, 92, 54. — Elle n'a point de dents, mais des lames que l'on appelle *fanons*; leur description, 55. — Comment ils sont placés, 56. — Comment ils se développent, 58. — Comment, après la mort de la baleine, on la prépare pour le commerce et les arts, 60. — Description des yeux de la baleine, 61. — Son cristallin, 63, 102. — Son enveloppe appelée *sclérotique*, 64. — Sa choroïde et la vue, 100, 66. — Comment on retire les osselets de la caisse du tympan pour les vendre, 72. — Description de la queue de la baleine, 72. — Ses deux bras et sa queue sont ses

instrumens de natation, 74. — Parties génitales du mâle et de la femelle, 75. — Peau de la baleine, 76. — Ses couleurs et sa chair, 77. — Son huile, 79. — Sa charpente osseuse, 81. — Son sang et sa circulation, 87. — Son estomac, 88. — Ses autres viscères, 89. — Son cerveau, 90. — Son diaphragme, 91. — Ses lèvres, 92. — Son odorat, 93. — Fait qui prouve que la baleine distingue de loin les nuances ou les diverses qualités des odeurs, 96. — Description de l'organe de l'ouïe de la baleine, et comment elle entend, 67, 98. — Sa vue, 100. — Son accouplement, 105. — Temps de la gestation, 107. — La mère ne produit qu'un baleineau, et comment elle lui donne à téter, 108. — Soins qu'elle en prend, 109. — Durée de la vie de la baleine, 111. — Son choc est égal à celui de soixante boulets de 48, 124. — Joignez à sa force individuelle celle de sa réunion en nombre, 125. — Insectes qui la tourmentent, 126. — Comment elle en est délivrée, 127. — Ses trois ennemis principaux sont le squalé-scie, le dauphin gladiateur, et le squalé-requin, 128. — Comment ils l'attaquent, 129. — Tourmens qu'éprouve alors la baleine, et nature de la sueur qui en est la suite, 130. — Rivages, continens et îles que la baleine franche habite de préférence, 132. — Espaces qu'elle parcourt, 135. — Les Basques sont les premiers qui aient attaqué ces énormes cétacées, 139. — Autres peuples qui les ont attaqués, 140. — Les Hollandais sont ceux qui ont formé pour cette pêche les plus grands établissemens, 141. — Progrès de leur pêche et de celle des Anglais, 142. — Société que ceux-ci ont formée pour cette pêche, 146. — Etat des navires qu'on a employés à cette pêche, 148. — Du harpon et des harponneurs, 149. — Comment on le jette, 155. — La lance, 150. — Saison la plus favorable pour cette pêche, *idem*. — Les glaces des mers polaires se présentent aux pêcheurs dans quatre états différens, 152. — Précautions à prendre pour cette pêche, 153. — Comment on la fait, 154. — Ce qui arrive alors, et suite des procédés, 156. — Outres remplies d'air atmosphérique que les Groenlandais attachent aux harpons qu'ils lan-

cent, 159. — Les baleines leur sont d'une grande ressource pour les usages économiques, 160. — Faits particuliers rapportés sur cette pêche par Duhamel, 161. — Comment les insulaires de Madagascar harponnent et tuent les baleines, 163. — Note du capitaine Meares sur la pêche des baleines par les naturels de Nootka, 164. — Mers où l'on n'a pas encore cherché les baleines, et où cette pêche s'établirait avec succès, *idem*. — Détails à ce sujet, donnés par Lapeyrouse, 167. — Ce qu'on fait de la baleine lorsqu'elle est morte, ou si affoiblie qu'on n'a plus rien à en craindre, 168. — Opérations du dépècement, 169. — Comment on arrange le lard dans les tonneaux, 173. — Comment on le fond, 174. — Parties utiles de la baleine, 176. — Lieux où l'on poursuit maintenant les baleines fraiches, 177. — Cette multitude de baleines disparaîtra dans l'hémisphère austral de même que dans le boréal. Cette espèce gigantesque ne subsistera plus que dans le souvenir des hommes et dans le tableau du génie, 178. — Le nord-caper, 2^e espèce de baleine, 180. *Voyez* ce mot. — La baleine noueuse, 3^e espèce; sa synonymie et sa description, 189. — Lieux qu'elle habite, 190. — La baleine bossue, 4^e espèce; sa synonymie et sa description, 191.

BALEINOPTÈRES (les). Genre 2 du premier ordre des cétacés. *Hist. de ces Poissons*, 32. — 1^{er} sous genre. Point de plis sous la gorge ni sous le ventre. 1^{re} espèce, la baleinoptère gibbar. 2^e sous genre, des plis longitudinaux sous la gorge et sous le ventre. 2^e espèce, la baleinoptère jubarte. 3^e espèce, la baleinoptère rorqual. 4^e espèce, la baleinoptère museau pointu, 33. *Voyez* ces différens noms.

BALI ou Plicatile. Espèce de couleuvre de l'Amérique méridionale. *Hist. des Reptiles*, VII, 193. — Sa description, 194. — Ses couleurs, 195. — Ses dimensions, 196.

BALICASE. (le). Oiseau des Philippines. Sa description, XLIV, 157.

BALISIERS (les) **CANNAS**-. Famille 26. En quoi on la distingue de celle des bananiers. *H. des Plant.* IX, 272.

— Leur description, 273. — 1^{er} genre, le catimban ; 274. — 2^e genre, les balisiers proprement dits, 4 espèces, 275. — Trois remarquables, le balisier d'Inde ou canne d'Inde ; le balisier à feuilles étroites, et le balisier à feuilles glauques, 276 — 3 espèces connues, 277. — 3^e genre, les globbées, 278. — 4^e genre, le myrosm à feuille de balisier, 279. — 5^e genre, les amomes, 280. — 6^e genre, les costus, 287. — 7^e genre, les alpines, 289. — 8^e genre, les maranta, 291. — 9^e genre, les thalies, 293. — 10^e genre, le curcuma, 294. — 11^e genre, les kempferies, 297. — Aspect général de la famille des balisiers, 423.

BALISTES (les). Poissons ayant la tête et le corps comprimés latéralement, huit dents au moins à chaque mâchoire, l'ouverture des branchies très-étroite, les écailles ou tubercules qui revêtent la peau réunies par une forte membrane. *Hist des Poissons*, IV, 225. 1^{er} sous genre, 4 espèces; savoir, la baliste vieille, 227; la baliste étoilée, *id.*; la baliste écharpe, 236; et la baliste double aiguillon, 240. *Voy.* ces mots. — Contraste que la nature présente entre les mœurs des balistes et celles des squales et des lophies, 214. — Magnificence qu'a étalée la nature sur les différentes espèces de balistes, 217. — Leurs moyens de défense, 219. — Leur description, 222. — Leur nourriture, 223. — Quels sont ceux dont le manger est funeste, 224. — Leur natation, 225. — Le baliste chinois, par Lacépède. Sa nomenclature, 243. — Sa description, 244. — Le baliste velu et le baliste mamelonné; leur nomenclature et leurs rapports, 246. — Description du baliste velu, et lieu où on le pêche, 248. — Description du baliste mamelonné et lieu où on le pêche, 249. — Le baliste tacheté, 8^e espèce; sa nomenclature, 250. — Sa description, 254. — Le baliste pralin, 9^e espèce; sa description, 253. — Le baliste kleinien; 10^e espèce, sa nomenclature, 256. — Le baliste curacavien, 11^e espèce; sa description, 258. — Le baliste épineux, 12^e espèce, sa nomenclature, 260. — Ses couleurs, 261. — Lieux qu'il habite, 263. — Le baliste verrqueux, 263. — Le baliste sillonné, 13^e espèce; sa nomenclature, 265. — Sa description,

description, 266. — Le baliste porc, et le baliste caporique, 14^e espèce, 268. — Le baliste queue-fourchue, 15^e espèce; sa nomenclature, 271. — Le baliste bourse et le baliste-américain, 16^e et 17^e espèces; leur nomenclature, 273. — Description du premier, 274. — La distinction entre l'un et l'autre, 275. — Le baliste verdâtre, le baliste grande tache, le baliste noir, le baliste bridé et le baliste armé, 18, 19, 20, 21 et 22^e espèces, 277. — Description du premier, 278. — Description du 2^e, 279. — Description du 3^e, 280. — Description du 4^e, 281. — Description du 5^e, 282. — Le baliste cendré, 23^e espèce; sa description, 284. — Le baliste assasi, 24^e espèce, 286. — Le baliste mungo-poark, et celui ondulé; 25 et 26^e espèces, 288. — Le baliste monoceros, 27^e espèce, 290. — Le monoceros écrit, 28^e espèce, 293. — Le porte-vergette. Le baliste hérissé, 29^e espèce, 296. — Le baliste varié, 30^e espèce; sa description, 299. — Le baliste métallique, 31^e espèce; sa description, 301. — Notice de quelques poissons, du genre des balistes, indiqués par des naturalistes, mais dont l'espèce n'est pas déterminée; savoir le baliste à long museau et le baliste ridé, 302. — Le baliste de Muller, 303. — Le baliste barbu et le baliste du Japon, 304. — Le baliste beau et le baliste taupe, 305. — Supplément au tableau du genre des balistes, 1^{er} sous-genre. Plus d'un rayon à la nageoire inférieure ou torachique, et à la 1^{re} nageoire dorsale, 4^e espèce. Le baliste buniva. *Hist. des Poissons*, XIII, 277, 278.

BALIVEAUX (les). Leur bois n'est pas de bonne qualité, VI, 372.

BALLAN (le). Espèce 94 des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 144 et 275.

BALLOTES (les). Genre 32 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 357. — Une espèce de France et 4 espèces connues, 358.

BALSAMINE mâle. *Hist. des Plantes*, XIV, 261. — 4^e genre des plantes geraines ou geranium, XVIII, 224.

BALSAMITES (les). Genre 139 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 63. — Espèce remar-

Tab. TOME I.

G

quable, la balsamite vulgaire, ou grand baume, menthe de coq des jardins, *idem*. — 2 espèces de France et 4 espèces connues, 64.

BALTIMORE (le). Oiseau d'Amérique; d'où lui vient son nom, XLV, 181. — Son nid, 184. — Celui bâtarde, 185. — Ses différences avec le précédent, 186.

La baltimore droite, 170^e genre des plantes composées. *Histoire des Plantes*, XIII, 171. — Une espèce connue, 172.

BALVANE (la). Machine de la forme du tetras, dont on se sert pour la chasse de cet oiseau. XLI, 363. Voyez TETRAS.

BAMBLA (le) Espèce de fourmilier, XLIX, 364.

BAMBOUS (les). Genre 82 des plantes dites graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 382. — Espèce remarquable, 384. — Sur ce qu'on appelle dans l'Orient *tambaxir*, 388. — Espèces connues, 390.

BANANE (le). Poisson du genre des butyrins. Sa description. *Hist. des Poissons*, XI, 402, 403.

BANANIERS (les). (*Musæ*) Ordre 4; famille 26 des plantes monocotylédones proprement dites. Leur description et leur différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 183. IX, 141. — 1^{er} genre, *musa*, 143. — Espèce remarquable, le bananier à fruit long, ou de paradis, vulgairement appelé *figuier d'Adam* ou *plantanier*, 145. — Le bananier à fruit court ou des sages, 146. — Détails particuliers sur les bananiers, 147. — Espèces connues; et 2^e genre, les *héliconies* ou *biahi*, 149. — 3^e genre, le *ravenal* de Madagascar, 152. — 4^e genre, les *strelitzies*, celle reine, 154. — Aspect général de la famille des bananiers, 422.

BANANISTE (le). Oiseau de Saint-Domingue, du genre des demi-fins, LII, 130.

BANARA. Genre 15 des plantes tiliacées ou tilleuls. *Hist. des Plantes*, XVIII, 177.

BANE (le). 8^e espèce du genre des poissons appelés *mormyres*. *Hist. des Poissons*, XIII, 226 et 231.

BANIAHBOU (le) de Bengale. Espèce de merle, XLVI, 106.

BANISTERIA. Genre 1^{er} des plantes malpighies. *Hist. des Plantes*, XVIII, 286.

BANKSIA (les). Genre 2 de la famille des plantes dites Protées. *Hist. des Plantes*, XI, 204 — 6 espèces connues, 206.

BANKSIENNE (la raie). 281^e espèce. *Voyez* le mot **RAIE**.

BAOBABS (les). Espèce d'arbre, dont la vie, lorsqu'il a trente pieds de diamètre, est d'environ cinq mille cinq cent cinquante ans. *Hist. des Plantes*, II, 95.

BACHOUAS. Nom donné, dans les contrées boréales, à des enfoncemens de la mer dans les terres, où se cachent pendant l'hiver les maquereaux. *Hist. des Poissons*, VII, 360.

BARBARES (les peuples). Leur genre de vie, leurs irruptions ont occasionné sur le globe vingt siècles de désolation, IV, 22. — Causes de leurs invasions, 23.

BARBARESQUE (le). Espèce d'écureuil, XXVII, 195 — Sa description, 196.

BARBARIE (la). Mœurs et habitudes des peuples de), XX, 217.

BARBARINS (les). Peuples qui habitent le haut du fleuve Niger ou Sénégal. Observation de M. Bruce sur ces peuples. XX, 245.

BARBARINE (la) ou **BARBARESQUE**. *Histoire des Plantes*, XIV, 283.

BARBE (la). Différens usages sur, XVIII, 412.

BARBEAU (le). Poisson du genre des cyprins. Sa nomenclature et sa description. *Hist. des Poissons*, XIII, 76, 115. — Ses habitudes, 117, 119. — Préjugé sur ses œufs, 118.

BARBEAU (le). Fleur. *Voyez* **BLUET** (le).

BARBE DE CHÈVRE, *barba capræ*. Genre 29 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 135

BARBE DE JUPITER, *anthyllis barba Jovis*. Genre 42 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 302.

BARBERIN (le). 11^e espèce du genre des poissons appelés *mulles*. Sa description. *Hist. des Poissons*, IX, 66 et 95.

BARBICAN (le). Oiseau des côtes de Barbarie, LVI, 76. — Ses variétés, par Sonnini, 78.

BARBICHON (le) de Cayenne. 8^e espèce de gobemouche, L, 83. — Ses habitudes, sa voix, etc., 84.

BARBILLON (le). 14^e espèce de squal. Ses différents noms. *Hist. des Poissons*, IV, 54. — Sa description, 55.

BARBONE. Nom d'une maladie particulière aux buffles d'Italie, XXIX, 186. — Ses funestes effets, 187.

BARBONS (les) ou ANDROPOGANS. Genre 30 des plantes graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 201. — Espèces remarquables, 202. — Espèces de France, 205. — Espèces connues, 206.

BARBOTINE (la). Voyez L'ARMOISE DE JUDÉE. *Hist. des Plantes*, XIII, 71.

BARBU (le) 15^e espèce de squal. Sa description par Solander. *Histoire des Poissons*, IV, 57 (note) — Autre description par Watts, 60 (note). — 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *achires*, XI, 348, 351. — 9^e espèce du genre des poissons appelés *pimelodes*, XII, 45, 59.

BARBULA (le) de la Chine, Genre 19 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 318.

BARBUS (les oiseaux). LV, 399 et suiv. Oiseaux de l'ancien continent, LVI, 13 — Ce qui les distingue des tamias de l'Amérique, 14. — Le barbu à gorge jaune, 1^{re} espèce, 15. — Le barbu à gorge noire, 2^e espèce, 17. — Le barbu à plastron noir, 3^e espèce, 19. — Le petit barbu, 4^e espèce, 21. — Le grand barbu, 5^e espèce, 23. — Variété du grand barbu, par Sonnini, 25. — Le barbu vert, 6^e espèce, 26. — Le barbu à masque roux, par Sonnini, 28. — Le barbu à couronne rouge, par le même, 29. — Le kottorea, par le même, 31. — Le busseu-buddou, par le même, 33.

BARBUS *barbati*. (les). Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 87. — 5^e espèce d'insecte du genre des carabiques. Leur description. *Hist. des Insectes*, VIII, 264.

BARDANNES (les). *Arctium*. Genre 45 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 120. — 2 espèces de France, 121. — 2 espèces connues, 122.

BARDEAU. Seconde espèce de mullet provenant du cheval et de l'ânesse, XXII, 347. — Expérience à

faire pour prouver ce qui résulteroit de l'accouplement du bardeau avec la mule, la jument et l'ânesse, et de celui de la petite mule ou femelle du bardeau, 349. — Présomptions sur lesquelles sont fondés les résultats à espérer, 350. — Détails particuliers sur le bardeau, 397. — Sa description, 398.

BARDOTIER. Genre 6 des plantes dites *sapotiliers*. *Hist. des Plantes*, XVI, 201.

BARGES (les). Oiseaux de marais, à peu près de la forme des bécasses, LVIII, 38. — Leurs habitudes, 40. — La barge commune, 1^{re} espèce, 42. — La barge aboyeuse, 2^e espèce, 45. — La barge variée, 3^e espèce, 48. — La barge rousse, 4^e espèce, 51. — La grande barge rousse, 5^e espèce, 53. — La barge rousse de la baie d'Hudson, 6^e espèce, 56. — La barge brune, 7^e espèce, 58. — La barge blanche, 8^e espèce, 59. — Les barges blanchâtres d'Angleterre, par Virey, 61. — La barge aux pieds rouges, par Sonnini, 63. — Les barges marbrées de la baie d'Hudson, par Virey, 65.

BARITE (le). Espèce d'étourneau, XLV, 106.

BARNADESE (la) Genre 80 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 231. — Une espèce connue, 232.

BARRÉ (le). 4^e espèce du genre des poissons appelés pimelodes. *Hist. des Poissons*, XII, 44, 53.

BARRIS. Nom donné à l'espèce de singe appelé orang-outang, XXXV, 85, 98.

BARRELIÈRES (les). Genre 4 des plantes dites acanthes. *Hist. des Plantes*, XV, 100. — 13 espèces connues, 101.

BARTAVELLE (la), ou Perdrix grecque. Sa description, XLIII, 7 (note). — Comment on distingue les bartavelles des perdrix rouges, 22, *Voy. Perdrix rouge*.

BARTSIES (les). Genre 9 des plantes dites rhinanthacées. *Hist. des Plantes*, XV, 55. — 3 espèces de France, 56. — 6 espèces connues, 57.

BARYTE (la). Substance minérale, XVI, 202. — Barité fétide puante, 242.

BARYTILITES. (les) Espèce de pierres, XVI, 230, 231. — Baritilites composées, 241.



BASALTES Ce que c'est, II, 485. — Basaltes antiques et modernes, IX, 332. — Autres espèces, 336. — Prisme de basalte articulé, XIV, 195. — Ce que M. Faujas de Saint-Fonds dit de la basalte, 195. — Ses différences d'avec les laves, 197. — Addition à l'article des basaltes, par Sonnini, 209. — Considérations sur les basaltes, 320.

BASELLES (les). Genre 10 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 24. — La baselle rouge, 25. — 4 espèces connues, 26.

BASILÈES (les) Genre 8 des plantes dites Asphodeles. *Hist. des Plantes*, VIII, 337. — Espèce remarquable, la basilée reine, 338. — 5 espèces connues, 339.

BASILIC (le), *basiliscus*. *Hist. des Reptiles*, III, 309. — Le basilic proprement dit ou à capuchon, 310. — Sur celui dont il est parlé dans l'écriture sainte, 312. — Description du basilic par Seba, 313. — Il a eu tort de l'appeler dragon volant, 317. — Ses dimensions, 320. — Le basilic porte-crête d'Amboine, 322. — Ce qu'en dit Valentin, 323. — Ce qu'en dit Schlosser, 324. — Ses dimensions, 328. — Sa description par le comte Fr. Hornstedt, 329. — Tableau méthodique des basilics, VIII, 362.

BASILICS (les). Genre 49 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 400. — 27 espèces connues, 401.

BASILIER (les), *cannæ*. 4^e ordre, famille 26 des plantes monocotylédones proprement dites ; leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 202. *Voy.* **BALISIERS**. (les)

BASSIA. *Voy.* **ILLIPÉ**.

BATELEUR (le). Espèce d'oiseau de proie, XXXVII, 366. — Sa description par le Vaillant, 367. — Sa taille et en quoi il diffère des aigles, 368.

BATHECA. Melon d'eau. *Hist. des Plant.* XIV, 286.

BATICE, *idem*. *Hist. des Plantes*, XIV, 286.

BATIS. 1^{re} espèce de raie. *Hist. des Poiss.*, III, 78. *Voy.* le mot **RAIE**.

BATRACHOIDES (les). Genre 47 des poissons osseux ; 2 espèces. *Hist. des Poissons*, VI, 388. — 1^{re} espèce

le batrachoïde tau, 389. — 2^e espèce, la batrachoïde, blennoïde, 393. — Etymologie du mot batrachoïde, 390.

BATRACIENS (les). 4^e et dernier ordre de reptiles. *Hist. des Reptiles*, I, 20. — Leur description générale, vol. VIII de la même hist. 5. — Leur respiration, 10. — Leur circulation, 11. — Leur accouplement et leur fécondation, 12. — Exposition des différentes métamorphoses que subissent les batraciens pour parvenir à l'état parfait, 15. — Genre 1 des batraciens, les rainettes, 18. — *Voy.* ce mot. — Second genre des batraciens, les grenouilles, 87. — *Voy.* ce mot. — 3^e genre des batraciens, le crapaud *buso*. Sa description générale, 137. — *Voy.* ce mot. — Genre 4, la salamandre, sa description générale, 217. — *Voyez* ce mot. — Genre 5, les protes; leur description générale. *Voyez* ce mot. — Genre 6, les sirènes, description générale, 269. *Voy.* ce mot. — Tableau méthodique de ces reptiles. Leurs caractères propres, 426.

BATTUDES (les). Espèce de filets dont on se sert pour la pêche du maquereau. *Hist. des Poissons*, VIII, 84.

BAUDROIE (la). 1^{re} espèce des poissons dits lophies. *Voyez* ce mot. *Hist. des Poissons*, IV, 160. — La baudroie chauve-souris, ou la lophie vespertillon, 3 espèces, 177. — La baudroie tachée ou la lophie-histrion, 4 espèces, 186.

BAUHINIA. Genre 22 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 272. — 3 espèces, et leurs propriétés, 273.

BAUME-MOMIE. Montagne en Perse, d'où on le tire, et sa grande réputation, IX, 222. — Vertus de cette drogue. Ce n'est que du bitume, *idem*. Ce qu'en dit Chardin, 223.

BAUME-LE-GRAND. *Hist. des Plantes*, XIII, 63.

BAUME. Nom donné à quelques espèces de menthes, et pourquoi. *Hist. des Plantes*, XV, 332.

BAYA. Nouvelle espèce de gros-bec, oiseau. Sa description, XLVI, 384 (note).

BDELLE, *bdella*. Insecte du genre des tiques. *Ex. Acarus longicornis*. *Hist. des Insectes*, III, 66.

BEAUMARIS (le). 5^e espèce de squalé. Sa nomenclature. *Hist. des Poissons*, IV, 8. — Sa description, par Pennant, 9.

BEAUTÉ. Idées des différens peuples sur ce sujet, XVIII, 458. — Il n'est pas certain que la beauté ait gagné à échanger contre les pierres précieuses, les ornemens et les parures que lui fournissoient les ouvrages de succin. IX, 249.

BEBÉ (le) 5^e espèce du genre des poissons appelés mormyres. *Hist. des Poissons*, XIII, 225, 230.

BEÇ. Sur celui des insectes. *Hist. des Insectes*, II, 140.

BEC-A-FOURREAU (le). Oiseau de la Nouvelle-Zélande. Sa description, par Sonnini, LIX, 266.

BECARDES (les). Petits oiseaux de proie, de l'espèce des pie-grièches, XXXIX, 366. — La bécarde à ventre jaune, 369. — Sa description, par Sonnini, 370 (note). — Le vanga ou la bécarde à ventre blanc, 375.

BÉCASSE (la). Oiseau de passage dont les chasseurs font le plus de cas, LVII, 356. — Lieux d'où elle vient, et comment elle arrive, 360. — Son vol, 362. — Remarques sur sa vue, et comment on la prend, 363. — Différentes manières de la chasser, 364 (note). — Elle est moult sotte bête, dit *Belon*, 368, — Lieux qu'elle fréquente, 369 — Comment on la nourrit, 371 (note). — Description de son bec, 372. — Sa vésicule du fiel et autres parties internes, 373. — Sa grosseur; propriété de sa chair, et son fumet, 374. — En quel tems elle quitte nos plaines, quoique quelques-unes y restent, 376. — Son nid, sa ponte et éducation des petits, 378. — Lieux où se trouve la bécasse, 380. — Ses variétés; la blanche, 385. — La rousse, la grande et la petite, 386. — Addition à l'article des variétés de la bécasse, par Sonnini : la bécasse isabelle, la bécasse à tête rouge, la bécasse aux ailes blanches, 389. — Oiseau étranger qui a rapport à la bécasse, savoir, la bécasse des savanes, 390. — Ses habitudes, 391. — La petite bécasse d'Amérique, par Sonnini, 395.

BÉCASSEAU (le). Oiseau de rivage, LVIII, 128. — Sa description 130. — Lieux où il se trouve, 131. — Ses habitudes, 133. — Ses espèces, 134. — Confusion des nomenclateurs à ce sujet, 135. — La guignette, espèce de bécasseau, 137. — Le bécasseau à ailes blanches, par Sonnini, 141.

BÉCASSINE (la). 1^{re} espèce, LVIII, 5. — Sa description, 7. — Celle de France, 8. — Ses habitudes, 10, 17. — Manière de la prendre, 11 (note). — Elle se trouve presque par-tout, 15. — Il y a une petite race de bécassine, 17. — Description de la double bécassine, 18. — La petite bécassine surnommée la *sourde*, 2^e espèce, 20. — La brunette, 3^e espèce, 24. — Variétés de la bécassine, par Sonnini, 26. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux bécassines. Celle du cap de Bonne-Espérance, 28. — Addition, par Sonnini, 30. — La bécassine de Madagascar, 2^e espèce, 31. — La bécassine de la Chine, 3^e espèce, 33. — La bécassine blanche des Indes, par Sonnini, 36. — Sa description, par Sonnerat, 37.

BECCABUNGA (le) des boutiques. *Hist. des Plantes*, XV, 28.

BEC-CROISÉ (le). Espèce de difformité du bec de cet oiseau, et ses différences d'avec le gros-bec. Autre oiseau, XLVII, 7. — Lieux qu'il habite, 9. — Variétés de ses couleurs, 6 et 11. — Ses habitudes, 13. — Sa ponte, 14. — Le bec-croisé leucoptère, par Virey, 65. — Le bec-croisé social, par le même, 71. — Ses habitudes et sa sociabilité, 73.

BEC D'ARGENT (le). Oiseau formant la 12^e espèce des tangaras, XLVIII, 295. — D'où lui vient ce nom. Caractère distinctif du mâle, 297. — Lieux où on le rencontre, 298. — Forme de son nid, 299.

BEC-DE-FER. Oiseau des îles de la mer du Sud, par Sonnini, LVI, 79. — Sa description, 80.

BEC-D'OISEAU (le). Espèce de phoque qui se rapproche des oiseaux par la forme de ses mâchoires qui n'ont point de dents et forment un véritable bec, XXIV, 247. — Sa description, par Sonnini, 248. — Ce qui le rapproche des canards, *idem*. — Lac où il se trouve, 249.

BEC-D'OISEAU. Espèce de pétrification assez rare. *Hist. des Mollusques*, II, 42.

BEC-EN-CISEAUX (le). Oiseau de Cayenne. Sa description, LX, 317. — Lieux où on le trouve, 319.

BEC-FIGUE (le). LI, 207. Son plumage, 208. — Son arrivée du Midi et son départ, 209. — Martial cité à son sujet, 212. — Autres endroits où se trouve le bec-figue, 213. — Sa chair est excellente à manger; sa nourriture, 215. — Il n'y en a qu'une espèce, 216. — Le bec-figue noirâtre, par Virey, 247. — Le bec-figue cafre, par le même, 248. — Le bec-figue patagon, par le même; et sa comparaison avec la race des Patagons, 249. — Le bec-figue olive et le bec-figue brun-cannelle, par le même, 258. — On appelle ortolan en Lorraine, le bec-figue, XLIX, 25 (note).

BÊCHE (la). Espèce d'insecte très-nuisible à la vigne. *Hist. des Insectes*, XI, 67. — Moyens d'arrêter ses ravages, 68.

BEC-OUVERT (le) Espèce de héron, du genre des crabiers, LVII, 267. — Le bec-ouvert blanc des Indes, par Virey, 270.

BEC-ROND (le) à ventre roux. Espèce de bouvreuil de l'Amérique, XLIX, 188. — Sa description, 189. — Le bec-rond ou bouvreuil bleu d'Amérique, deux espèces, 190. — Celui de la Caroline, 192. — Le bouvreuil ou bec-rond noir et blanc, 193. — Le bouvreuil ou bec-rond violet de la Caroline, 195. — Le bec-rond violet, à gorge et sourcils rouges, espèce de bouvreuil, 197.

BECUNE (la). 4^e espèce du genre des poissons appelés *sphyrènes*. *Hist. des Poissons*, XII, 320, 325.

BEDOINS (les). *Voy. ARABES*.

BEFARIA. Genre 6 des plantes dites rosages. *Hist. des Plantes*. XVI, 225.

BEFROI (le grand). Espèce de fourmilier, XLIX, 345. — Singulier chant qu'il fait entendre le matin et le soir, 346. — Le petit befroi, 348.

BEHRÉE (le), par Sonnini. Espèce de faucon des Indes orientales, XXXIX, 162.

BELÈE (la), ou cordes flottantes. Moyen dont on se sert pour la pêche des maquereaux. *Histoire des Poissons*, VIII, 83.

BELEMITE (la). Espèce de minéral; comment il est placé dans les couches de la terre, et sa nature, VIII, 113, 114.

BELEMNITES (les). Genre 14 des céphalopodes. *Hist. des Mollusques*, V, 43. — D'où on a tiré ce nom, 44. — Leur description, 45. — Leurs espèces, 48.

BELETTE DE MER. Nom donné aux petites espèces de squales. Voy. ce dernier mot et ses différentes espèces. *Hist. des Poissons*, IV, p. 5.

BELETTE (la). Sa synonymie, XXV, 125. — On a eu tort de la confondre avec l'hermine, 126. — Ses habitudes, 128. — Son odeur, 129. — Belette élevée et familiarisée. Observation sur cette belette, 133. — Autres observations sur sa domesticité, 144. — Observations sur sa grandeur et sa description, par Sonnini, 148. — Observations sur les habitudes de la belette, par M. Lepechin, 160 (note)

BELIER. Sa castration, XXIII, 68. — Manière de connoître son âge, 69. — Sa description, 88. — Ses différences en Islande, XXIX, 242. — Belier du Cap de Bonne-Espérance, 249. — Le belier de Tunis, 250. — Belier dit le morvant de la Chine, 265. — Différences entre les beliers et les boucs, les brebis et les chèvres, 277. — *Musmone*, *musione*, espèce de belier, 289. — Beliers sauvages du Kamtschatka, 291. — Expériences sur la semence des beliers, XVIII, 270.

BELLADONE ou Atropa. Genre 9 des plantes dites solanées. *Hist. des Plantes*, XVI, 59. — Six espèces, 60. — Leurs propriétés, 61.

BELLE-DE-NUIT, *Mirabilis jalapa*. Plante dicotylédone. Sa coupe transversale. *Hist. des Plantes*, I, 375. — Son épanouissement, 2^e volume de cette histoire, 50; *Nyctagines*, ordre 3, famille 38 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs divisions. IV, 291. — Famille 40 des plantes, les nyctaginées ou belles-de-nuit, XI 279. — § 1,

plantes herbacées, feuilles opposées, un peu inégales. — Genre 1, le mirabilis, 281. — Genre 2, l'oxybaphe visqueux, 286. — Genre 3, les allionia, 287. — Genre 4, l'abronia ombellifère, 288. — Genre 5, les boerrhaavia, 289. — § 2, plantes ligneuses, feuilles opposées ou alternes. Genre 6, les pisonia, 291. — Genre 7, les axia, 293. — Genre 8, le neea, 294. — Genre 9, la bougainville, 295.

BELLEFEUILLE. *Hist. des Plantes*, XIII, 371.

BELLIS. *Voy. les PAQUERETTES. Hist. des Plantes*, XIII, 40.

BELLONES (les). Genre 36 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 8. — 2 espèces connues, *idem*.

BELLUÆ. Nom sous lequel les anciens désignaient les grands oiseaux marins, qui n'étoient pas des cétacées. *Hist. des Mollusques*, II, 321.

BELONE (le). 3^e espèce du genre des poissons appelés esoces. *Hist. des Poissons*, XII, 285, 302. — Sa description et ses habitudes, 304.

BELUGA (le). 1^{re} espèce du 3^e genre des cétacées appelés delphinaptères. Sa synonymie. *Hist. des Cétacées*, 347. — Sa description, 348. — Sa nourriture, 350. — Ses couleurs, 351. — Les belugas se montrent en plus grand nombre dans le détroit de Davis, 352. — On dit qu'on en a vu remonter dans les fleuves, 353.

BEMBEX. Insecte du genre des bembiciles; ex. *bembex rostrata. Hist. des Insectes*, III, 345. — Genre 395 d'insectes de la famille des bembiciles, XIII, 299. — 2 espèces, variétés de la première, 300.

BEMBICILES. Insectes d'un genre particulier. *Hist. des Insectes*, III, 343; V, 309. — Famille 71 des insectes; insectes du genre des hyménoptères. Leur description, XIII, 298. — Genre 395, le bembex, 299. — Genre 396, les monedules, 302. — Genre 397, les stizes, *idem*.

BEMBIDION. Insecte du genre des elaphriens; ex. *carabus biguttatus. Histoire des Insectes*, III, 82. — Genre 9 d'insectes de l'ordre premier des coléoptères; en quoi ils diffèrent des carabes, VIII, 221. — Es-

pèce 1^{re} celui enfoncé, 222. — 2^o celui brûlé, 3^o celui gouttelette, 223. — 4^o celui baponctué, 5^o celui biguttulé, 6^o celui quadrimaculé, 224. — 7^o celui quadrigutté. 8^o celui des rochers, 225. — 9^o celui doris, 10^o celui ruficol, 11^o celui oripeau, 226. — 12^o celui aquatique, 13^o celui strié, 14^o celui pygmée, 227.

BEN, *guilandina* Genre 9 des plantes dites *légumineuses*. *Hist. des Plantes*, XVII, 260. — 5 espèces et leurs propriétés, 261.

BENGALAIS (les). Peuples de l'Afrique. Leur description, XX, 176.

BENGALI (le). 11^e espèce des poissons appelés holo-centres. *Hist. des Poissons*, X, 358 et 397 — On appelle du même nom la 4^e espèce du genre des poissons dits chéthodons, XI, 104 et 127.

BENGALIS (les), et les Sénégalis. Oiseaux de l'Asie et de l'Afrique, XLVII, 333. — Discussion sur leur changement de couleur, 334. — Lieux où ils sont répandus, 335. — Leurs habitudes, 336. — Comment on les prend, 337. — Le bengali, 339. — Sa description, 340. — Le bengali brun, 343. — Le bengali piqueté, 345. — Différences de la femelle, 346. — Le serevan, 357. — Le petit moineau du Sénégal, 359. — Le maia, 360. — Le maian, 363. — Addition à l'article des bengalis par Sonnini. Le bengali à oreilles blanches, 366. — Le bengali à cou brun, 368. — Le bengali à moustaches, 372. — Le bengali enflammé, 373. — Le bengali à tête d'azur, 374. — Le bengali impérial, 377. — De la manière d'acclimater dans nos pays les bengalis, par Sonnini, XLVIII, 93. — Le premier et le principal moyen est de leur procurer une chaleur convenable, et qui approche de celle des contrées les moins chaudes de l'Afrique, enseigné par Vieillot, 96. — La seconde attention regarde la nourriture, 100. — Durée de leur vie, 101.

BENOITE, *geum*. Genre 23 des plantes dites *rosacées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 123. — 5 espèces, 124. — Leur culture et leur propriété, 125.

BENTAVEO (le), ou le Cuiriri. 4^e espèce des tyrans

oiseaux gobe-mouches, L, 256. — Sa description par Marcgrave, 237.

BERARDIE (la). Genre 40 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 76. — Espèce connue, 77.

BERBÉ (le) Animal de Guinée, le même que la fossane, XXXIII, 3.

BERBERIS. Voy. ÉPINE-VINETTE.

BERCE, ou fausse-branc-ursine, *heraeum* Genre 26 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 292. — Deux espèces et leurs propriétés, 293.

BERDA (le). 2^e espèce du genre des poissons appelés *spares* *Hist. des Poissons*, IX, 379, et X, 72.

BERGERA. Genre 5 des orangers *Hist. des Plantes*, XVIII, 254.

BERGERETTES (les), ou Bergeronnettes, et la Lavan-tière. Oiseaux véritables gobe-mouches, LI, 339. — 3 espèces, la grise, celle du printemps et la jaune, 357. — Leur nom vient de leur vie habituelle avec les troupeaux, 358. — Leur nourriture, 359. — Description de la bergeronnette grise, 360. — Quoi qu'amie de l'homme, la bergeronnette ne se plie point à devenir son esclave, 361. — Elle fait ce qu'on raconte de *l'ibis* des bords du Nil, 362. — Description de la bergeronnette de printemps, 363. — La bergeronnette de la Daourie, aux yeux noirs, par Virey, 367. — La bergeronnette de la baie de Hudson, par le même, 369. — La bergeronnette Sheltobriuscha, par le même, 370. — La bergeronnette de Tschutschis, par le même, 372. — La bergeronnette verte, par le même, 373. — La bergeronnette jaune, 3^e espèce, 374. — Remarques sur sa queue, 377. — La bergeronnette de Java, 380. — La bergeronnette du Cap de Bonne Espérance, 382. — La petite du même endroit, 384. — Celle de l'île de Timor, 386. — Celle de Madras, 387.

BERGFORELLE (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés *salmones*. *Hist. des Poissons*. XII, 173. — Lieux où on le trouve, 174.

Besghias. *Hist. des Plantes*, XIV, 42.

GÉNÉRALE.

III

BERGIA. Genre 15 des plantes dites caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 124. — 2 espèces, 125.

BERGLAX (le). Nom donné à une espèce de poisson dits *macroures*. Sa description. *Hist. des poissons*, VIII, 198.

BERGSNYLTRE (le). 72^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 136, et 247.

BERGYLTE (le). 95^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 144, et 276.

BERYL (le) des anciens; ce que c'est, XII, 387. — Les différentes espèces de beryl, XIII, 10.

BERIS. Insecte du genre des papillons stratiomes; ex. *Stratiomys sexdentata*. *Hist. des Insectes*, III, 447. — 9^e genre d'insectes de la famille des stratiomides, XIV, 334, 340.

BERLE. Genre 22 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 284. — 2 espèces, et leurs propriétés, 285.

BERNACHE (la). Oiseau aquatique. — Sa prétendue origine, LXI, 260 et suiv. — Lieux où on le rencontre, 270. — Ce qu'en dit Gerard de Vora 269. (note) — La bernache est de la famille de l'oie, 272.

BERNARDIA. Voyez **ADALIA**.

BERNARD L'HERMITE. Insecte crustacé. — Son industrie pour se loger. *Hist. des Insectes*, I, 206. — Espèce d'insecte malacostracé, décrit par Swammerdam, V, 7, 61. Voyez **LAGURE**.

BERTIÈRE (la) de la Guiane. Genre 40 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 13. — Une espèce connue, *idem*.

BESLERIA. Genre 23 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 35.

BETEL (le). Ce que c'est, et son usage. *Hist. des Plantes*, VIII, 46.

BÊTE PUANTE (la). Animal de la Louisiane, assez joli, mais qui, de plus d'une lieue, empeste l'air de son urine, XXXIII, 253. (note).

BÊTES A DIEU. Espèces d'insectes. Voyez **COCCINELLE**.

BETHYLE, *bethylus*. Insecte du genre des cleptioses;

ex. *tiphia hemiptera*. *Hist. des Insectes*, III, 315. — Genre 353 d'insectes de la famille des proctotrupiens. Deux espèces, XIII, 228.

BETTES (les) ou POIRÉES. Genre 18 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 43. — Celle commune, 44 — 2 Espèces de France, et quatre espèces connues, 46.

BÊTOINES (les). Genre 30 des plantes dites labiées. *Hist. des plantes*, XV, 348. — 4 espèces de France, *idem*. — 8 espèces connues, 349.

BEZOARD. Si la production de cette pierre vient des gazelles, XXX, 300. — Ce que dit à ce sujet Koempfer, 301, (note). 318 — Quantité de ces pierres à Golconde, et ce que rapportent à son sujet plusieurs voyageurs, 304 (note). — Le bezoard oriental, 306. — Opinion sur la production des différentes espèces de bezoard, d'où vient celui oriental, et quels sont les auteurs qui l'ont décrit, 312. — Sur les bezoards occidentaux; d'où ils viennent, 320. — Quels sont les animaux qui produisent les bezoards, 321. — Différence des bezoards d'avec ce qu'on appelle *calculs*, 324. — Quelles sont leurs qualités, 327. — Leur composition, leur vertu, etc., 328. — Autres remarques sur le bezoard, 339. — Bezoards orientaux et occidentaux, XXXII, 116 — Bezoards donnés par le pacò, le huron et la vigogne, 117. — Bezoards de grands singes, XXXVI, 68.

BIB. 3^e espèce des poissons osseux de la classe des gades. *Hist. des Poissons*, VI, 320. — Sa description, 321. — D'où viennent les noms de borgne et d'aveugle qu'on lui a donnés, 322.

BIBION, *bibio*. Espèce de papillon; ex. *Tipula hortulana*. *Histoire des Insectes*, III, 425. — (Genre 476 d'insectes de la famille des tipulaires, XIV, 281, 294.

BIBLÉ (la). Passages tirés de celle de Turin, et texte parallèle avec ceux de la Vulgate, traduits en français pour prouver l'accord des naturalistes avec les livres mosaïques. *Hist. des Mollusques*, IV, 335, 336.

BICHN

BICHE (la). Expériences d'Harwey sur les biches, XVII, 146, 163. — Leur portée, XXIV, 83. — Quatre espèces de cerfs qui ont le nom de biches dans l'Amérique méridionale, 177. — Biche de Sardaigne, *Voy. l'AXIX*.

BICHIR (le). Poisson du genre de ceux appelés *polyptères* *Hist. des Poissons*, XII, 336. — Sa description, 337.

BICOLOR (le). 8^e espèce du genre des poissons appelés *holacanthés*. *Hist. des Poissons*, XI, 203, 214.

BICORNE. *Voy. MARTINIA*.

BIDENTS (les). Genre 175 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 179. — Deux espèces de fruits, 180. — 20 espèces connues, 181.

BIGNONES (les), *bignoniæ*. 8^e ordre, famille 59 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. — Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 111. Famille 59 des plantes. § 1. Capsule à deux valves, tiges herbacées. Genre 1 *chelone* ou *galane*. *Histoire des Plantes*, XVI, 128. — Genre 2, *sesame*, 129. — Genre 3, *incarvillea*, 131. — Genre 4, *digitale*, *idem*. — § 2. Capsule à deux valves, arbres ou arbrisseaux. Genre 5, *millingtonia* et genre 6, *jacaranda*, 135. — Genre 7, *catalpa*, 136. — Genre 8, *tecoma*, 137. — Genre 9, *biguone*, 138. — 7 espèces, propriétés, 140. — § 3. Fruit coriace, ligneux, s'ouvrant au sommet. Genre 10, *touretia*, 140. — Genre 11, *martinia* ou *bicorne*, 142. — Genre 12, *cranio-laïre*, 143. — Genre 13, *pedalium*, 144.

BIHOREAU (le). Oiseau qui ressemble au héron. — Sa description, LVII, 314. — C'est un oiseau de passage, 318. — Le bihoreau de Cayenne, 321. — Le bihoreau de l'Esclavonie, par Virey, 322.

BILOBÉ (le). 67^e espèce du genre des poissons appelés *sparés*. *Hist. des Poissons*, IX, 400; X, 120.

BIMACULÉ (le). 39^e espèce du genre des poissons appelés *chétodons*. *Hist. des poissons*, XI, 117, 164.

BIMBELÉ (le) ou LA FAUSSE LINOTTE. Oiseau de Saint-Domingue. — Sa description, LII, 127, 128.

BILIMBI. *Voy.* CARAMBOLIER.

BINNY (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 77. — Sa description et sa nomenclature, 124.

BINOCLE, *binoculus*. Insecte du genre des pneumonures. *Hist. des Insectes*, III, 16. — Sa description par Geoffroy, IV, 119 — Lieux où on le trouve, 121. — Le binocle penningère, 122. — Observation de Cuvier sur le binocle de Gasterastes, 123. — Autres remarques sur le même, 126.

BIPHORES (les). Genre 107 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 166. — Sa description, 168. — Ses usages et ses habitudes, 172. — 8 espèces, 175.

BIPINNULE (la). Genre 14 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 211. — Espèce connue, 212.

BIRAYÉ (le). 98^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 145 et 280.

BISCUTELLA. Genre 15 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 53. — 4 espèces, 54.

BIS-ERGOT (le). Espèce de perdrix du Sénégal, XLIII, 39. — Sa description, 40.

BISSET (le). Espèce de pigeon sauvage, XLIII, 157. — Il est la tige primitive de tous les autres pigeons, *id.*, et 163. — Ses différentes dénominations, 164.

BISMUTH (le), ou étain de glace. Sa ressemblance avec le régule d'antimoine, XII, 113. — Ses qualités, 115. — Ses propriétés, 116. — Effets de l'air sur lui, 117. — Sa formation, 119. — Ce qu'il devient exposé en infusion à l'air libre, *idem.* — Ses alliages, 120. — Sa dissolution, 121. — Lieux où il se trouve, 123. — Etamage avec le bismuth, 125 (note). — Ses propriétés en médecine et ses autres usages, 126. — Le bismuth est le seul de tous les demi-métaux, avec lequel le mercure s'amalgame naturellement, 66. — Sur la mine de bismuth, 127 (note). — Sa cristallisation, XIV, 135 (note). — Ses concrétions, 172. — Du bismuth et de ses différentes espèces, XVI, 174.

BISON (le) ou Bœuf sauvage d'Amérique, des Indes,

XXIII, 48. — Sa description, **XXV**, 13. — Celui à bosse de l'île de Bourbon, produit avec nos bœufs ordinaires. Observation et lettre à ce sujet, de M. Nux, 14. — Caractère du bison d'Amérique, 16. — Le Bison est une espèce de buffle; son origine, **XXIX**, 109. — En quoi il diffère de l'aurochs, 113. — Quelles contrées il habite, 115. *Voyez* Bœuf. — Bisons d'Amérique, 135. — Comparaison entre le bœuf et le bison, 137. — Bison apprivoisé, 138, 139. — Sa comparaison avec les bisons blancs du Nord, 143. — Attachement du bison pour sa mère, 146. — Variété du bison en Amérique, *idem*. — Laquelle est la première de la race de l'aurochs ou de celle du bison, 156. — Bison de Moldavie, 148.

BISSERULA. Genre 60 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, **XVII**, 336.

BISTOURNÉ. Ce que signifie ce mot, **XXIII**, 19.

BISTROPOGONS (les). Genre 22 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, **XV**, 321. — 7 espèces connues, 322.

BITOMES (les). Genre 203 des insectes xilophages. 4 espèces, celui crenelé, celui ruficorne, *Hist. des Insectes*, **XI**, 240. — Celui rugicolle, et celui rufipenne, 241.

BITTAQUE, *bittacus*. Insecte du genre des panorpatés; ex. *panorpa tipularia*. *Hist. des Insectes*, **III**, 295. — Genre 309, **XIII**, 19.

BITUME. Son existence dans les bois Fossiles, **IX**, 152. — Dans le charbon de terre, 160. — Origine du bitume et ses différences, 196, 233. — Sur celui qui s'élève du fond de la mer Morte, ou le lac Asphaltique de Judée, 209. — Sur les bitumes liquides, 212. — Source bitumineuse à une demi-lieue de Clermont en Auvergne, 215. — Remarques à ce sujet, de M. Guettard, 217. — Le fameux baume-momie, en Perse, n'est qu'un bitume, 222. — Bitumes d'Amérique, 226. — Bitumes purs, 228. — Le bitume peut être regardé comme un quatrième aimant de la nature, **XII**, 305.

BIXA. *Voy.* ROCOU.

BIZAAM (le). Espèce de chat sauvage, décrit par Vosmaer, XXXIII, 162.

BLAC (le). Espèce de milan. — Sa description, XXXVIII, 282.

BLACHERA. Genre 1 des plantes dites melastomes. *Hist. des Plantes*, XVII, 16.

BLÆSIA. Genre 2 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 228

BLAFARDS Indiens, XX, 341. — Ils ne forment point une race réelle, 354. — Leurs variétés et différences, 364.

BLAGRE (le). Espèce de balbuzard, oiseau de proie. Le balbuzard de l'Afrique, par Sonnini, XXXVII, 359.

BLAGUES ou **BLADES**. Nom qu'on donne à la poche du pélican, et dont on se sert comme de vessie pour renfermer le tabac à fumer, LX, 31 (note).

BLAIREAU (le). Sa description, XXIV, 334. — Comment on le chasse; ses habitudes, 336. — Il est naturellement frileux, et sujet à la gale, 338. — Ouverture particulière qu'il a entre l'anus et la queue, 339. — S'il y a plusieurs espèces de blaireaux, 340. — Lieux où on le trouve, 343.

BLAKWELLIA. Genre 51 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 167.

BLANC (le). 24^e espèce du genre des poissons appelés salmones. *Hist. des Poissons*, XII, 116, 198.

BLANC DE BALEINE. Sur celui qu'on tire du cachalot macrocéphale. *Hist. des Cétacées*, 267. — Canal qui le distribue, 270. — Ce qu'a dit M. Fourcroy de ce blanc de baleine, 272. — Il n'est pas, selon lui, particulier au cachalot, il est très-abondant dans la nature, 277. — Dénomination d'*adipocire* qu'il lui donne, 279. — Vertus qu'on lui attribue, 280.

BLANCHARD (le). Espèce d'aigle, par Sonnini, XXXVII, 347. — Sa description, 348. — Singularités de sa chasse, 349. — Son pays, 350.

BLANCHE-COIFFE (le) ou le Geai de Cayenne, XLIV, 253.

BLANCHE-RAIE (le). Étourneau des terres Magellaniques, XLV, 78.

BLANCHET (le). 3^e espèce du genre des poissons appelés *osmères* *Hist. des Poissons*, XII, 208, 217.

BLANC-NEZ (le) Espèce de guenon décrite par M. Allamand, XXXVI, 72. — Ses caractères distinctifs, 75. — La guenon à nez blanc proéminent, 78. — Description du mâle, 79.

BLANCOR (le). 64^e espèce du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 190 et 250.

BLAPS. Insecte du genre des ténébrionites, proprement dits; ex. *Blaps mortisaga*. *Hist. des Insectes*, III, 175. — 136^e genre d'insectes, 5^e espèce de la 29^e famille, les ténébrionites, X, 277. — 4 espèces, 278.

BLASIA. Genre 2 des plantes dites hépatiques. *Hist. des Plantes*, III, 115 — IV, 42.

BLATTE. Insecte fétide et puant des Colonies; ravages qu'il fait dans l'épicerie. *Hist. des Mollusques*, I, 297. — *Blattia orientalis*. *Hist. des Insectes*, III, 269. — 250^e genre d'insectes formant la 2^e section des orthoptères, XII, 91. — Leur propagation et leurs métamorphoses, 92. — 8 espèces, 96.

BLÉ (le). Ce n'est point un don de la nature, mais le grand, l'utile fruit des recherches et de l'intelligence de l'homme, IV, 36. — Dégâts qu'y font certains insectes, et sur-tout le charanson. *Hist. des Insectes*, I, 159, 162, 166, 379. — Ses maladies. *Hist. des Plantes*, VII, 96. — Comment on l'emploie, 101. Voyez FROMENT. — La larve de la calèndre du blé; ce que c'est. *Hist. des Insectes*, XI, 54. — Dégâts qu'elle occasionne, 57. — Moyens imaginés pour la détruire, *idem*. Voy. CHARANSONITES. — Comment les greniers destinés à recevoir et à conserver le blé, doivent être situés et construits, 63.

BLECHNUM. Genre 12 des Fougères, *Hist. des Plantes*, III, 210. — 2 espèces, 211. — IV, 66.

BLÉ DE VACHE. Nom donné au mélampyre des champs, et pourquoi. *Hist. des Plantes*, XV, 75.

BLÉNDE (la). Espèce de métal, XII, 131. Comment on en tire le zinc, 135. — Elle donne par la cé-

mentation un beau laitou, 140. — Comparaison entre la blende et la calamine, 130. — Blendes artificielles, 141.

BLENNIES (les). Genre 48 des poissons; le corps et la queue allongés et comprimés, deux rayons au moins, et quatre rayons au plus à chacune des nageoires jugulaires. Sous-genre 1, deux nageoires sur le dos, des filamens ou appendices sur la tête. Espèce 1, le blennie lièvre; espèce 2, le blennie phycis. *Hist. des Poissons*, VII, 81. — Sous-genre 2, une seule nageoire dorsale, des filamens ou appendices sur la tête; espèce 3, le blennie méditerranéen; espèce 4, le blennie gattorugine; espèce 5, le blennie sourcilleux; espèce 6, le blennie cornu; espèce 7, le blennie tentaculé; espèce 8, le blennie sujestien; espèce 9, le blennie fascé; espèce 10, le blennie coquillade; espèce 11, le blennie sauteur; espèce 12, le blennie pinaru, 83. — Sous-genre 3: deux nageoires dorsales, point de barbillons ni d'appendices sur la tête; espèce 13, le blennie gadoïde; espèce 14, le blennie belette; espèce 15, le blennie tridactyle, 84. — Sous-genre 4, une seule nageoire dorsale, point de barbillons ni d'appendices sur la tête; espèce 16, le blennie pholis; espèce 17, le blennie bosquien; espèce 18, le blennie ovovipare; espèce 19, le blennie gunnel, 85. — Espèce 20: le blennie pointillé; espèce 21, le blennie garamit; espèce 22, le blennie lumpène; espèce 23, le blennie torsk, 86. — Le blennie lièvre; sa synonymie, 87. — D'où vient son nom blennie, 88. — Lieu où il se trouve et sa description, 89. — Ses propriétés, 92. — Le blennie moule ou phycis; sa synonymie, 93. — Ses couleurs, 94. — Ses nageoires, 95. — Le blennie méditerranéen, sa synonymie et sa description, 96. — Le blennie gattorugine, sa synonymie et sa description, 99. — Le blennie sourcilleux, sa synonymie, 101. — Ses couleurs, 102. — Sa description, 103. Description des espèces, 6, 7, 8 et 9, 105. — Le blennie coquillade, sa synonymie, 111. — Sa description, 112. — Le blennie sauteur, sa description, par Commerson, 114. — Ses habitudes, 115. — Le blennie pinaru, sa synonymie, sa description, 119. — Descrip-

tion des espèces 13, 14 et 15, p. 121. — Le blennie pholis; sa synonymie, 127. — Sa description, 128. — Ses habitudes, 130. — Description du blennie bosquien, 132. — En quoi ce blennie diffère du pholis, 133. — Le blennie ovovipare; sa synonymie, 136. — Traits distinctifs et formes principales de ce blennie, 139. — Sur sa chair et son usage, 140. — Quelle est sa manière de venir au jour, 141. — Le blennie gunnel; sa synonymie, 147. — Ses couleurs, 148. — Sa description, 149. — Ses variétés, 150. — Description du blennie pointillé, 152. — Synonymie et description des espèces 21, 22 et 23, 154.

BLENNIOÏDE (le). Espèce 5 des poissons osseux de la classe des gades. *Hist. des Poissons*, VI, 323. — Sa description, 325. — Ses rapports avec le merlan, 326. — La batrachoïde, autre poisson du genre des osseux; sa description, 393.

BLETTES (les). Genre 23 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 66. — Espèces de France et deux espèces connues, 67.

BLOCH (le). Espèce 6 du genre des poissons appelés bodians. *Hist. des Poissons*, X, 302, 314.

BLONGIOS (le). Espèce 10 des hérons crabiers de l'ancien continent, LVII, 227. — Lieux où il se trouve, 229. — Le petit blongios de la mer Caspienne, par Virey, 231.

BLUET (le). Oiseau de Cayenne, formant la 14^e espèce des oiseaux tangaras, XLVIII, 305. — Sa description, 306.

BLUET (le), vulgairement barbeau, audifoin, blaverole, casse-lunette. *Hist. des Plantes*, XII, 128. — Le barbeau jaune, 131. — Autres espèces, 138.

BOA-MOLUROÏDE (le). Espèce de couleuvre décrite par Schneider. *Hist. des Reptiles*, VII, 170.

BOAS (les). Genre 1 des serpents; leur description. *Hist. des Reptiles*, V, 106. — Ce qu'en ont dit différents auteurs, 108. — Entr'autres Schneider, 109. — Genre auquel on a donné le nom de Python, 111. — Serpent décrit par Adanson, 112. — Le nintipolonga, 113. — Le céraste de Siam, le corallin d'Am-

boine, 114. — Le xaxalhua du Mexique, *idem.* — Celui ammodyte de Surinam, 115. — Le boa réticulé; sa description, par Schneider, 116. — Le boa broderie, décrit par Linnæus, 119. — Sa description, 120. — Le boa élégant de Surinam, 123. — Sa description, 124. — Ses dimensions, 126. — Le boa ophrias, décrit par Linnæus, 128. — Le boa enydre, par le même; sa description, 130. — Le boa aboma d'Amérique, par Stedman, 134. — Histoire à ce sujet, 135. — Sa description, 141. — Ses habitudes, 142. — Le même, par le Vaillant, 144. — Vénération qu'ont pour lui les Mexicains, 146. — Le boa cenchris de Surinam, 147. — Autre espèce décrite par Gronovius, 148. — Le boa empereur; sa description, 150. — Le boa de Ternate; sa description, 153. — Le boa rativore, 155. — Sa description, 156. — Le boa anacondo, décrit par Latreille, 161. — Description d'un jeune, 165. — Le boa scytale, dont parle Linnæus, 168. — Sa description, 172. — Le boa devin; sa synonymie, 174. — Sa description et ses habitudes, 177. — Ses couleurs, 180. — Respect qu'ont pour lui les Nègres, 182. — Anecdote à ce sujet, 183. — Exagération des voyagers sur les serpens boas, 184. — Histoire de Dellon à ce sujet, 185. — Manière dont on prit en Egypte un serpent extrêmement long, décrite par Diodore de Sicile, 186. — Autres espèces de boas devins, 189. — Serpent géant, décrit par Adanson, 190. — Manière dont cet animal chasse, 191. — Bien qu'il fait, 193. — Ses habitudes, *idem.* — Ses variétés, 194. — Ses principales dimensions, par Merrem, 199. — Particularités de ce serpent, par Schneider, *idem.* — Ce qu'en dit Linnæus, 200. — Celui porte-anneaux; sa description, 202. — Le boa hypnale, 207. — Ce qu'en dit Schneider, 208. — Le boa orné du Bengale; sa description, par Russel, 210. — Le boa bojobi, serpent de l'Amérique méridionale, 215. — Sa description, 216. — Le boa couronné, et sur les pseudo-boas, 220. — Le boa à écailles carenées, 222. — Sa description, 225. — Addition à l'article du boa réticulé. *Hist. des Reptiles*, VIII, 319. — Tableau méthodique de ces reptiles, 381.

BOBAX (le). Espèce de marmotte de Pologne, XXXII, 219. — Sa description, 220.

BOBORO. Nom d'un mets particulier des Indiens. *Hist. des Plantes*, XV, 212.

BOCCONE. Genre 6 des plantes papavéracées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 15.

BODDAERT (le). Espèce 2 du genre des poissons appelés acanthopodes. *Hist. des Poissons*, XI, 238, 240.

BODIANS (les). Genre 115 des poissons, un ou plusieurs aiguillons et point de dentelure aux opercules; un seul barbillon, ou point de barbillon aux mâchoires; une seule nageoire dorsale. — Sous-genre 1. — La nageoire de la queue fourchue ou en croissant. — Espèce 1: le bodian œillère. *Hist. des Poissons*, X, 300, 310. — Le bodian louti, 300, 312. — Le bodian jaguar, 301, 313. — Le bodian argenté, 301, 314. — Le bodian lunaire, 306, 320. — Le bodian mélano-leuque, 306, 321. — Le bodian jacob-evertsen, 306, 322. — Le bodian bœnak, 307, 323. — L'hiatulé, 307, 324. — L'apua, 308, 324. — L'étoilé, 308, 325. — Le tétracanthé, 309, 327. — Le bodian à six raies, 309, 327. Voyez dans ce volume les autres espèces de **BODIANS**.

BODROU-PAM (le), ou vipère verte. Expériences faites sur sa morsure. *Hist. des Reptiles*, VI, 112.

BŒA. Genre 21 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 33.

BOEBERE (la) chrysanthemoïde. Genre 109 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 401. — Une espèce connue, 404.

BŒCKEA. Genre 18 des plantes dites épilobes. *Hist. des Plantes*, XVII, 51.

BOEHMERIES (les). Genre 15 de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 110. — 4 espèces connues, 111.

BOERRHAAVIA (les). Genre 5 de la famille des belles-de-nuit. *Hist. des Plantes*, XI, 289. — 12 Espèces connues, 290.

BŒUF (le). C'est, de tous les animaux domestiques, celui sur lequel la nourriture paroît avoir la plus grande influence, XXII, 326. — Sa dégénération, 327. —

Comment on l'engraisse, XXIII, 11, 44. — Utilités sans nombre qu'on tire du bœuf, 13. — Par sa manière de tirer, il semble avoir été fait exprès pour la charrue, 14. — Services qu'il rend pour l'agriculture, 17. — Sa castration, 19. — Son sommeil, et variétés de sa couleur, 26. — Description du bon bœuf pour la charrue, et comment on l'y accoutume, 27. — Durée de son service, 29. — Accroissement de ses cornes, 32. — Comment on connoît son âge, ses dents et ses cornes, 30. — Méprise relative à ce sujet, 31. — Sa nourriture, 33. — Sa rumination, et son explication, 35. — Comment on le nourrit l'hiver, 39. — Tens de son travail, 40. — Il aime beaucoup le vin, le vinaigre et le sel, 43. — Comment il broute, 46. — Différentes espèces de bœufs, 47. — Sur le bison des Indes, 48. — Bœufs et vaches d'Irlande et de Norvège, 51. — Usage qu'on tire des différentes parties du bœuf, 52. — Addition à l'article du bœuf, par Sonnini, 54. — Description du mufle ou museau du bœuf, et de ses autres parties, 55. — Ses estomacs, 56. — Description de ses autres parties intérieures, 58. — Ingratitude de l'homme envers le bœuf, 59. — Variétés de ses espèces, XXV, 12. — Bœufs à bosse, XXIX, 88, 95, 115, 119. — Leurs différences avec ceux d'Europe, 120. — Couleur des bœufs à bosse, et leurs variétés, 125. — Leur castration dans les Indes, 128. — Manière de les ferrer, 129. — Les Hottentots s'en servent pour la guerre, 130. — Bœufs sans bosse en Amérique, 135. — Ceux de la Louisiane, 136. — Comparaison entre le bœuf et le bison, 137. — Remarques sur le bœuf de Sicile, 149. — Le bœuf musqué, 150, 158. — Le bœuf habite par-tout, excepté dans l'Amérique méridionale, 154. — Différence du bœuf avec le buffle, 159. — Le bœuf et le buffle forment chacun un animal particulier, 197. — Leurs différences, 198.

BOGARAVEO (le). Espèce 29 du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 385. — X, 85.

BOHAR (le). Espèce 10 du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 104, et 178.

БОЖКАТ (la raie). Espèce 22. *Voy. le mot RAIE*.

BOIGA (le). Espèce de couleuvre ou de serpent, qui réunit au plus haut degré tous les attributs particuliers à ces sortes d'animaux. *Hist. des Reptiles*, VII, 63. — Ses habitudes, 65. — Sa description, 66. — Ses couleurs, 67.

BOIQUIRA (le). C'est le serpent à sonnettes; détails à son sujet. *Hist. des Rept.*, V, 50. — Ce que dit Bartram de ce reptile, 58 (note). — Sa nourriture, 60. — Expériences faites sur un boiquira conservé cinq ans en vie, 61. — Fait qui prouve que ce reptile cache ses petits dans sa bouche, et les rend après le danger, 66.

BOIS (le). Expériences sur sa force, VI, 180. — Résultats, 197. — Son organisation; idée de la manière dont les arbres croissent, et de la façon dont le bois se forme, 181. — Sur la formation des cônes ligneux, 184. — Expériences sur le bois, 189. — Description de la machine qui a servi à ces expériences, 191. — Effets du tems sur la résistance du bois, 201. — Choses à cet égard qui restent encore à trouver, 204. — Expériences sur le chêne de différents âges, pour reconnoître sa densité, 205. — Sur la différence de sa forme dans les mêmes âges, 211. — Examen des couches ligneuses du bois, 215. — Autres expériences sur la résistance du bois, 219. — Autres expériences en grand, 223. — Il résulte de ces expériences, au nombre de dix-sept, que la résistance du bois n'est point en raison inverse de sa longueur, 247. — Objection et réponse, 248. — Autres expériences, au nombre de douze, sur la résistance des bois, 250. — Règle de Galilée à modifier sur la résistance des solides en général, et du bois en particulier, 266. — Résultats des expériences précédentes, 267. — Tables des expériences sur la force du bois, 269. — Moyen facile d'augmenter la solidité, la force et la durée du bois; il consiste à écorcer l'arbre, du haut en bas, dans le tems de la sève, et à le laisser sécher entièrement sur pied, avant de l'abattre. Avantages précieux de cette méthode, 276, 381. — Ce que Vitruve et Evelin ont dit à ce sujet, et lois, 277. — Expériences et résultats, 278. — Cause, dans ce cas, de l'augmentation de

solidité et de force dans le bois, 290. — Résultats de quelques autres expériences qui ont rapport à cette matière, 291. — Réflexions sur la défense de l'écorcement des arbres, 297. — Pourquoi il faut choisir pour cette opération le tems de la plus grande sève, 300. — Expérience sur le desséchement du bois à l'air, et sur son imbibition dans l'eau, 322. — Table de l'imbibition dans l'eau de morceaux de bois entièrement desséchés, 324. — Résultat de l'expérience à ce sujet, et qui a duré vingt ans, 342. — Expérience pour connoître la différence de l'imbibition du bois, dont la solidité est plus ou moins grande, 345. — Singularité de cette expérience, 348. — Conclusions à tirer de l'imbibition du bois, 353. — Sur celle du bois vert, 354. — Sur celle du bois sec, 256. — Résultats, 363. — Sur la conservation et le rétablissement des forêts, 367. — Note à ce sujet, de Sonnini, *idem*. — Remarques de Reaumur sur l'état des bois de la France, 370. — 1^{er} moyen de conservation des bois, 371. — Le bois des baliveaux n'est pas de bonne qualité, 372. — Sur la loi de réserve, 374. — Sur les bois courbes, et les moyens de les conserver, 376. — La gelée est le fléau des taillis, 377. — Moyen d'y remédier, 378. — Sur leur coupe, 379. — 2^e moyen de renouveler les bois, 381. — La manière de semer et de planter les bois, 383. — Expériences à ce sujet, 384. — Moyen de reconnoître les espèces de terrains incultes, 395. — Moyens de convertir en bois un champ, en faisant du couvert, ce qui est le plus difficile, 405. — Avantage de la culture par rapport au bois, 408. — Expériences à ce sujet, 409. — Moyen de suppléer aux labours et à presque toutes les autres espèces de culture, qui est de couper les jeunes plants de bois jusqu'auprès de la terre. Détails, 413. — Remarques qui doivent précéder toute culture, 420. — Additions aux observations précédentes, 422. — Coupe dans les bois ordinaires, 429. — Procédé qu'emploient les Nègres pour travailler le bois, de manière qu'il remplace le fer, X, 411. — Dégâts et ravages que font certains insectes dans le bois. *Hist. des Insectes*, I, 159. — Bois flottans qu'on rencontre dans la

haute-mer. *Hist. des Mollusques*, I, 302. — Ce que le bois devient lorsqu'il prend la place des couches de l'aubier. *Hist. des Plantes*, 177. — Etat du tissu cellulaire des bois. 178. — Ce que deviennent successivement les couches ligneuses, 179. — Travail de la nature à ce sujet, 180. — Causes qui modifient les couches ligneuses d'un même individu, 181. — Différente épaisseur des couches, et différence entre le bois de diverses espèces d'arbres, 182. — Plantes des bois, 343.

BOIS A BOUTON (le). *Hist. des Plantes*, XIV, 121.

BOIS-AGATHE, XIII, 82.

BOIS CASSANT. (le) *Hist. des Plantes*, XIV, 93.

BOIS-CHANDELLE, ou le Dragonier à feuilles renversées. Genre 1 de la 1^{re} section de la famille des asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 94.

BOIS DE FER (le). *Hist. des Plantes*, XIII, 372.

BOIS DE LANCE (le). *Hist. des Plantes*, XIV, 6.

BOIS DE L'OSTEAU. *Hist. des Plantes*, XIV, 57.

BOIS DE RAT. *Hist. des Plantes*, XIV, 95.

BOIS DE RIVIÈRE. *Hist. des Plantes*, XIV, 59.

BOIS DE SANTAL d'Amérique. *Hist. des Plantes*, XIV, 92.

BOIS FOSSILES. Extrait des Observations de M. Tozzetti, IX, 149. — Bois fossiles compris avec le jayet 206.

BOIS PÉTRIFIÉ, III, 82.

BOIS-PUANT, *anagyris*. Genre 26 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 277.

BOIS PUNAIS (le) ou le sanguin. *Hist. des Plantes*, XIV, 170.

BOISSON. Sur les différentes manières de boire, de l'homme et des animaux, XXII, 236, 237.

BOITEUX. L'hyène est boiteuse de la jambe gauche, lorsqu'elle commence à marcher, XXVII, 21, 28.

BOJOBI (le), *boa canina*. Sur la morsure de ce reptile. *Hist. des Reptiles*, I, 144.

BOKULAWA ou BONIKULAWA. Nom donné à une couleuvre qu'on dit vomir l'ambre. Fable de Rumphius à ce sujet. *Hist. des Mollusques*, I, 364. — Ce n'étoit qu'une baleine, 366.

BOLAX. Genre 48 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 348.

BOLCA. Mont volcanique , près de Vérone. Exemples qu'il fournit des modifications qu'éprouvent les espèces jusqu'à leur destruction, et les poissons pétrifiés. *Hist. des Poissons*, I, 399. — Ce mont offre les empreintes les plus nettes ou les restes les mieux conservés d'un grand nombre d'espèces de poissons, 402.

BOLS. Espèce de terre, XIII, 422. — Ils sont tous de la même essence, 423. — Sur les bols blancs, 424. — Sur le bol rouge, 426. — Sur le bol jaune, 434. — Sur le bol d'Arménie, et lieux où il se trouve, 438.

BOLTONES (les). Genre 124 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 38. — 2 espèces connues, *idem*.

BOLTY OU LE NIL. 56^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 130 et 225.

BOLET. Genre 7 des champignons. *Hist. des Plantes*, III, 45 — 12 espèces, 46. — Leurs propriétés, 48. — 7 autres espèces, 59.

BOMARES (les). Genre 19 de la famille des narcissus. *Hist. des Plantes*, IX, 71. — Espèces connues, *idem*.

BOMBARDIERS, *crepitantes*. Insectes d'un genre particulier *Hist. des Insectes*, III, 84.

BOMBAX. Voy. FROMAGER.

BOMBYCINE, *bombycinæ*. Insecte du genre des papillons. *Histoire des Insectes*, III, 404. — Famille 3, V, 322. — Famille 81, XIV, 142. — Leurs habitudes, 143. — Leurs chenilles, *idem*. — De quoi ils se nourrissent, et tort qu'ils font, 144. — Leurs métamorphoses, 145. — Sur ceux qui vivent en société, 146. — Leur changement en chrysalides, 147. — Genre 438, les trépiées, 174. — Genre 439, les cossus, *idem*. — Genre 470, les zenzères, 175. — Genre 441, les bombyx, *idem*. — Genre 442, les lithosies, 189. — Genre 443, les noctuelles, 198.

BOMBYLE, *bombylius*. Insecte papillon. *Hist. des*

Insectes, III, 249. — Genre 469, insectes de la famille des bombyliers, XIV, 297, 298.

BOMBYLIERS, *bombylarii*. Insectes du genre des papillons. *Histoire des Insectes*, III, 427. V, 329. — Famille 86, XIV, 296. — Genre 479, les bombyles, 298. — Genre 480, les ploas, 299. — Genre 481, les usies, 300. Genre 482, les cyllenies, 301.

BOMBYX. Insecte du genre des papillons bombycines. *Hist. des Insectes*, III, 405. — Genre 431, insectes de la famille des bombycines, XIV, 175. — 49 espèces, *idem*. et p. suiv. — Chenilles appelées fileuses, 148. — Etoffes qu'elles produisent, 150. — Le bombyx uni ou le vers à soie, *idem*. Voy. ce mot.

BONANA. Espèce de pinçon, XLVIII, 35.

BONASUS (le). Espèce de buffle. Celui d'Aristote est le même que le bison des latins, XXIX, 107. — Ce qu'en a dit Gesner, *idem*. — Sa description, 108. Voy. BUFFLE.

BONDELLES (les). Variété des poissons appelés *lavarets*, première espèce des coregones. *Hist. des Poissons*, XII, 233, 234.

BONDRÉE (la). Espèce d'oiseau de proie qui approche de la buse, XXXVIII, 249. Sa description, 250. — Structure de son nid, 251. — Comment il saisit sa proie, 253.

BONGARES (les). Genre 4 des serpents de l'ordre 3^e des ophiidiens. *Hist. des Reptiles*, V, 263. — Le bongare à anneaux, 265. — Ce qu'en dit Russel, 266. Le bongare bleu, 270. — Ce qu'en dit Russel, 271. — Tableau méthodique de ces reptiles, VIII, 385.

BONHEUR. Comparaison de celui de l'homme avec celui des animaux, LVII, 112.

BONITÉ (le). 6^e espèce de poissons appelés *scambres*. Voy. ce dernier nom.

BONJOUR-COMMANDEUR (le). Oiseau de Cayenne, de l'espèce du bruant, XLIX, 105.

BONNET (le). C'est ainsi qu'on appelle le second estomac du bœuf, XXIII, 34. — Remarque à ce sujet, 38. — Sa description, 57.

BONNET CHINOIS (le). Espèce de singe ou de guenon à longue queue, XXXVI, 14. — Ses caractères distinctifs, 22. — Sa description anatomique, par Daubenton, 23.

BONNET DE DRAGON. Espèce de coquille univalve, décrite par Dargenville. *Hist. des Mollusques*, IV, 61 et 64.

BONNET D'ELECTEUR ET DE PRÊTRE. *Hist. des Plantes*, XIV, 284.

BONTIA. Genre 17 des plantes dites solanées. *Hist. des Plantes*, XVI, 73.

BONUK (le). 2^e espèce du genre des poissons appelés *argentines*. *Hist. des Poissons*, XII, 361, 366.

BOOPS (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés *cheilodiptères*. *Histoire des Poissons*, IX, 318 et 325. — On appelle du même nom la 12^e espèce du genre des poissons dits *sparcs*, 376; sa description, X, 67.

BOOPIS (les). Genre 60 des plantes composées. Voy. leur histoire, XII, 182. — 2 espèces connues, 84.

BOPYRE, *bopyrus*. Insecte du genre des cloportides; ex. *monoculus orangorum*. *Hist. des Insectes*, III, 43. — Genre 10 d'insectes de la famille des cloportes; leur origine, VII, 50. — Leur description, 52. — Leurs segmens, 53. — Leur queue, 54.

BORA (le). Espèce de serpent python du Bengale. *Hist. des Reptiles*, V, 236. — Sa description, 238.

BORACITES. Pierres calcaires, XVI, 226, 240.

BORANDIENS (les). Doutes sur l'existence de ce peuple, XX, 78, 102.

BORAX (le). Sel qui vient de l'Asie, X, 206. — Lieux où on le trouve, 207, 218. — Sur celui brun, 208. — Sur ses cristaux, 211. — Comment on prouve qu'il contient une grande quantité d'alkali, 212. — Sel sédatif d'Homberg, 213. — Sa plus utile propriété, 220. — Arsenic qu'il contient 221. — Du Borax ou tincal, XVI, 211.

BOSBOK (le). Espèce de gazelle décrite par M. Alamand, XXXI, 49. — Ses dimensions, 52.

BORBONIA.

BORBONIA. Genre 32 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 282.

BOSE (la) à feuilles de lilas. Genre 5 de la famille des plantes appelées arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 16. — Espèce connue, 17.

BOSPHORE (le), Critique de ce que dit M. de Tournefort sur cette mer, II, 192.

BOSQUIEN (le). Poisson du genre de ceux appelés pimeleptères. *Hist. des Poissons*, XI, 81, 82. — Sa description, 83.

BOSSE. (la) D'après les expériences de M. de la Nux, elle ne fait pas un caractère essentiel du chameau, XXV, 16.

BOSSU. (le) ou le Kurte blochien, poisson osseux. *Hist. des Poissons*, VII, 166. *Voy. KURTE*.

BOSTRICHE, *bostricus*. Insecte; ex. *Apate capucinus*. *Hist. des Insectes*, III, 203. — Le Bostriche commun ou le chancra scolite typographe, insecte très-nuisible aux arbres, connu en Allemagne sous le nom de sapin ou de ver noir, XI, 195. — Ses travaux, 196 et suiv. — Détails des dégâts qu'il a occasionnés aux arbres d'Allemagne, 200. — Le nombre des arbres attaqués s'est monté, dans le Hartz seul, à un million et demi, 201. — Sur le bostriche appelé *scolite calcographe*. Dégâts qu'il occasionne; 203. — Sur celui appelé *ligniperda*, 204. — 10 espèces de Bostriches, 224.

BOSTRICHINS, *bostrichini*. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 202. — V, 251. — Famille 31 des insectes; leur ressemblance avec les cérylons, XI, 222. *Voy. BOSTRICHE, CIS, ET CÉRYLONS*.

BOSTRYCHES (les). Genre 76 des poissons dits osseux; leurs caractères distinctifs. *Hist. des Poissons*. VIII, 159. — 2 espèces; 1°. Le bostryche chinois. Sa description, 160. — 2°. Le bostryche tacheté, 163.

BOSTRYCHOIDES (les). Genre 77 des poissons dits osseux; leurs caractères distinctifs, *Hist. des Poissons*, 164. — Celui ceillé, 165.

BOTANIQUE. Ses différens systèmes et ses différentes méthodes, I, 14. — Ce qu'en pense M. de Buffon, 17. Appréciation de la méthode de Tournefort, 20 — Con-

naissance des anciens sur la botanique, 54. — Nomenclature botanique. *Hist. des Plantes*, II, 103 — Exposition des méthodes de Tournefort, de Linnæus et de Jussieu, 237, 272, 296. — Caractères adoptés dans la botanique, III. Avant-propos, 14. *Voyez MÉTHODES*. — Catalogue des principaux auteurs et ouvrages qui traitent de la botanique, VI, 183.

BOTANISTE (le). Nécessité d'une méthode dans ses recherches et études. *Hist. des Plantes*, III, Avant-propos, p. 9.

BOTLA-PASERIKI (le). Seconde espèce de la couleuvre nasique. Sa description et ses habitudes. *Hist. des Reptiles*, VII, 13.

BOTYS. Insecte du genre des papillons. *Hist. des Insectes*, III, 414. — Le Botys de l'épi d'eau. Genre 448 d'insectes de la famille des phalénites, XIV, 219. — Leurs chenilles, *idem*. — 2 espèces de botys, 230.

BOUBIES (les). Oiseaux de mer, LX, 159 (note 2). *Voy. les Fous*.

BOUBOU (le). Espèce de pie-grièche; oiseau d'Afrique, décrit par Levaillant, XLVI, 177.

BOUC. Détails sur le bouc, XXIII, 100, 109. — Le bouc de Juda ou Juida, XXX, 224. — 2 sortes de bouc, 237 (note). — Leur chasse, *idem*. — Le bouc pasan produit le bezoard, 315.

BOUCAGE. Genre 2 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 257. — 3 espèces et leurs propriétés, 258.

BOUCHE. Sa description, XVIII, 397.

BOUCLÉE (la raie). 20^e espèce. *Voy. le mot RAIE*.

BOUCLÉ (le). 31^e espèce de squalé, et son caractère distinctif. *Histoire des Poissons*, IV, 123. — Ses piquans, 124 (note).

BOUCLIER, *silpha*. Insecte du genre des nécrophages; ex. *Silpha littoralis*. *Hist. des Insectes*, III, 122. — Genre 72 d'insectes. 13^e espèce de la famille 10^e, les nécrophages, IX, 252. — Leur description, 253. — Leurs habitudes, 254. — Leurs larves, 255. — 15 espèces, 256.

BOUCHIER de Minerve. Ce que c'étoit, et pourquoi ainsi appelé. *Hist. des Poissons*, IX, 311.

BOUGAINVILLE (la). Genre 9 de la famille des belles de nuit. *Hist. des Plantes*, XI, 295. — Espèce connue, 296.

BOUGIES. Expérience sur leur lumière. V, 305.

BOUILLON-BLANC. Genre 2 des plantes dites solanées. *Hist. des Plantes*, XVI, 46. — 8 espèces, 47. — Leurs propriétés, 48.

BOULBOUL (le). Espèce de pie-grièche de l'Inde, XXXIX, 319.

BOULEAUX (les). *Betula*. Genre 8 de la famille des plantes dites amentacées. Leurs caractères. *Hist. des Plantes*, X, 315. — 8 espèces de bouleaux et 5 espèces d'aunes, 316. — Le bouleau blanc, 318. — Usages du bouleau, 319. — Le bouleau noir, 320. — Le bouleau merisier, 321. — L'aune commun, 322. — Espèces de France, 323. — 13 espèces connues, 324.

BOULE DE NEIGE. *Hist. des Plantes*, XIV, 157.

BOULEROT (le). 8^e espèce des poissons dits gobies. *Hist. des Poissons*, VII, 217. Voy. GOBIES.

BOULETS. Expériences faites avec des boulets de fer forgé et battu, pour déterminer les progrès de la chaleur dans les corps, IV, 377. — Expériences faites sur des boulets de fonte de fer, 386 (note). — Perte qu'éprouvent les boulets chauffés trois fois jusqu'au blanc, V, 222. — Ce qu'on observe dans les boulets soumis à l'épreuve du plus grand feu, 231. — Sur la pesantur des boulets rouges refroidis, VI, 45. — Balances faites exprès, 46.

BOULIER, BOUILLIÈRE, BOULICHE, BOULIECH. Espèces de filets dont on se sert pour la pêche sur plusieurs côtes de la Méditerranée. Sa description et comment on s'en sert. *Hist. des Poissons*, XIII, 342.

BOULETTES 1(les). *Sphaeranthus*. Genre 58 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 178. — 5 espèces connues, 179.

BOULONNAIS (le). Rien n'atteste autant que l'aspect de ce pays, le déchirement occasionné par la puissance des vagues de la mer, qui a séparé l'Angleterre de la

France, et a formé un grand nombre d'îles. *Hist. des Mollusques*, IV, 181.

BOUQUETIN. Espèce de chamois; lieux où il se trouve, XXV, 36. — Les anciens ne l'ont pas distingué du chamois ni des chèvres, XXX, 201. — Ses différences avec le chamois, 204. — Détails particuliers, 208 et suiv. — En quoi il diffère du bouc, 220. — Lieux qu'il habite, 236. — Sa chasse, 237. — Propriété du sang de bouquetin, 246.

BOURDAINE. Genre 15 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 227.

BOURDON (le) *Bombas*. Exemple de gloutonnerie de cet insecte.. *Hist. des Insectes*, I, 150. — C'est un insecte du genre des apiaires; ex. *Apis terrestris*, III, 385. — Genre 422 d'insectes de la famille des apiaires, XIII, 392. — Leurs nids, 393. — Gâteaux qu'ils forment, 395. — Nid du bourdon des mousses, 396. — Leur cire, 398. — Leur nourriture, 400. — Leurs larves, 401. — Leurs ennemis, 404. — 9 espèces, XIV, 64.

BOURQUEMESTRE (le). Nom donné à un oiseau, 5^e espèce des goélands, LX, 246. — Pourquoi il est ainsi appelé, et sa description, 248. — Tendresse du mâle pour sa femelle, 250. — Ses œufs, *idem*.

BOURRACHES (les), *borraginææ*, 8^e ordre, famille 56 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 90. — Genres voisins de la famille des bourraches, 100. — Famille 56 des plantes, XVI, 76. § 1. Fruit, baie, arbres ou arbrisseaux. — Genre 4, patagonula. — Genre 2, sebestier, 77. — Genre 3, cabrillet, 79. — Genre 4, menais, 80. — Genre 5, varronia, *idem*. — Genre 6, tournefortia, 81. — § 2. Une ou deux capsules ou noix. — Genre 7, hydrophyllum ou feuille d'eau, 82. — Genre 8, phacelia, 83. — Genre 9, ellisia, 83. — Genre 10, dichondra, 84. — Genre 11, arguse, *idem*. — Genre 12, melinet, 85. — § 3. Quatre noix, plantes herbacées. — Genre 13, coldenia, 86. — Genre 14, héliotrope, 87. — Genre 15 viperine, 89. —

Genre 16, greuil, 91. Genre 17, pulmonaire, 93. — Genre 18 buglosse dorée, 95. — Genre 19, consoude, 96. — Genre 20, lycopsis, 97. — Genre 21, scorpione, 98. — Genre 22, la buglosse, 100. — Genre 23, la bourrache, 103. — Genre 24, la rapette ou porte-feuille, 104. — Genre 25, la cynolosse, 105. — Genre 26, nolana, 107. — Genre 27, siphonanthus, et genre 28, falkia, 108.

BOUSCARLE. Espèce de fauvette de Provence, *LI*, 109.

BOUSIERS (les). *copris*. Insecte du genre des coprophages. *Hist. des Insectes*, *III*, 140. — Genre 211, *X*, 98. — 7 espèces, 99.

BOUSOLE (la). Si les Arabes l'ont inventée, *I*, 300, 303; *idem*, *XV*, 93. — On se sert, en Suède, de la boussole pour trouver les mines, *X*, 235 (note), 282. — La boussole est très-anciennement connue des Chinois, *XV*, 83. Note d'un de leurs Empereurs sur leur boussole, 92. — Notes et remarques sur sa déclinaison, 26 et suiv. — D'où dépendent les variations à cet égard, 40. — Boussoles à pivot, 42. — Comment doivent être faites les aiguilles des boussoles verticales, 56. — Preuve que la direction polaire de la boussole étoit ignorée avant le douzième siècle, 82. — Sur la boussole des Japonais, 93. — C'est dans les annales de la France qu'il faut chercher l'époque de l'invention de la boussole, 97. — Date de son invention, et preuves à cet égard, 98, 99.

BOUT DE PETUN, ou bout de tabac. Nom ridicule donné aux anis, oiseaux du Brésil. *Voy. ANIS* (les).

BOUTON (le) dans les plantes. *Hist. des Plantes*, *I*, 217. — Ce qui distingue essentiellement les boutons, 218. — Plusieurs espèces, 219. — Leurs enveloppes, 220. — Les écailles, 221. — Organisation intérieure du bouton, 223. — Quelle est la durée du temps que le bouton emploie à se développer, 224. — Des feuilles dans le bouton des plantes ligneuses, 234. — Des boutons, *II*, 121.

BOUTON D'ARGENT. *Hist. des Plantes*, *XIII*, 134.

BOUTSALICK (le). Coucou du Bengale, LIV, 353. Ses différences avec celui d'Europe, 34.

BOUTTON (le). 16^e espèce des poissons appelés *holocentres*. *Hist. des Poissons*, X, 360 et 404.

BOUVERET (le). Oiseau de l'île de Bourbon et du Cap de Bonne-Espérance; espèce de bouvreuil, XLIX, 181.

BOUVERON (le), espèce de bouvreuil; sa description, XLIX, 184. — Le bouvreuil à plumes frisées du Brésil appartient à cette espèce, 185. — L'Amérique méridionale est la vraie patrie du bouveron, 186. — Particularités sur cet oiseau, 187.

BOUVIERE (la). 53^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 90. — Sa description, 197.

BOUVRETTE. Espèce de serinette destinée à donner des leçons de chant au bouvreuil, XLIX, 160 (note).

BOUVREUIL (le). Sa voix et son plumage, XLIX, 156. — Ses trois cris et son chant naturel, 158. — Celui de l'art, 160. — Il apprend facilement à parler; exemple à ce sujet, 161. — Son attachement à ses maîtres; sa mémoire, 162. — Son nid et sa ponte, son éducation, 163. — Ses voyages: ceux du mâle; et ceux de la femelle différent, 164. — Leur nourriture; ils paroissent attentifs et réfléchis, cependant leur attention est quelquefois en défaut, 165. — Manière de les prendre, 166. — Appareillement du serin avec le bouvreuil; exemple à ce sujet, 167. — Observations de Mauduyt sur les amours du bouvreuil, et durée de sa vie, 168. — Sa chair, sa grosseur et son poids, 169. — Couleurs des bouvreuils, 170. — Leur longueur totale, 171. — Dimensions intérieures d'une femelle disséquée, 172. — Variétés du bouvreuil, sur-tout par rapport à son plumage, 173. — Le bouvreuil blanc, 174. — Le bouvreuil noir, 175. — Le grand bouvreuil noir d'Afrique, 177. — Addition de Sonnini à l'article des variétés du bouvreuil. Le bouvreuil flamengo, 179. — Le bouvreuil blanc et noir, 180. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au bouvreuil. Le bouveret, 181. — Le bouvreuil à bec

blanc, oiseau de la Guiane, 183. — Le bouvron, 184. — Le bouvreuil à plumes frisées du Brésil lui appartient, 185. — Le bec rond à ventre roux, 188. — Le bec rond ou bouvreuil bleu d'Amérique, 190. — Le bouvreuil ou bec rond noir et blanc, 193. — Le bouvreuil ou bec rond violet de la Caroline, 195. — Le bouvreuil ou bec rond violet à gorge et sourcils rouges, 197. — La huppe noire, 199. — Addition de Sonaini à l'article des oiseaux qui ont rapport au bouvreuil. Le bouvreuil brun du Bengale, 201. — Le bouvreuil d'Orient, 203. — Le bouvreuil verd à croupion rouge de l'île de Java, 204. — Le bouvreuil nain de l'Inde et de la Chine, et ses variétés, 207. — L'atick de la baie d'Hudson, 208. — Le bouvreuil à sourcils noirs, 209. — Le bouvreuil à gorge rouge, 210. — Le bouvreuil de portorico, 211. — Le bouvreuil gros-bec, 213. — Le bouvreuil à poitrine noire, 215. — L'hambouveau, 217. — Le coliou, et ses différentes espèces. *Voyez* ce mot, 219. — Discussion sur les différents noms donnés au bouvreuil, LI, 198.

BRABEI (le) à feuilles en étoile. Genre 5 de la famille des plantes dites *protées*. Une espèce connue. *Hist. des Plantes*, XI, 210.

BRAC (le). Oiseau. 6^e espèce des calaos, LVI, 119.

BRACHINE, *brachinus*. Insectes du genre des bombardiers. Ex. *Brachinus crepitans*. *Hist. des Insectes*, III, 84. — Genre 12 d'insectes, VIII, 243. — Espèce 1, le pétard, *idem*; 2^o le pistolet; 3^o le fumant; 4^o le fastigié; 5^o le bimaculé, 244; — 6^o celui uni; — 7^o celui fulminant, 245. — 8^o celui mutilé; — 9^o celui tête rousse; — 10^o celui anneau, 246.

BRACHION (le). Espèce 93 du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 412; X, 141.

BRACHMANES. Origine de leur religion, XXIV, 281.

BRACHYCÈRE, *Brachycerus*. Insecte du genre des recticornes. Ex. *Brachycerus olgirus*. *Hist. des Insectes*, III, 197. — Genre 185 des insectes, XI, 95. — Le barbaresque, 1^{re} espèce, 96. — Le muriqué, 2^e espèce, 97.

BRACHYGLOTTE (le). Genre 104 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 361.

BRACHYRHINE. Insecte du genre des fructicornes. Ex. *Curculio pyri*. *Hist. des Insectes*, III, 200. — Genre 192 d'insectes, XI, 157. — 118 espèces, 158.

BRACHYSTÈMES (les). Genre 43 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 387. — 3 espèces connues, *idem*.

BRACHYURES. Insectes du genre des décapodes. *Hist. des Ins.*, III, 20. — Espèce de crustacée, V, 188. — Description de cette espèce, 347.

BRACTÉES (les). Enveloppes secondaires de la plante. *Hist. des Plantes*, I, 44. — Leurs diverses espèces, 45. — II, 190.

BRAIÈTES. *Hist. des Plantes*, XIV, 383.

BRAISE. Comparaison de celle du bois avec celle du charbon de terre, IX, 165.

BRAMES (les). Formule d'après laquelle ils calculent les éclipses, quoiqu'ils ignorent la composition de l'univers, IV, 12. — Preuve qu'ils n'ont pas imaginé cette formule, 13.

BRANCHES (les) des arbres. Leur organisation et leur développement. *Hist. des Plantes*, I, 276. — Origine des branches, 277. — La physionomie générale du végétal dépend de la disposition et de la direction des branches, 278. — Cinq différentes espèces de branches dans les arbres fruitiers, 279. — Correspondance des branches et des racines, 281. — Division des branches, II, 132.

BRANCHIES (les). Ce que c'est et où elles se trouvent. *Hist. des Mollusques*, 155. — *Idem*. *Hist. des Poissons*, I, 73, 100. — Leur usage, 104. — Insectes ou vers aquatiques qu'ont ces organes., II, 44. — Sur les ouvertures branchiales et épithètes qu'on leur a données à raison de leurs différences, 141. — Situation des branchies ou ouies des poissons, 147. — Leurs variétés, 148.

BRANCHIOGASTRÉS, *branchiogastra*. Insectes d'un genre particulier. *Hist. des Insectes*, III, 35. — Es-

pèce de crustacés, V, 192. — Description des crustacés de cet ordre, VI, 270. — Famille 1^{re}, squilliaires, *idem*.

BRANCHIOPODE, *branchiopoda*. Insecte du genre des céphalites. Ex. *branchiopoda stagnalis*. *Hist. des Insectes*, III, 19 — Parties externes du branchiopode cancriforme, IV, 133. — Comment il nage, 135. — L'animal considéré hors de l'eau, et description de son bouclier, 137, 146, 165. — Sa queue, 143, 164. — Son corps, 148. — Examen de cet insecte posé sur le dos, 151. — Ses côtes, 154. — Ses pattes, 157. — Partie supérieure du milieu de sa tête, 168. — Ses divisions très-étendues, 171. — Ses parties internes, 172. — Ses mœurs, sa crue, sa propagation, 173. — Son accroissement, 177. — Remarques particulières sur cet insecte, 182. — Espèce particulière, 183. — Branchiopode du genre des entomostracés céphalotes, 299. — Sa description, 300. — Ses antennes, 302. — Ce qu'en dit Schœffer, 304, 305. — Sur la femelle, 312. — Autres observations sur les branchiopodes, 315. — Extrait sur cet insecte, tiré du *Manuel du Naturaliste*, 316. — Description du branchiopode stagnal, 319. — Deux espèces, 320.

BRANCURSINE (la). Espèce d'acanthé. Détails. *Hist. des Plantes*, XV, 95. — BRANCURSINE la fausse. Voyez BERCE.

BRASILIEŒ (le). 124 espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 157, 300.

BRAS (les). Leur description, XVIII, 423.

BRASSICA. Voy. CHOU.

BRASSENIE (la) de Schreber. Genre 5 de la famille des plantes dites butomes. *Hist. des Plantes*, VIII, 205. — Espèce connue, *idem*.

BRATHYS. Genre 2 des plantes millepertuis. *Hist. des Plantes*, XVIII, 283.

BREBIS (la). Comparaison de nos chétives brebis avec le moufflon dont elles sont issues, XXII, 323. — Leur dégénération, 324. — Douceur de la brebis, sa timidité et ses autres qualités, XXIII, 61. — Les chèvres ont plus de sentiment, 64. — Soins à prendre de

la brebis, lorsqu'elle est prête à mettre bas, 66. — Tens de sa chaleur, et soins qu'on prend d'elle alors, 71. — Manière de les conduire, 74. — La tonte, 81. — Addition à l'article de la brebis, par Sonnini, et sur sa laine, 87. — Soins de Daubenton pour élever les troupeaux, 89. — La brebis a été transportée d'Europe en Amérique, XXV, 18. — Transportée, elle change, XXIX, 241. — Brebis d'Irlande, 242. — Brebis du Cap de Bonne-Espérance, 252. — Embonpoint des brebis, 256. — Brebis des Indes, 262. — Variétés de la brebis en Europe, 268. — Brebis de Flandre, 270. — Brebis purement domestiques, six espèces, 280 (note). — Ressemblances et différences entre les chèvres et les brebis, 277. — Toutes les brebis ne forment qu'une espèce, 283. *Voy. MOUTON.*

BRECHE-ANTIQUE. Espèce de marbre regardé comme un poudingue calcaire, VIII, 308. — Ses différentes espèces, XVI, 325.

BREME (le). Espèce 38 du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 387, et X, 91. — Espèce 57 du genre des poissons appelés *cyprins*, XIII, 91. — Sa description, 201. — Anecdotes sur ce poisson, 202. — Métis de la brème 204, 205.

BRENTE, *brentus*. Insecte du genre des recticornes. *Ex. Brentus anchorago*. *Hist. des Insectes*, III, 195. — Genre 181 d'insectes, XI, 78. — Celui *anchorago*, 79. — Celui *nasillard*, 80.

BRESILLET BATARD, *camocladia*. Genre 9 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 181. — Genre 16 des plantes dites légumineuses, 267. — Tois espèces, et leurs propriétés, 268.

BRETON (le). 55^e espèce du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 395; et X, III.

BREVES (les). Oiseaux différens des merles; leurs espèces au nombre de quatre, XLVI, 297. — La breve des Philippines, 299. — La breve de Ceylan, 301. — La breve de Bengale, 303. — La breve de Madagascar, 305. — La breve de Malaca, par Sonnerat, 307. — La breve de la côte de Malabar, par

le même, 309. — La breye de la Chine, par Sonnini, 311.

BRIN-BLANC (le). 3^e espèce des colibris, LIII, 264. — En quoi la femelle diffère du mâle, par Sonnini, 265. — 4^e espèce, le zitzil ou colibri piqueti. Le brinbleu, 5^e espèce de colibri, 268. — Erreurs de Seba à ce sujet, 269.

BRIQUETTES (les), Pelotes faites à Valenciennes, avec le charbon de terre et l'argile, IX, 163. (note).

BRIZES (les) ou amourettes Genre 63 des graminées. *Histoire des Plantes*, VII, 324. — Espèces de France, 325. — Espèces communes, 326.

BROCHET (le). Poids et mesure d'un brochet à différents âges. *Hist. des Poissons*, I, 179 (note). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *ésoces*. XII, 284, 288. — Sa voracité et sa longévité, *id* — Sa description, 290. — Deux espèces, 291. — L'organe de l'ouïe, 293. — Lieux où il se plaît, 294. — Anecdote sur un brochet, 295. — Comment il chasse, 296. — Comment on le pêche, 297. — Comment on le conserve, 290 — Comment on le multiplie, 300. — Ses variétés, 301. —

BROMELLOIDES (les). Xerophyta. Plantes; leur anatomie. *Hist. des Plantes*, II, 391.

BROMES, (les). Genre 59 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 296. — Espèces remarquables, 297. — Espèces de France, 298. — Espèces connues, 301.

BRONZE. Ce que c'est, XI, 242. *Voy. AIRAIN*.

BROSIMOMES (les) Genre 10 de la famille des orties; arbre de la Jamaïque. Sa description. *Hist. des Plantes*, X, 97. — Espèces connues, 98.

BROSME (le). Espèce de gade, poisson osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 386.

BROSSÆA. Genre 11 des plantes dites *bruyères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 241.

BROTÈRE (la) en corymbe. Genre 63 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 186. — Espèce connue, 187.

BROUILLE (la). Espèce de gramin. *Hist. des Poissons*, II, 305 (note), et 313, 316, 320.

BROUSSONETIA (le) à papier. Genre 12 de la fa-

mille des orties. Description de cet arbre. *Hist. des Plantes*, X, 105. — Manière dont on fait au Japon du papier avec son écorce, 106.

BROWALLIA. Genre 34 des plantes dites *personnées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 42. Deux espèces, 43.

BROWNEA. Genre 93 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, 384.

BRABRU (le). Espèce de pie-grièche, découverte par le Vaillant, XXXIX, 344. — Lieux où on le rencontre, 345.

BRUANT (le). Oiseau de France. Moyen d'appareiller avec lui les canaris, XLVII, 212. — Résultats de ce mélange, 214. — Synonymie du bruant, XLIX, 52. — Sa ponte et son nid, 55. — Manière de le prendre; son vol et son cri, 57. — Lieux qu'il fréquente; description du mâle et de la femelle, 58. Sa longueur totale, 60. — Ses variétés, 61. — Le zizi ou bruant de haie, 62. — Le bruant fou; pourquoi les Italiens lui ont donné ce nom, 67. — Lieux où il se trouve, 69. — En quoi il diffère des bruants ordinaires, 71. — Sa longueur totale, 72. — Le proyer, 73. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux bruants. Le guirnegat, 82. — La thérèse jaune, 85. — La flavéole, 87. — L'olive, 88. — Addition à cet article, par Sonnini. Histoire naturelle de cet oiseau, 90. — L'amazone, 93. — L'embarise à cinq couleurs, 94. — Le bruant mordoré, 96. — Le gonambouch, 98. — Le bruant familier de l'Asie, 100. — Le cul-rousset, 101. — L'azuroux, 103. — Le bonjour-commandeur, 105. — Le calfat, 108. — Addition à cet article, par Sonnini. Le bruant de maelby, 110. — Sa description, 111. — Le bruant de Bade, par le même, 112. — Le bruant écarlate, 114. — Le bruant à tête verte, 115. — Le bruant sanguin, 117. — Le bruant des pins, oiseau de Sibérie, 118. — Sa description, 119. — Le bruant rustique, qui se trouve dans les saussaies de la Daourie, 120. — L'auréole, 122. — Le petit bruant, 124. — Le bruant fardé, 126. — Le bruant à calotte noire, 128. — Le bruant à sourcils jaunes, 129. — Le bruant du Tyrol, 130. — Le bruant à ailes et queue rayées, 131. — Le bruant à tête, gorge

et poitrine bleues, ou le bruant mélangé, 133. — Le gaur, 135. — Le bruant d'Orient, ou bruant militaire, nom qui ne lui convient guère, 136. — Il n'habite pas près de Malte, 137. — Le bruant tisserand, oiseau d'Afrique; d'où lui vient son nom, 138. — Le bruant couleur de rouille, de l'Amérique septentrionale, 140. — L'outasseu, ou le bruant à gorge noire, 141. — Le cuschisch, 143. — Le bruant de Surinam, 145. — Le bruant noir, 146. — Le bruant multicolor, 147. — Le bruant à poitrine et ailes jaunes, 149. — Le bruant des îles Sandwich, 150. — Le bruant couronné de noir, 152. — Le bruant en deuil, 155. — La description de tous ces bruants, depuis celui de Maelby, p. 110, est de M. Sonnini.

BRUCEA. Genre 26 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 198.

BRUCHE, *bruchus*. Insecte particulier. Ex. *Bruchus robinæ*. *Histoire des Insectes*, III, 194. — Genre 180^e d'insectes, XI, 39. — Combien ils font de dégâts dans les grains, 40. — 14 espèces, 43.

BRUCHELES, *bruchelæ*. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 192; V, 248. — 28^e famille des insectes, genre 179, les anthribes, XI, 32. — Genre 180, les bruches, 39.

BRUIA. Espèce de pie-grièche de Madagascar, XXXIX, 382.

BRUNELLES (les). Genre 52 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 405. — 4 espèces de France, 406. — 4 espèces connues, 407.

BRUNET (le). Espèce de merle du Cap, XLVI, 136. — Sa description par le Vaillant, 137 (note). — Ses variétés, 138.

BRUNET (le). Espèce de pinson, XLVIII, 31.

BRUNIA. Genre 23 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 258.

BRUNNICH (le). 3^e espèce du genre des poissons appelés *persèques*. *Hist. des Poissons*, XI, 54 et 62.

BRUNNICHIE (la) à vrilles. Genre 5 de la famille des plantes dites oseilles. *Hist. des Plantes*, XI, 100. — Espèce connue, 101.

BRUNETTE (la). 3^e espèce de bécassine, I. VIII, 24.

BRUNOR (le). Espèce de pinson, XLVIII, 28. —

Variété du brunor, 29.

BRUNSFELSIA. Genre 18 des plantes dites solanées. *Hist. des Plantes*, XVI, 74.

BRUYÈRES (les), *ericæ*. 9^e ordre, famille 65 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 156.

— Genres voisins de la famille des bruyères, 163. —

Famille 65 des plantes, XVI, 227. § 1. Ovaires supérieurs. — Genre 1, *cyrilla*, 228. — Genre 2, *blasia*,

idem. — Genre 3, bruyère, 229. — 9 espèces, 230. —

Leurs propriétés, 232. — Genre 4, *andromède*, 233. —

Genre 5, *arbousier*, *idem*. Genre 6, *clethra*, 236. —

Genre 7, *pyrolle*, 237. — Genre 8, *epigæa*, 239. —

Genre 9, *epachris*, 240. — Genre 10, *gaultieria*, 241. —

Genre 11, *brossæa*, *idem*. — § 2. Ovaires inférieurs. ou

demi-inférieurs. — Genre 12, *argophillum*, 242. —

Genre 13, *mæsa*, 243. — Genre 14, *airelle* ou *mirtille*,

id. — § 3. Genres qui sont rapprochés des bruyères. —

Genre 15, *camarine*, 246. — Genre 16, *hudsonia*, 248.

BRYONE (la). Genre 3 des plantes appelés *courges*.

Hist. des Plantes, XIV, 250. — Espèces remarquables,

la bryone commune et celle blanche, 251. — Celle de

Cochinchine, 252. — 2 espèces de France, *idem*. —

21 espèces connues, 253.

BRY (le) Genre 6 des plantes mousses. *Hist. des*

Plantes, III, 152. — 30 espèces, 153. — Leurs usages,

158. — IV, 54.

BUBALE (le) ou **BUBALUS**. Espèce de buffle. Celui

des Grecs et des Latins n'est point le buffle ni le petit

bœuf de Bœon, mais l'animal que l'académie des sciences

a décrit sous le nom de vache de Barbarie. Preuves,

XXIX, 99. — Ses caractères, 100. — Sa description,

XXXI, 57, 59. — Autres particularités sur cet animal,

64. — Observation de M. Allamand, 66.

BUBON, ou **ACHE**. Genre 2 des plantes dites ombel-

lifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 280. — Trois espèces

et leurs propriétés, 281.

BUCARDES (les) Genre 148 des mollusques dits *acc*

phales. Hist. des Mollusques, VI, 375. — Leur animal, 377. — Trois espèces, 379.

BUCCIN (le). Genre 88 des mollusques gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 23. — Comment on distingue les vrais buccins d'avec les nasses et autres, 26. — Cinq espèces, 28.

BUCHNÈRES (les). Genre 8 des plantes dites rhinanthées. *Hist. des Plantes*, XV, 53. — 14 espèces connues, 54.

BUCHOSIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 123.

BUCIDA (le) cornu. Genre 9 de la famille des plantes dites chalefs. *Hist. des Plantes*, XI, 233. — Espèces connues, 234.

BUDLÈGES. Genre 3 des plantes dites *personées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 5.

BUFFLE (le). Sa synonymie, XXIX, 68. — Remarque de M. Caëtani sur ce mot, 72, 76. — Preuve de l'ancienneté de la connoissance du buffle, 80. — Ses différentes dénominations, 83 et suiv. — L'animal connu aujourd'hui sous le nom de buffle, étoit inconnu aux Grecs et aux Romains, 95. — Le buffle, maintenant domestique en Europe, est le même que le buffle sauvageon domestique aux Indes et en Afrique, 98. — Le bubalus des Grecs et des Latins n'est point le buffle ni le petit bœuf de Belon, etc. 99. — Ce petit bœuf n'est qu'une variété dans l'espèce du bœuf, 101. — Sa description, 102 (note). — Le bonasus d'Aristote est le même que le bison des Latins, 107. — Le bison d'Amérique pourroit bien venir originairement des bilisons d'Europe, 109. — Le bison ne diffère de l'auroche que par des variétés accidentelles, et ils sont tous deux par conséquent de la même espèce que le bœuf domestique, 113. — Différences entre le buffle et le bœuf, 159. — Ils n'appareillent pas ensemble, 160. — Note à ce sujet, 161. — Caractères du buffle, 162. — Sa chair est mauvaise, 164. — Sur la femelle et son lait, 165. — Les buffles d'Egypte, 166 (note). — Le buffle des provinces tempérées, 168. — Buffles sauvages de l'Afrique et des Indes, 170. — Buffle du Cap de Bonne-Espérance, 172 (note). — Autres particula-

rités sur cet animal, 173. — Habitudes du buffle d'Italie, 176. — Vue des buffles et leur grande mémoire, 178. — Leur fécondité, 181. — Manière de les dompter, 182. — Leur férocité, quand on les chasse, 183. — Durée de leur vie, 184. — Leurs maladies, dont une particulière appelée le *barbone*, 186. — Il seroit à désirer qu'on pût naturaliser le buffle en France, 193. — Addition à l'article du buffle, par Sonnini, 195. — Le buffle et le bœuf forment chacun une espèce particulière d'animal, 197. — Leurs différences, 198. — Leur couleur, 300. — Sur le buffle d'Afrique et ses cornes, 201. — Ses dimensions, 205. — Chasse des buffles par les Cafres, 206. — Cruauté des buffles sauvages, 207. — Cependant de jeunes enfans les conduisent, 209. — On vient aisément à bout de les apprivoiser, 210. — Remarque au sujet des buffles transportés à la Guiane, 211. — Le zebu, 215. — Le yak ou buffle à queue de cheval, 227. *Voyez YAK.*

BUFFONIA. Genre 9 des plantes caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 129.

BUFLEURE ou PERCE-FEUILLE. Genre 41 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 333. — 13 espèces, 334. — Leurs propriétés, 336.

BUFONITE. Ce que c'est. *Hist. des Poissons*, VI, 180. — 70^e espèce du genre des poissons appelés *spares*, IX, 402. — X, 120.

BUGGENHAGEN (le). 47^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 88. — Sa description, 183.

BUGLES (les). Genre 10 des plantes dites *labiées*. *Hist. des Plantes*, XV, 285. — 6 espèces de France, 286. — 10 espèces connues, 288.

BUGLOSSE DORÉE (la). Genre 18 des plantes dites *bourraches*. *Hist. des Plantes*, XVI, 95. — Ses vertus, 96. — La buglosse *Anchusa*, 22^e genre des mêmes plantes, 100. — 6 espèces, 101. — Leurs usages, 102.

BUIS (les). Genre 12 des plantes dites *euphorbes*. *Hist. des Plantes*, IX, 367. — Espèce remarquable, le buis ordinaire, 369. — Espèce de France, 371.

BUISSON ardent du Malabar. *Sinora*. *Hist. des Plantes*, XIV, 55.

BULATMAI,

BULATMAI (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 77. — Sa description, 126.

BULBES (les) ou oignons proprement dits. Leur situation. *Hist. des Plantes*, II, 120.

BULBOCODE (le) printannier ou campanelle. Genre 1 de la famille des mérendères. *Hist. des Plantes*, VIII, 214. — Espèce de France et espèce connue, 215. — Le mérendère bulbocode, 221. — Sa reproduction, 223. — Espèce de France et espèce connue, 224.

BULIMES (les). Genre 59 des mollusques dits *gastéropodes*. *Voy. leur histoire*, V, 333. — *Descript.*, 335. — 5 espèces, 336. — La plus singulière est celle dite *decollé*; sa description, 338.

BULLÈS (les). Désignation d'un genre nouveau d'animaux, coquilles intérieures. Genre 31 des mollusques. *Hist. des Mollusques*, V, 189. — Leur description, 190. — Leur coquille, 193. — 2 espèces, 194.

BULLES (les). Genre 56 des mollusques dits *gastéropodes*. *Voy. leur histoire*, V, 323. — Leur description, 324. — 7 espèces, 325.

BUMALDA. Genre 24 des plantes dites *nerpruns*. *Hist. des Plantes*, XVII, 228.

BUNIAS. Genre 27 des plantes crucifères. 3 espèces. *Hist. des Plantes*, 74. — Propriétés, 75.

BUNIVA (la). 4^e espèce de poisson, du genre des balistes. *Hist. des Poissons*, XIII, 277. — Sa description, 278.

BUNIAM. Voyez **TERRENOIX**.

BUPHTALMÈS (les). Genre 157 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 148. — 5 espèces de France, 150. — 2 espèces connues, 151.

BUPRESTES (les). Insectes. — Ruses qu'ils emploient pour se soustraire au danger. *Hist. des Insectes*, I, 276. — Insectes du genre des sternoxes, III, 101. — Genre 35 d'insectes, et 3^e espèce de la famille 5^e appelée *sternoxes*. IX, 42. — Caractères qui servent à les distinguer des autres insectes de la même famille, 43. — Leurs espèces au nombre de plus de deux cents, 45. — Description de ces espèces, au nombre de soixante-huit, 46.

Tab. Tome I.

K

BURDI (le). 3^e espèce du genre des poissons appelés *pomacentres*. *Hist. des Poissons*, XI, 176, 182.

BURGAU. Nom donné à une espèce de coquille qu'on appelle aussi *veuve*. *Hist. des Mollusques*, IV, 127, 128 (note), 129.

BURGRANDE. *Voy. ARRÊTE-BŒUF*.

BURMANNIA (les). Genre 4 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 83. — Espèces connues, 84.

BUROS (les). Genre 202 des poissons; celui brun. *Hist. des Poissons*, XII, 425, 426.

BURSER. *Voyez GOMART*.

BUSARD (le) de marais, oiseau de proie, XXXVIII, 267. — Ses habitudes et sa description, 268. — Description de nouvelles espèces, 271. — Comment on le distingue du milan noir et de la buse, 269, 270. — Le busard de Java, par Virey, 323. — La buserau ou le busard roux de Cayenne, par le même, 324.

BUSC. Nom sous lequel le navigateur *Dampier* désigne l'hirondelle de mer appelée le *gachet*, LX, 108.

BUSES (les). Oiseaux de proie, XXXVIII, 227. — Leur description, 243. — Lieux qu'elles habitent, 244. — Manière dont elles saisissent leur proie, 245. — Leurs variétés, décrites par Virey, 246. — La buse cendrée, oiseau des terres de la baie d'Hudson, 290. — Sa description, 291. — La buse busardet, 295. — La buse boréale, 297. — La buse de la Jamaïque, 299. — La buse rayée, 301. — La petite buse criarde, 303. — La buse jakal ou rounoir, 305. — Sa description et ses habitudes, 306. — La buse gantée, 309. — La buse tacharde, 311. — Buse devenue très-familière après avoir été apprivoisée, LXIII, 31 (note).

BUSON (le), par Virey. Espèce de milan, XXXVIII, 326.

BUSSENBUDDOO (le). Oiseau de l'espèce des barbus, décrit par Sonnini, LVI, 33.

BUTOMES (les), *junci*, *butomus umbellatus*. Ce qu'on observe dans les tubes de ce végétal. *Histoire des Plantes*, I, 68. — Sa hampe, II, 389. — Ses feuilles, 390. — 2^e ordre, famille 18 des plantes monocotylédones proprement dites; leur description et leurs différentes

GÉNÉRALE.

147

espèces. IV, 142. — Les butomes ou joncoïdes, VIII, 194. — Genre 1, le jonc fleuri ou butome en ombelle, 195. — Espèce de France et espèce connue, 196. — Genre 2, le fluteau ou la damasone étoilée, 197. — Genre 3, les alismes ou plantains d'eau, 198. — Genre 4, les sagittaires ou flechières, 202. — Genre 5, la brassenie de schreber, 205. — Genres 6, la cabombe aquatique, 206. — Genre 7, la scheuchzerie des marais ou le petit jonc fleuri, 207. — Genre 8, les triglochins ou troscarts, 209. — Aspect général de la famille des butomes.

BUTOR (le). Espèce de héron, avec plusieurs différences, LVII, 272. — Description des butors et leurs habitudes, 274. — Origine du nom *asterias* ou *stellaris* qu'on lui a donné, 279. — Observations anatomiques sur le butor, par de Muralto, 279 (note) — Lieux qu'il habite, 282. — Renseignemens sur ses habitudes naturelles, donnés par M. Baillon; son courage, 284. — Son accouplement, 285. — Oiseaux de l'ancien continent qui ont rapport au butor. Le grand butor, 1^{re} espèce, 287. — Le petit butor, 2^e espèce, 290. — Le butor brun rayé, 3^e espèce, 292. — Le butor roux, 4^e espèce, 293. — Le petit butor du Sénégal, 5^e espèce, 295. — Le pouacre ou butor tacheté, 6^e espèce, 296. — Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport au butor; l'étoilé, 1^{re} espèce, 298. — Le butor jaune du Brésil, 2^e espèce, 300. — Le petit butor de Cayenne, 3^e espèce, 302. — Le butor sacré, par Virey; pourquoi il est ainsi nommé, 303. — Sa description, 304. — Le butor de la baie d'Hudson, 4^e espèce, 305. — L'onoré, 5^e espèce, 307. — L'onoré rayé, 6^e espèce, 309. — L'onoré des bois, 7^e espèce, 312. — Le bihoreau, 314. — Celui de Cayenne, 521. — Celui d'Esclavonie, par Virey, 322.

BUTSKOFF (le). Genre 10 des cétacées appelés *hyperoodons*; sa description et sa synonymie. *Hist. des Cétacées*, 42, 438. — Particularité de ses dents, 439. — Combat en 1788, auprès de Honfleur, avec une femelle mère, 443.

BUTYRINS (les). Genre 156 des poissons; celui banané. *Hist. des Poissons*, XI, 402. — Sa description, 403.

K 2

BUYS. C'est ainsi que les Hollandais appellent les grands filets dont ils se servent pour la pêche du hareng. *Hist. des Poissons*, XIII, 24.

BYRRHE, *byrrhus*. Insecte du genre des nécrophages; ex. *Byrrhus pilula*. *Hist. des Insectes*, III, 117. — Genre 61 d'insectes, 2^e espèce de la famille des nécrophages, IX, 202. — Leur description, 203. — Leurs espèces, 205.

BYSSE ou **MOISSISSURE**. Genre 1 des plantes dites algues. *Hist. des Plantes*, III, 75. — 13 espèces, 76.

BYSSOLITE. Espèce de pierre, XVI, 302.

BYTHURE, *bythurus*. Insecte du genre des nitidules; ex. *Nitidula pedicularia*. *Hist. des Insectes*, III, 134. — Genre 92 d'insectes, 5^e espèce de la famille 12, les nitidulaires, X, 41.

BYTNÉRIE. Genre 43 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 212.

C.

CAAPEBA. Plante du genre des ménispermes. *Hist. des Plantes*, XVIII, 313.

CABARET (le). Espèce de linotte; sa description, XLVII, 305.

CABIAI (le). Le plus gros animal de l'Amérique méridionale, après le tapir, XXV, 45. — Sa synonymie, XXXI, 239. — Sa différence d'avec le cochon, 240. — Ses habitudes, 241. — Lieux où il est fort commun, 242. — Sa chair est mauvaise, 243. — Description de ses parties intérieures, 244.

CABINETS d'histoire naturelle. Dégâts qu'y font les insectes. *Hist. des Insectes*, I, 168.

CABIOU (le). Sorte d'assaisonnement dont le suc de manioc forme la base. Manière de le préparer. *Hist. des Plantes*, IX, 397.

CABOMBE (la) aquatique. Genre 6 de la famille des butomes, *Hist. des Plantes*, VIII, 206. — Espèce connue, 207.

CABRILLET, *ehretia*. Genre 3 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 79. — Quatre espèces, *idem*.

CACALIES (les). Genre 71 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 197. — La cacalie anthéphorbé, 198. — La cacalie rampante et celle odorante, 199. — La cacalie à feuilles de laiton, quatre espèces de France, 200. — 43 espèces connues, 201.

CACAO, *theobroma*. Genre 29 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 208.

CACASTOL (le). Oiseau qu'on peut rapporter à l'étourneau, XLV, 75.

CACHALOT (le). Questions et réponses sur 360 onces d'ambre gris retiré du ventre d'un cachalot femelle, sur les côtes de Guinée, IX, 263. — 2^e ordre, genre 5 des cétacées: *Histoire des Cétacées*, 35. — Sous-genre 1, une ou plusieurs éminences sur le dos. Espèce 1, le cachalot macrocéphale; espèce 2, le cachalot trunpo; espèce 3, le cachalot svineval. — Sous-genre 2, point d'éminence sur le dos; espèce 4, le cachalot blanchâtre, 36. — Description et synonymie du cachalot macrocéphale, 254. — Ses mâchoires, 257. — Ses dents, 258. — Son œil, 260. — Ses évents, 261. — Description de ses autres parties, 263. — Sur le blanc de baleine contenu dans son intérieur, 267. — Canal qui le distribue, 270. — Ce qu'a dit M. Fourcroy de ce blanc de baleine. 272. — Il n'est pas particulier au cachalot; il est très-abondant dans la nature, 277. — Dénomination d'*adipocire* que lui donne M. Fourcroy, 279. — Vertus qu'on lui attribue, 280. — De la seconde substance que produit le cachalot, l'ambre gris, 282. *Voyez ce mot.* — Attributs et habitudes du cachalot macrocéphale; vitesse du nager, 299. — Outre la Méditerranée, il fréquente toutes les mers, 300. — En 1784, trente-deux de ces cétacées échouent sur la côte occidentale d'Audierne, sur la grève nommée Très-Couaren, 302, 307. — Nourriture des cachalots, 303. — Effroi qu'ils causent aux requins et aux pêcheurs irlandais, 304. — Leur accouplement, 306. — Nombre des petits auxquels la femelle donne le jour, 307. — Ses soins et sa

tendresse pour ses petits, 308. — Pêche des cachalots, 309. — Ils ont la vie dure, 310. — Usages que l'on tire de leurs différentes parties, 311. — Le cachalot trumpo, 312. *Voy.* ce mot. — Le cachalot svineval, 317. *Voy.* ce mot. — Espèce 4, le cachalot blanchâtre. Sa synonymie et sa description, 319.

CACHICAME (le), ou le tatou à neuf bandes, XXVII, 295. — Sa description par Daubenton, 299. — Expédient pour le tirer de sa tanière, 319 (note).

CACHIRI (le). Liqueur qu'on prépare avec la racine de manioc. *Hist. des Plantes*, IX, 396.

CACHYRS. *Voy.* ARMARINTHE.

CACOLIN (le). Espèce de caille, XLIII, 120.

CACOUCIA. Genre 12 des plantes dites *épilobes*. *Hist. des Plantes*, XVII, 47.

CACTIERS (les) *cacti*, 11^e ordre, famille 72 de la 4^e classe des plantes dites dycotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 207, XVII, 5 — § 1. Pétales et étamines en nombres déterminés. Genre 1, le groseiller, ribes, *idem*. — § 2, Pétales et étamines en nombres indéterminés. Genre 2, 10.

CADABA. Genre 2 des plantes capriers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 82.

CADAVRE. Essaim d'insectes sortis d'un cadavre, XVIII, 42, 53, 63.

CADELARIS (les). Genre 6 de la famille des amarantes. *Hist. des Plantes*, XI, 261. — Le cadellaris étalé, et 15 espèces connues, 262.

CADELLE. Chenille qui détruit le blé dans les greniers. *Hist. des Insectes*, I, 380.

CADIX. Nature des rochers de cette ville, VIII, 245.

CADMIE DES FOURNEAUX. Nom que l'on donne à la fumée résultante de la brûlure du zinc, XII, 143.

CADRAN (le). Espèce de merle du Bengale, XLVI, 256.

CADRAN (le). Genre 55 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 318. — Huit espèces, 319.

CÆNOMYX (les) Genre 1 d'insectes de la famille des taoniens. *Hist. des Insectes*, XIV, 322, 326.

CÆSALPINA. Voy. BRESILLET.

CÆSIO (les). Genre 65 des poissons osseux; leurs caractères distinctifs; 2 espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 31. — 1^{re} espèce, le cæσιο azuror, 32. — 2^e espèce, le cæσιο poulain, 36.

CÆSIOMORES (les). Genre 66 des poissons osseux; leurs caractères distinctifs, 2 espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 39. — 1^{re} espèce, le cæσιοmore baillon, 40; sa description, 41. — 2^e espèce, le cæσιοmore bloch; sa description, 42.

CÆFÈS (les) ou Cafier, *coffea*. Ses grains sont un poison pour les poules, XLI, 155 (note). — Genre 95 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 71. — Espèces remarquables, le café d'Arabie ou cafier, 72. — Son histoire, 73. — Celui d'Amérique, 77. — Usages du café, 78. — Son usage à Constantinople, et ce qui en est résulté, 81. — 19 espèces connues, 83.

CÆFRE (le). Espèce d'oiseau de proie décrit par Sonnini, XXXVII, 363. — Particularités sur cet oiseau, 364. — Sa description, *idem*.

CÆFRES (les). Espèce de nègres, dont cependant ils diffèrent beaucoup, XX, 254, 310.

CAGE (le). Oie des îles de l'Archipel de Chiloe, par Sonnini, LXI, 245.

CAICA (le). 2^e espèce de perroquet, LXIV, 31. — Sa description, 32.

CAIEPUT. Huile qui se tire du fruit de la plante appelée durio, genre 7 des plantes capriers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 88.

CAILLE (la). Combat des cailles entre elles, XLI, 119. — Leurs rapports avec la perdrix, suivant Theophraste, XLIII, 59. — Description de la caille et son pays, 61. — Ses amours, 62. — Son inclination pour les voyages, et ses causes, 64. — La principale est pour trouver sa nourriture, 66. — Les cailles ont un tems pour arriver et un tems pour repartir, 68. — Détails sur leurs émigrations, 69, (note). Tems de leur passage sur les côtes d'Égypte, 71, (note), par

Sonnini. Comment on conçoit qu'elles traversent de grandes étendues de mer, 78. — Leur accouplement et leur ponte, 85. — Education des cailletaues, 85, 87. — Mue des cailles, 86. — Différences de la femelle avec le mâle, 87. — Leurs cris, 88. — Elles ne procréent qu'en liberté, *idem*. — Absurdités débitées sur la génération des cailles, 89. — Leur nourriture, 90. — Elles boivent très-peu, 91. — Durée de leur vie, et leurs combats en public, 92. — Anecdotes historiques à ce sujet, 93. — Lieux qu'elles habitent; on les trouve presque par-tout, 94. — Propriétés de leurs œufs et de leur graisse, 97. — Le chrokiel ou grande caille de Pologne, 99. — La caille blanche, 101. — La caille des îles Malouines, 102. — La fraise ou caille de la Chine, 104. — Le turnix ou caille de Madagascar, 107. — Le réveil-matin ou la caille de Java, 109. — Oiseaux étrangers qui paroissent avoir du rapport avec les cailles, 113. — La caille de Cayenne, par Virey, 133. — Ses habitudes, 134. — Sa description, 135. — La grande caille de Madagascar, par Virey, 137. — La caille brune de Madagascar, par le même, 139. — La caille de la côte de Coromandel, par le même, 140. — La petite caille de Manille, par le même, 142. — La caille à trois doigts, de l'île de Luçon, par le même, 144. — La caille de la Nouvelle-Guinée, par le même, 146. — La caille de Virginie, par le même, 147. — Autre espèce décrite par Latham, 148. — Le kakelik ou la caille de Perse, par Virey, 150. — La caille de Gibraltar, deux espèces, par le même, 152. — Les cailles sont les seuls oiseaux qui, dans les climats chauds de l'Amérique, se tiennent à terre; pourquoi cela, L, 20.

CAILLEBOTTE. *Hist. des Plantes*, XIV, 157.

CAILLAITS. *Voy. GAILLETS*.

CAILHETTE (la). C'est ainsi qu'on appelle le quatrième estomac du bœuf où se fait la décomposition entière du foin, XXIII, 34, 57.

CALLITRICHE. *Voy. MORGELINE-D'EAU*.

CAILLOUX. Examen de leur nature, I, 371; et III, 50. — Pierres prises par M. de Réaumur, pour des cailloux; ne sont que des pierres calcaires, VIII, 347.

— Liqueur des cailloux ; ce que dit M. Morveau à ce sujet, X, 6. — Du caillou et de ses espèces, XIII, 131. — Sa forme et sa formation, 133. — Ses variétés, 140. — Espèce particulière, 141. — Lieux où il se trouve, 145. — Ce qu'on entend par herborisations et dendrites dans les cailloux, 147. — Leur origine, 148. — Le caillou, près d'Argenteuil, 153. — Poudingues ou cailloux d'Angleterre, 155. — *Voyez* ce mot. — Les cailloux de mer, 158. — Effets de l'air sur les cailloux, 387. (note.)

CAÏMAN. *Voy.* CROCODILE.

CAIMITIER. Genre 7 des plantes dites *sapotiliers*. *Hist. des Plantes*, XVI, 202.

CALAMAGROSTIS (les). Genre 26 des graminées ; espèces de France. *Hist. des Plantes*, VII, 188. — Espèces connues, 189.

CALAMINE (la). Composition de ce minéral ; sa comparaison avec la blende, XII, 130. — Comment on tire le zinc de la calamine, 134. — Minière de pierre calaminaire, 136. — Lieux où elle se trouve en abondance, 137. — Ce qu'elle est ; la calamine d'Angleterre, 138.

CALAMUS. Plante monocotylédone ; ses coupes, *Hist. des Plantes*, I, 374. — Sa description, II, 385.

CALANDRE (la) ou grosse alouette, L, 333 ; sa description, 335. — Moyen d'avoir des calandres qui chantent bien, 336. — Différence du mâle et de la femelle, 337. — Lieux où on les rencontre, 338. — Leur longueur totale, 339. — Oiseaux étrangers qui y ont rapport : 1^o. la cravate jaune ou calandre du cap de Bonne-Espérance, 340. — Le hausse col noir ou l'alouette de Virginie, 343. — Sa description, 345. — L'alouette aux joues brunes de Pensilvanie, 347. — Sa description, 348. — La calandre de Sibérie, par Sonnini, 350. — La calandre de Mongolie, par le même, 352. — Le kogourou, par le même, 354.

CALAÏS (les), ou les oiseaux rhinocéros de l'Afrique et des grandes Indes, LVI, 85. — Leur bec, et ses différences, 87, 91. — Pourquoi on les a appelés

rhinocéros, 88. — Quelles sont les dix espèces qui les distinguent, 90. — Structure de leurs pieds, par Sonnini, 92. — Le tock, 1^{re} espèce, 94. — Ce que Buffon a dit des calaos, et en particulier du tock, dans une lettre à Bexon, 98. — Le calao de Manille, 2^e espèce, 100. — Le calao de l'île Panay, 3^e espèce, 102. — Sa description, par Sonnerat, 103. — Le calao des Moluques, 4^e espèce, 106. — Sa description, 108. — Sa nourriture, 109. — Le calao de Malabar, 5^e espèce, 110. — Sa description, 111. — Ses habitudes, 116. — Le brac ou calao d'Afrique, 6^e espèce, 119. — Celui d'Abyssinie, 7^e espèce, 121. — Le calao des Philippines, 8^e espèce, 123. — Description du calao ou cagao des Indiens, 125. — Le calao à casque rond, 9^e espèce, 128. — Le calao rhinocéros, 10^e espèce, 130. — Rapports de Bontius sur les habitudes de ces oiseaux, 132. — Structure et figure de leur bec; remarques de Vaillant sur le calao, 134. — Le calao à casque concave, par Sonnini, 136. — On en doit la connoissance à le Vaillant, 137. — Le calao à casque en croissant, 140. — Le calao à bec blanc, 142. — Le 2^e calao du Malabar, 145. — Sa description par Sonnerat, 146. — Le calao de Gingi, par Sonnerat, 148. — Remarques de le Vaillant sur cet oiseau, 149. — Le calao blanc, 151. — Le calao de Ceram, décrit par Dampier, 153. — Le calao de la nouvelle Hollande, 156. — Le calao gris, 157. — Le calao verd, 158. — Le calao de Waygiou, 159. (Tous ces calaos, depuis celui de la page 136, sont ajoutés par Sonnini).

CALAPPE, *calappa*. Insecte de l'espèce des littoraux; ex. *calappa granulata*. *Hist. des Insectes*, III, 23. — Genre des insectes kleistagnathes. V, 154. — Sa description, 389. — Espèces européennes, calappe granuleux, 392. — Calappe marbré, *idem*. — Espèces exotiques, calappe tuberculé, calappe creté, 393. — Calappe lophos, 394. — Calappe vouté, *idem*.

CALATTI (le) de Seba. Espèce d'oiseau rangé par Brisson dans la classe des tangaras, XLVIII, 365.

CALCAIRES (substances). 2^e classe de celles qui ori-

ginairement formoient le globe terrestre, III, 358. — Temps qu'il a fallu aux eaux pour former les bases des pierres calcaires, et circonstances qui y ont concouru, 342. — Tout est vitrescible dans la nature, à l'exception de ce qui est calcaire, 266. — On peut cependant fondre par le feu les matières calcaires, 270. — Expériences avec le feu sur les pierres calcaires, 277. — Sur le progrès de la chaleur qui se développe dans les matières calcaires, V, 165. — Leurs détrimens et leurs agrégats, XIV, 256. — Concrétions calcaires, 258. — Leur mélange avec les matières vitreuses, 259. — Formation des couches calcaires secondaires, XVI, 103. — De celles tertiaires, 104. — Du calcaire primitif secondaire, 221. — De la formation des couches de phosphate calcaire, 106. — Formation des substances calcaires. *Hist. des Mollusques*, I, 58. — Matière dont sont formées les montagnes calcaires, 63 (note). — Les animaux créent la matière calcaire, III, 238. — Comment et de quelle manière les mollusques testacés la créent, 239. *Voyez PIERRES CALCAIRES.*

CALCÉDOINE (la). Espèce d'agate, XIII, 101. — Les petites sont par milliers dans des mines de fer en grains, 102. — Les mélangées de pâte d'agate commune sont plus communes que les pures, 103. — Variétés de la calcédoine, XVI, 248.

CALCÉOLAIRE. Genre 20 des plantes dites *personnées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 33.

CALCÉOLES (les). Genre 110 des mollusques dits *acéphales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 185. — Celle sandale, 186.

CALCILITES. Espèces de pierres qui ne contiennent que de la chaux ou terre calcaire, combinée avec un acide quelconque, dont huit genres, XVI, 215. — De celles composées, 258.

CALCINATION. Prise généralement, elle est pour les corps fixes et incombustibles, ce qu'est la combustion pour les matières volatiles et inflammables, IV, 279. — Effets de la calcination, comparés entr'eux et avec ceux de la combustion, 280. — Comment on pourroit calciner l'or, 292. (note.)

CALCUL mathématique ; sa comparaison avec l'expérience, XXI, 149.

CALEBASSE (la) ou courge à fleurs blanches. *Hist. des Plantes*, XIV, 279.

CALEBASSIER, *crescentia*. Genre 19 des plantes dites *solanées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 74. — Deux espèces et leurs propriétés, 75.

CALEDONIENS (les). Peuples de la nouvelle Calédonie, qui, pendant la disette des vivres, avalent une assez grande quantité d'une stéatite verdâtre, tendre et friable. *Hist. des Reptiles*, II, 356.

CALÉES (les). Genre 145 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 99. — Huit espèces connues, 100.

CALEN (le). Espèce de filet dont on se sert pour la pêche dans les rivières. *Hist. des Poissons*, XIII, 355.

CALENDRE (la larve de la) du blé. Ce que c'est. *Hist. des Insectes*, XI, 54, 100. *Voy. BLÉ*. — 186^e genre d'insectes et charançons, 97. — Leur description, 98. — Celle de la calendre du palmier, 99. — Celle raccourcie et celle du blé, 100.

CALENDRIER de Flore, nécessaire à dresser dans chaque pays, avec des observations comparatives sur la germination et la feuillaison. *Hist. des Plantes*, I, 233.

CALENDULA. *Voy. les SOUCIS*. *Hist. des Plantes*, XIII, 10.

CALÉOGAPHE (le) graveur ou scolite, espèce d'insecte. *Voy. SCOLITAIRE*.

CALFAT (le). Oiseau de l'île de France, de l'espèce du bruant, XLIX, 108.

CALI-CALIC (le). Espèce de pie-grièche de Madagascar, XXXIX, 382.

CALICE (le). Ce que c'est dans les plantes. *Hist. des Plantes*, I, 43. — Son organisation dans la fleur, II, 15. — Comment de Jussieu définit le calice monophylle, 156. — Forme générale du calice, 157. — Irrégularité, attache, *coloration* et durée du calice, 159.

CALIGE, *caligus*. Insecte du genre des pneumonu-

res. *Hist. des Insectes*, III, 15. — Leur définition par Cuvier, IV, 62. — Leur description, 104. — Description de la seconde partie de leur corps, appelée par Muller *abdomen*, 106. — Leurs habitudes, 107. — Leurs espèces, 108. — Calige des poissons, 111. — Ses habitudes, 113. — Confusion dans les espèces, 114. — Le calige prolongé, 115. — Description de son têt, 116. — Sa queue, 118.

CALIMANDE. espèce 27 du genre des poissons appelés *pleuronectes*. *Hist. des Poissons*, XI, 281, 346.

CALIXÈNES (les). 7^e genre des plantes nommées *asperges*. *Hist. des Plantes*, VIII, 113. — Ce qu'en a dit Jussieu, 114.

CALLADIONS (les). 4^e genre des plantes dites *aroides*. *Hist. des Plantes*, VII, 424. — Espèces remarquables, 425. — Espèces connues, 428.

CALLARIAS (le). 6^e espèce des gades, poissons osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 328. — Sa description, 333.

CALLES ou CHOU CALLES (les). Genre 5 des plantes dites *aroides*. *Hist. des Plantes*, VII, 429; espèces remarquables, 430; espèces de France, 433.

CALLICARPES (les). Genre 6 des plantes dites *gati-liers*. *Hist. des Plantes*, XV, 208. — 13 espèces connues, 209.

CALLIGÈRES (les). 84^e genre d'insectes, 11^e espèce de la famille, 11. Les staphylins. *Hist. des Insectes*, IX, 375.

CALLICHTE (le). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *cataphractes*. *Hist. des Poissons*, XII, 81, 83.

CALLICOCCA. *Hist. des Plantes*, XIV, 111.

CALLIDIE, *callidium*. Insecte du genre des cérambicins proprement dits. *Hist. des Insectes*, III, 217. — 217^e genre d'insectes, XI, 286. — 43 espèces. 287 à 301.

CALLIGONES (les). 9^e genre de la famille des plantes dites *oseilles*. *Hist. des Plantes*, XI, 121. — 3 espèces connues, *idem*.

CALLIOMORES (les). 43^e espèce des poissons osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 233. — Le calliomore indien ;

en quoi il diffère des vrais calliomores, autre espèce de poissons osseux, 234.

CALLIONYMES (les). 42^e genre des poissons osseux. 1^{er} sous-genre, les yeux très-rapprochés l'un de l'autre. *Hist. des Poissons*, VI, 212. — Le callionymelyre, 1^{re} espèce, 213. — Le callionyme dragonneau, 2^e espèce, 223. — Le callionyme flèche et le Japonais, 3^e et 4^e espèces, 226. — Description de celle-ci, 228. — Le callionyme pointillé, 230. — Ses couleurs et ses dimensions, 231.

CALLISIE (la) rampante. 3^e Genre de la famille des plantes commelines. *Hist. des Plantes*, VIII, 181. — Espèces connues, 183.

CALLITRICHÉ (le). Espèce de singe ou de guenon à longue queue, XXXVI, 52. — Sa description, 53, 56. — Ce qu'en dit M. Adanson, 54. — Ses caractères distinctifs, 55.

CALLOSITÉS. Sur celles des genoux des chevaux et autres animaux, XXII, 333.

CALLOU. Espèce de liqueur blanche que l'on tire du cocotier dans les Indes orientales, LXI, 233.

CALMAR. espèce de sèche. Expériences sur la laite de ce poisson, XVII, 319, 322. — Animaux spermatiques du calmar, 384.

CALMAR (le). Espèce de couleuvre d'Amérique. *Hist. des Reptiles*, VII, 180.

CALMARS (les). Genre 2 des mollusques coriacés. Celui commun; sa synonymie. *Hist. des Moll.* II, 5. — Ses caractères génériques, 9. — Description du calmar commun, 10. — Son fourreau ou manteau, 12. — Sa lame dorsale et durée de sa vie, 13. — C'est un mollusque pélagien, c'est-à-dire, qui préfère la haute-mer à toute autre habitation, et qui a la vie plus dure que les sèches, 14. — Les anciens, comme les modernes, ont écrit que les calmars voloient, 15. — Proverbe des gens de mer qui pourroit appartenir aux poulpes, 16. — Ses œufs rangés en masse, 17. — Ils s'élèvent quelquefois à plus de quatre-vingt mille, 19. — Leur développement après la ponte, 20. — Ils ne durcissent pas dans l'eau bouillante, 22. — Expansion qu'ils ac-

quièrent successivement en peu de jours, 23. — Origine du mot calmar, 38. — Cas que faisoient les anciens des calmars, 39. — Bec du calmar considéré comme pétrification, 45. — Les becs de sèche appartiennent à une espèce d'échinite ou d'oursin. Preuve, 48. — Le calmar flèche; sa description, 56. — Ses ailes, *idem*. — Il vit dans l'Océan, 58. — Le calmar du Bresil, 61. — Le calmar harpon, 65. — Le calmar javelot, 70. — Le calmar dard, 74. — Sa description, 75. — Lieux où il se trouve, 78. — Le calmar contourné, 82. — Le calmar pélagien, 86. — Sa description, 87. — Le calmar tronçonné, 90. — Sa description, 91. — Le calmar réticulé, 96. — Sa description, 98. — Ambrosinus l'a décrit dans le complément d'Aldrovande, 99. — Le calmar sépiole, 103. — Erreur de Rondelet sur ce calmar, 104. — Sa description, 105. — Il fait la nuance entre les calmars et les poulpes, 108.

CALMOUCKS (les). Peuples tartares, XX, 115. — Comparaison des descriptions que les voyageurs ont faites de chacun des différens peuples qui composent cette race, 117.

CALOBATES (les). 540^e genre d'insectes de la famille des muscides. *Hist. des Insectes*, XIV, 387.

CALOMERIE (la). Amaranthoides. Genre 142 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 94. — Espèces connues, 95.

CALOPE, *calopus*. Insecte du genre des macrogastres. *Ex. calopus serraticornis*. *Hist. des Insectes*, III, 181. — Genre 163 des insectes, 2^e espèce de la 23^e famille; les macrogastres. *Hist. des Insectes*, X, 362.

CALOPHYLLUM. Genre 14 des plantes dites guttiers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 278.

CALOPS. 119^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 155; 295.

CALOSOME, *calosoma*. Insecte du genre des métalliques. *Ex. calosoma inquisitor*. *Hist. des Insectes*, III, 91. — Genre 24 des insectes dits coléoptères, VIII, 294. — D'où leur vient ce nom, et notice de Réaumur sur leurs larves, 295. — 1^{re} espèce, le calosome callide; — 2^o Celui appelé rétus, 298; — 3^o celui de Madère;

— 4^o celui inquisiteur, 299 ; 5^o — celui scrutateur. — 6^o celui réticulé, 300 ; — 7^o celui sycophante ; — 8^o celui chercheur, 301 ; — 9^o celui soyeux, 302.

CALQUIN (le). Espèce d'aigle du Chili, décrit par Molina, XXXVIII, 52.

CALTHA. Voy. POPULAGO.

CALYCERB (la) herbacée. Genre 61 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 184.

CALYBÉ (le). Oiseau de la Nouvelle-Guinée, XLV, 13. — Sur la baguette qui sort par son bec, 15.

CALYCANTHUS. Genre 49 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 164. — Deux espèces et propriétés, 165.

CALYPTRÈS (les). Genre 39 des mollusques dites gastéropodes. *Histoire des Mollusques*, V, 241. — 2 espèces très-distinctes, 242. — Quatre espèces, 243.

CAMAIL (le) ou la cravatte. 7^e espèce des oiseaux appelés tangaras, XLVIII, 284.

CAMARAS (les). Genre 17 des plantes dites gatiliers. *Hist. des Poissons*, XV, 226. — 17 espèces connues, 228.

CAMARINE. Genre 15 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 246. — Deux espèces, et leurs propriétés, 247.

CAMBIVM (le), ou la substance organisatrice des plantes, selon Duhamel, *Hist. des Plantes*, I, 165.

CAMBOGIA. Voyez GUTTIER.

CAMELÉE. Genre 7 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 180.

CAMELÉON (le). Sa face. *Hist. des Reptiles*, I, 33. — Teintes variables qu'il prend, 72. Comment Hasselquitz et d'Obsonville les expliquent, 73. — La langue du caméléon 103. (note), — Ses organes digestifs, 109. — Ses poumons, 174. — Genre 13 des reptiles sauriens, IV, 179. — Les animaux renfermés dans ce genre sont très-remarquables par leur conformation extraordinaire et par leurs habitudes, 180. — Le caméléon ordinaire ou d'Egypte, 181. — Sa description, 185. — Remarque sur sa peau, 187. — Suite de sa description, 188. — Sa manière de manger, 190, 191 (notes). —

Ses

Ses pieds et sa marche, 191. — Sa douceur 193. — La faculté qu'il a de changer souvent la couleur de sa peau, 194. — Remarques, à ce sujet, de plusieurs auteurs, 195. — Ses habitudes, 196. — Sa nourriture et sa ponte, 197. — Lieux qu'habite le caméléon ordinaire, 199. — Sa queue, 200. — Ce qu'en a dit Séba, *idem*. — Première variété: caméléon noirâtre de la Barbarie, 201. — Seconde variété; celui d'Egypte, 202. — Le caméléon à ventre dentelé en scie, du Sénégal, 203. — Il est en vénération dans toute la Guinée, 205. — On ne trouve pas de véritable caméléon dans l'Amérique, 198, 205. — Description du caméléon, par Latreille, 207. — Première variété, celui du Sénégal, 209. — Seconde variété, celui de Ceylan, 210. — Le caméléon nain du cap de Bonne-Espérance, 212. — Sa description, 213. — Le changement des couleurs de sa peau, 215. — Ses variétés, 216. — Le caméléon nez-fourchu de l'Inde, 217. — Sa description, 218. — Ses dimensions, 220. — Tableau méthodique du caméléon, VIII, 373.

CAMELINE, *myagrum*. Genre 26 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 71. — Cinq espèces, 72. — Usages et propriétés, 73.

CAMELLI. Genre 13 des orangers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 264.

CAMERARIA. Genre 5 des plantes dites *apocins*. *Hist. des Plantes*, XVI, 167. — Deux espèces, 168.

CAMERISIER (le). Espèce remarquable de chèvre-feuille. *Histoire des Plantes*, XIV, 134.

CAMES (les). Genre 111 des mollusques dits *acéphales*. *Histoire des Mollusques*, VI, 187. — Leur description, 188. — Lieux où on les trouve, et leur mode de génération, 191. — Quatre espèces, 192.

CAMOCLADIA. *Voy. BRÉSILLET BATARD*.

CAMOMILLES (les). *Anthemis*. Genre 154 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 117. — Espèces remarquables. La camomille odorante ou romaine, ou des boutiques, 118. — La camomille fétide ou la marouthe, 119. — La camomille pyrethra, celle des teinturiers, ou l'œil de bœuf, et celle à feuilles d'armoise,

Tab. TOME I.

L

120. — 18 espèces de France, 122. — 39 espèces connues, 127.

CAMPAGNES. Comparaison de la mortalité de Paris à celle des campagnes, à dix, quinze et vingt lieues de distance, XIX, 359.

CAMPAGNOL (le). Nom du mulot à courte queue, XXV, 207. — Espèce de rat remarquable par la grosseur de sa tête, 222. — Il ressemble beaucoup au rat d'eau par ses parties intérieures; en quoi il en diffère à l'extérieur, 224.

CAMPANULACÉES (les). 44^e famille des plantes. *Hist. des Plantes*, XIV, 183. — § 1, anthères distinctes. Genre 1, le cératostème du Pérou, 185. — Genre 2, les michauxies, 186. — Genre 3, la canarine, 188. — Genre 4, les campanules, 189. — Genre 5, les ligstroeties, 211. — Genre 6, les trachelies, 212. — Genre 7, les roelles, 215. — Genre 8, la cyrille élégante, 215. — Genre 9, les gesnières, 216. — Genre 10, la gloxinie tachée, 219. — Genre 11, les cyphies, 220. — Genre 12, les soe-voles, 221. — Genre 13, la sellière, 222. — Genre 14, les goodenies, 223. — Genre 15, les raponcules, 225. — § 2, étamines réunies par leurs anthères. — Genre 16, les lobelies, 232. — Genre 17, les jafones, 243.

CAMPANULES (les), *campanulaceæ*. 6^e ordre, famille 44 de la 4^e classe des plantes dycotylédones; leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 411. — Genre 4 des plantes dites campanulacées, XIV, 189. — 29 espèces de France, 191. — 112 espèces connues, 199.

CAMPÊCHE, *hæmatoxylum*. Genre 11 des plantes légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 283.

CAMPERIEN (le). Poisson du genre des *scombroces*. *Hist. des Poissons*, XII, 340, 341. — Sa description, 342.

CAMPÊRE (le). Sur celui fourni par le laurier camphrier; comment on l'extrait de cet arbre au Japon. *Hist. des Plantes*, XI, 137. — Comment on l'emploie, 138.

CAMPÊRÈES (les). Genre 8 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 21. — Celle

de Montpellier, *idem*. — Une espèce de France et quatre espèces connues, 22.

CANANGA. Genre 4 des plantes anones. *Hist. des Plantes*, XVIII, 361.

CANARD (le). Sa synonymie, LXI, 291. — Temps de son arrivée en France, 298. — Manière de l'attirer et de le chasser, 300. — Observation à ce sujet, de M. Hebert (note). Et par M. Baillon, 302 (note). — Comment on prend les canards en Lorraine, et nom qu'on a donné à cette chasse, 305. — Preuve de la mémoire des canards 306. (note). — Recette plaisante donnée par Buchoz, pour la chasse des canards, 308 (note). — Chasse que font les Kamtschadales, *idem*. — C'est en Picardie que l'éducation des canards domestiques est la mieux soignée, et la chasse des canards sauvages la plus fructueuse, 309. — Note à ce sujet, de M. Hebert, 310. — Description, par M. Ray, de la chasse qui se fait sur le bel étang d'Arminvilliers en Brie, 311. — Chasse décrite par Willughby, 313 (note). — Manière de tirer les canards avec le fusil, 314 (note). — Sur le piège appelé *collet à ressort*, 315 (note). — Sur la chasse appelée *glanée*, 316 (note). — Les allures des canards sauvages sont plus de nuit que de jour, 317. — Leur population, 318. — Note de M. Pallas à ce sujet, 320. — Lieux où on les trouve en grande quantité, 321 et *suiv.* Leur accouplement et leur ponte, 326. — L'incubation et soin des petits, 328. — Leurs ailes, 329. — Dans quel état on appelle les canards hallebrans, et comment alors on les chasse, 329, 330 (note). — Canards sauvages du nouveau monde, 332. — Leur quantité, d'après le rapport des auteurs, 333. — Manière dont on les rend domestiques, 337. — Comment on les élève avec fruit, 338. — Description d'une basse-cour aux canards, 339. — Alliances étrangères des canes, 342. — Poule qui couve les œufs de canards, 343. — Nourriture des jeunes canards, et leur accroissement progressif, 344. — Couleurs des canards sauvages et privés, 346. — Différences entre le mâle et la femelle, 348. — Canards métiés, 349. (note). — Différentes races de canards, 350. —

Leur mue, 357. — Leur organisation intérieure ; 359. — Combat d'un furet avec un canard, 361 (note). — Sur la chair du canard, 362. — Usage en médecine de sa graisse et de son sang, 363. — Utilité qu'on tire de ses plumes, 364 (note). — Divisions dans leurs nombreuses espèces, 365. — Le canard musqué, 366. — Sa description, 368. — Sa structure intérieure et ses allures, 370. — Son nid et sa ponte, 375. — Le canard du Nil, par Sonnini, 377. — Le canard moine, par le même, 380. — Le canard royal, par le même, 381. — Le canard de Georgie, par le même, 382. — Le canard siffleur et le vingeon ou gingeon, 383. — Remarques de M. Baillon sur ce canard, 386, 390. — Ses voyages, 388. — Il se trouve aussi en Amérique, 390. — Observations de M. Lefebvre Deshayes sur le canard siffleur appelé vingeon en Amérique, 394. — Le canard siffleur à queue noire, par Sonnini, 401. — Le canard siffleur du cap de Bonne-Espérance, par le même, 403. — Le kogolin, par le même, 405. — Le siffleur huppé, 406. — Ses habitudes, 408. — Le siffleur à bec rouge et narines jaunes, 409. — Lieux où il se rencontre, 411.

Le siffleur à bec noir, LXII, 5 — Il occupe alternativement presque toute l'étendue du nouveau continent, 7. — Le canard à bec courbé, par Sonnini, 8. — Le canard d'Islande, par le même, 10. — Le canard brun, par le même, 11. — Le heturrera, par le même, 13. — Le chipeau ou le ridenne, 15. — Il est aussi habile à plonger qu'à nager, 17. — Ce qu'en dit M. Baillon, 18. — Le souchet ou le rouge. *Voyez* ce mot, 22. — Le pilet ou canard à longue queue, 35. — Le canard à longue queue de Terre-Neuve, 41. — Sa description et sa ressemblance avec le miquelon, 42. — Ce que c'est que le canard des glaces, par Sonnini, 45 (note) — Le tadorne. *Voy.* ce mot, 47. — Celui du cap de Bonne-Espérance, 63. — Le millouin, 65. — Sa description, 67. — Ce qu'en dit Baillon, 68. — Observations de M. Hebert, 69. — Le succé, par Sonnini, 75. — Le millouinan, 76. — Le garrot, 79. — Le morillon, 86. — Le petit morillon, 93. — La macreuse, 97. — La

double macreuse, 108. — La macreuse à large bec, 111. — Le beau canard huppé; son plumage, 114. — Pourquoi on l'appelle aussi canard branchu, 117. — Le petit canard à grosse tête, 120. — Le canard à collier de Terre-Neuve, 122. — Ses habitudes, 125. — Le canard brun, 126. — Le canard presque brun, par Sonnini, 129. — Le canard à tête grise, 130. — Sa description, 131. — Lieux où on le trouve, et note sur cet oiseau, par Sonnini, 132. — Le canard à face blanche, 134. — Le viudita, par Sonnini, 136. — Le marea et le marea, canards du Brésil, 138. — Le canard à bec taché de rouge, par Sonnini, 142. — Le canard à tête couleur de cannelle, 144. — Le skoura, 146. — Le canard gloussant, 147. — Singulière variété de son plumage, 148. — Le canard de *Steller*, 149. — Sa description, 150. — Le nyroca, canard du Nord, 152. — Le canard gris d'Egypte, 155. — Le canard dominicain du cap de Bonne-Espérance, 157. — Le canard pie, 159. — Le canard varié à calotte noire, 161. — Le canard huppé de la terre des États, 163. — Toutes ces espèces de canards, depuis celui de la page 142, sont décrites par Sonnini. — Ressemblance des sarcelles avec les canards, 164. — Espèce de canard du Japon, appelé kimnodsui, 202 (note). — Espèces qui ont rapport aux canards et aux sarcelles, 236. — Canard à quatre ailes, *idem*. — Le canard de Barbarie, 238. — Sa description par Pallas, (note 2), *idem*. — Les saukis, 239. — Le turpan ou tourpan, canard de Sibérie, 241. — Le petit canard des Philippines, 243. — Canards du détroit de Magellan, 245. — Le canard peint de la Nouvelle-Zélande, 246. — Le canard sifflant à bec mou, 247. — Le canard à crête rouge, 248. — Dix autres espèces décrites par Fernandez, *idem*. — Deux autres espèces, par Sonnini: savoir, le canard de l'île d'Alano dans la mer Baltique, et celui de la mer Caspienne et de toute la Russie méridionale, 251. (note).

CANARINE. (la). Genre 3 des plantes dites campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 188. — Une espèce connue, *idem*.

CANARIUM. Genre 10 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 182.

CANCERIDES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 21. — Espèce de crustacées, V, 188. — Leur description, 350.

CANCELLAIRE (la). Genre 85 des mollusques gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 11. — 5 espèces, 12.

CANCER-MAJOR (le). Observations de Collinson sur cette espèce de crabe. *Hist. des Insectes*, V, 109.

CANCHES (les). Aira, genre 47 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 239. — 8 espèces de France, 240. — 16 espèces connues, 242.

CANETTE BLANCHE. Voy. WINTERANIA.

CANEPHORES. (les). 82^e genre des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 109. — 2 espèces connues.

CANEPETIÈRE (la) ou petite Outarde, XLI, 55. — Ses différens noms, 57. — Sa description, 61, 71. — Son cri, sa ponte, 63. — Quels lieux elle habite, 65.

CANNA (le) Animal de l'Amérique méridionale; sa connoissance est due à MM. Gordon et Allamand, dont Buffon rapporte les observations, XXXI, 120. — Sa description, 122. — Elle s'accorde avec celle du cou-dous, 123. — Ses cornes, 124. — Il est improprement appelé élan au Cap, 125. — Description du canna du Cap, 126. — Sa marche au Cap, 127. — Si le canna est l'oryx des anciens, 128. — Description d'une femelle, 130.

CANNE A SUCRE, *saccharum*. Sa description. *Hist. des Plantes*, II, 383. — 24^e genre des graminées, VII, 172. — Espèce remarquable, la canamelle, 173. — Histoire de la canne et de son transport dans différens lieux, 174. — Dans quel tems on la plante, 178. — Sa récolte, 179. — Manière de faire le sucre, 180. — Ses propriétés et ses usages, 183. — 2 espèces de cannes de France, et 11 espèces connues, 185.

CANNELLIER (le). Arbre d'Asie, toujours verd, 1^{er} genre de la famille des lauriers. *Hist. des Plantes*, XI, 138. — Ses produits, 140.

CANNES DE TABAGO. Avec quoi on les fait. *Hist. des Plantes*, VIII, 58.

CANONS. Soudure dans les canons des armes à feu, V, 256. — Observations et expériences pour améliorer les canons de la marine, VI, 139. — Note sur les canons de fer battu, 140. — X, 354. — Canons de fer coulé, VI, 142. — Comment les canons se fondent, 145. — Causes qui contribuent à leur fragilité, 149. — Expériences de M. Maritz sur la fonte des canons, 157 (note.) — Fonte de canons à la forge de Ruelle, en Angoumois, 162. — Sur l'épreuve des canons, 164. — Projets présentés pour faire de meilleurs canons, et sur celui de M. de Souville, 167. — Connoissances de M. de Montalambert dans la fonderie des canons, 169. — Moyens de perfectionner la moulure, 171 (note). — Attention très-nécessaire, lorsqu'on coule des canons, 172. — Usage des mines en roche, 174. — Sur celles qu'on emploie à Ruelle, 175. — Note de M. Montbeillard sur l'espèce de fer à préférer pour les canons de fusil, X, 375.

CANTHARIDES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 185, 187. — 25^e famille des insectes, X, 336. — 1^o Le mylabre, 367. — 2^o Le cérocome, 373. — 3^o Le meloé, 376. — 4^o L'œnas, 392. — 5^o La cantharide, 395. — Celle vésicatoire, 398. — Ce qu'ont dit les Grecs et les Romains des cantharides, 399. — 2 espèces, 401. — 6^o Le sitaris, 402. — 7^o Le zonitis, 404.

CANTHARIDIËS. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, V, 243.

CANTHÈRE (le). 13^e espèce du genre des poissons appelés *sparcs*. *Hist. des Poissons*, IX, 376. — Sa description, X, 69.

CANTIS (les). Genre 60 des plantes dites *rubiacées*. *Hist. des Plantes*, XIV, 85. — 6 espèces connues, 86.

CANTUA. Genre 3 des plantes dites *polémoinés*. *Hist. des Plantes*, XVI, 127.

CANUDE (le). 90^e espèce du genre des poissons dits *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 142 et 270.

CANUT (le). Oiseau de rivage; sa description, LIX, 91.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. Ses vents et son nuage singulier, II, 317.

CAPELAN (le) d'Amérique. Poisson du genre des saumons, garni d'espèces de poils. *Hist. des Poissons*, II, 212. — 8^e espèce des gades, poissons osseux. Ses habitudes et sa description, VI, 337. — Sa pêche, VII, 66.

CAP-MORE (le) Oiseau du Sénégal, du genre des troupiales, XLV, 165. — Description de deux de ces oiseaux, 166. — Description de leurs habitudes, 168.

CAPOET (le) Onzième espèce du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 79 — Lieux qu'il habite, et sa description, 157.

CAPILLAIRE. *Adiantum*. Genre de fougere; ses espèces. *Hist. des Plantes*, III, 186, 211.

CAPPA (le). 7^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 114 et 175.

CAPPARIDES. *Voy. CAPRIERS*.

CAPRAIRES. Genre 6 des plantes dites *personnées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 5.

CAPRICORNE. Nom donné à un animal qui diffère du bouc domestique et du bouquetin, XXX, 215.

CAPRICORNE. *Carambix*. Insecte du genre des cérambicins proprement dits; *ex. stenocorus festinus*. *Hist. des Insectes*, III, 215. — Genre 216 d'insectes; leurs caractères. XI, 282. — 9 espèces, 285.

CAPRIERS (les), *capparides*. 12^e ordre, famille 85 de la 4^e classe des plantes dicotylédones; leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 362. — Genres voisins de la famille des capriers, 367. — Les mêmes, XVIII, 80. — Genre 1, mosambé, *id.* Genre 2, cadaba, et genre 3, le caprier proprement dit, 82. — Ses propriétés, 83. — Genre 4, sodada, 84. Genre 5, crateva, 85. — Genre 6, morisonia ou mabouia, 86. — Genre 7, durio, 87. — Genre 8, marcgravia, 89. — Genre 9, norantea, et genre 10, reseda, 90. Genre 11, rossolis, 92. — Genre 12, parnassie, 94.

CAPRIFICATION. Ce que c'est que cette opération, et comment on la pratique. *Hist. des Insectes*, XIII, 253. — *Idem. Hist. des Plantes*, X, 67.

CAPRIFOLIUM. *Hist. des Plantes*, XIV, 156.

CAPROS. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des

osseux. *Hist. des Poissons*, X, 154. — Genre 145 des poissons, celui sanglier, 270, 271.

CAPSES (les). Genre d'insectes dits corisies. *Hist. des Insectes*, XII, 229. — 29 espèces.

CAPSES (les). Genre 142 des mollusques dits *acephales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 355. — 2 espèces, 356.

CAPSICUM. Voyez PIMENT.

CAPSULE (la). Fruit à plusieurs grains. *Hist. des Plantes*, II, 207. — Ses divisions, 208.

CAPUCINE, *tropoleum*. Genre 3 des plantes geraines ou *geranium*. *Hist. des Plantes*, XVIII, 221. — 4 espèces, 222. — Propriétés, 223.

CAQUEFIRIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 42.

CARABE (le) Pétard; artillerie ambulante de cet insecte. *Hist. des Insectes*, I, 261. — Il est du genre des métalliques; ex. *Carabus aratus*, III, 91. — Genre vingt-cinq des insectes dits *coléoptères*, VIII, 303. — Leurs divisions en vingt-deux genres, 303. — Leurs caractères, 305. — 1^o celui scabreux, 307. — 2^o celui chagriné. — 3^o celui violet, 308. — 4^o celui ciselé. — 5^o celui embrouillé, 309. — 6^o celui purpurin. — 7^o celui bleu, 310. — 8^o celui espagnol. — 9^o celui splendide, 311. — 10^o celui carolingis. — 11^o celui perlé. — 12^o celui jardinier, 312. — 13^o celui enfumé. — 14^o celui campagnard, 313. — 15^o celui de Scheidler. — 16^o celui irrégulier, 314. — 17^o celui de Creutzer. — 18^o celui glabre. — 19^o celui sutural, 315. — 20^o celui marginal. — 21^o celui doré, 316. — 22^o celui doré brillant. — 23^o celui brillant, 317. — 24^o celui granulé. — 25^o celui grillé, 318. — 26^o celui enchainé, 319. — 27^o celui noduleux. — 28^o celui vagabond. — 29^o celui scabriuscule, 320. — 30^o celui convexe, 321.

CARABIQUEs, *carabici*. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 80. — V, 207. — Famille 3^e des insectes appelés *coléoptères*; leur description, VIII, 211. — 2 espèces, les *célégrades* et les *élaphriens*.

CARACAL (le). Espèce de lynx commun en Barbarie et en Arabie; sa synonymie, XXVI, 357. — Il est le guide ou le pourvoyeur du lion, 359. — Comment

on le dresse à la chasse, 360. — Autres espèces, 362. — On trouve le caracal au Cap de Bonne-Espérance, 363.

CARACARA (le). C'est à tort que Maregrave a confondu cet oiseau avec un autre qui porte le même nom; espèce de faisan des Antilles, décrit par le P. Duterre, XLII, 315.

CARACCA (le). Espèce d'aigle des montagnes de la nouvelle Grenade, décrit par Sonnini, XXXVIII, 31. — Force de son bec, 32.

CARACO. (le). Espèce de rat de Sibérie, décrit par Sonnini, XXXII, 217.

CARACTÈRES (les). En quoi consistent leurs différences, XX, 298. — Trois sortes de caractères relatifs à l'histoire naturelle. *Hist. des Insectes*, I, 80. — Caractères adoptés dans la botanique. *Hist. des Plantes*, III, p. 14 de l'Avant-propos.

CARAGANA. Genre 59 des plantes dites *légumineuses*. *Hist. des Plantes*, XVII, 335.

CARAGATES (les). Genre 13 des plantes dites *meurderes*. *Hist. des Plantes*, VIII, 249. — Espèces remarquables, la caragate paniculée, 250. — La caragate à un seul épi, celle usneioide, 251. — 16 Espèces connues, *idem*.

CARAÏBES (les). Ce qu'ils sont, et leur usage d'aplatir la tête des enfans nouveaux nés, XX, 330. — Vengeance qu'ils ont exercée contre les Européens en répendant dans quelques-unes des Antilles, les serpens venimeux qu'ils enlevèrent de la Terre ferme. *Hist. des Mollusques*, I, 306. — Les Caraïbes modernes ont beaucoup perdu de l'industrie de leurs ancêtres et leur vie molle, II, 151.

CARAMBOLIER, *bilimbi*, *averrhoa*. Genre 33 des plantes dites *térébintacées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 208. — 2 espèces et propriétés, 209.

CARANGUE (le). 10^e espèce des poissons osseux dits *caranx*. *Hist. des Poissons*, VIII, 5. Voyez CARANX.

CARANX (les). Genre 62 des poissons osseux; deux

nageoires dorsales ; point de petites nageoires au dessus ni au dessous de la queue ; les côtés de la queue relevés longitudinalement en carène , ou une petite nageoire composée de deux aiguillons et d'une membrane au-devant de la nageoire de l'anus. 1^{er} sous genre. Point d'aiguillon isolé entre les deux nageoires dorsales , 15 espèces *Hist. des Poissons* ; VII, 395. — 2^e sous genre. Un ou plusieurs aiguillons isolés entre les deux nageoires dorsales , 6 espèces , 399. — Le maquereau bâtard ou caranx trachure , 1^{ere} espèce ; sa synonymie , 402. — Distinction entre les scombres et les caranx , 404. — Description du trachure , 405. — L'amie , la queue jaune , le caranx amie et le caranx queue jaune , 2^e et 3^e espèces , 409. — Le derbio , le caranx glauque , 4^e espèce , 412. — Sa description , 413. — Le djedaba , la queue rouge , le caranx blanc et le caranx queue rouge , 5^e et 6^e espèces , 415. — Le filamenteux , 7^e espèce , 418. — Le caranx Daubenton , 8^e espèce , 420. — Le rim , le caranx très-beau , 9^e espèce , 422. — Le carangue , 10^e espèce , VIII, 5. — Le scombre à bandes , le verdier , le crumenophthalme , le maquereau de plumier , le walin-parei , le scombre rouge , le caranx fascé , le caranx chloris , le caranx crumenophthalme , la caranx plumier , le caranx klein et le caranx rouge , 11^e , 12^e , 13^e , 14^e , 15^e , 16^e espèces , 7. — Le ferdau , le gaezz , le sansun , le kirm , le caranx ferdau , le caranx goezz , le caranx sausun et le caranx korab , 17^e , 18^e , 19^e et 20^e espèces , 14.

CARANXOMORES (les). Genre 64 des poissons osseux ; leurs caractères distinctifs , et 3 espèces. *Hist. des Poissons* , VIII, 24. — 1^o le caranxomore pélagique , 26. — 2^o le caranxomore plumérien , 28. — 3^o le pilitschei , 29. — Supplément à leur tableau ; celui sa-crestin. XIII, 289. — Sa description , 290.

CARAPACE. C'est ainsi qu'on nomme la boîte osseuse ou écailleuse qui couvre la tortue. Carapace d'une jeune tortue marine. *Hist. des Reptiles* , II, 48. Voyez. TORTUE.

CARAVANE. Ce que c'est , XXIX , 25.

CARBONATE CALCAIRE (le). Sur la faculté donnée à un grand nombre de mollusques de le dissoudre. *Hist. des Mollusques*, V, 212.

CARCAJOU (le). Animal de l'Amérique septentrionale; sa description, XXXIII, 208. — Autre description, 220. — Le kinkajou n'est pas le même animal, 223. — Preuves à cet égard, 233.

CARDAMINE. Voy. CRESSON.

CARDÈRES (le). *Dipsacus*. Genre 2 des plantes dites *valérianes*. *Hist. des Plantes*, XIII, 267. — Espèce remarquable, le cardère à foulon, cardon ou chardon à foulon, 268. — Sa culture, 270. — Son usage en médecine, 271. — 4 espèces de France, et autant d'espèces connues, 272.

CARDES POIRÉES. Voy. BETTES.

CARDIAQUES. Voy. AGRIPAUMES.

CARDINAL (le). Voyez le COMMANDEUR.

CARDINAL (le). 68^e espèce du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 401; sa patrie, X, 120.

CARDINAL (le) HUPPÉ. Oiseau des climats tempérés de l'Amérique, espèce de gros-bec de Virginie, XLVII, 23. — Sa description, 24 (note). — Ses variétés, 26. — Le cardinal de Sibérie, ses habitudes, sa voix, son plumage, 99 et suiv. — Le petit cardinal du Volga, 104. — Le cardinal huppé d'Afrique, 106. — Le cardinal de Virginie à bec jaune, 108. — Le cardinal oiseau du Mexique, le même que le scarlatte, XLVIII, 267, 270. — Ses variétés, 271. — Le cardinal à collier, 273.

CARDINALE (la) des jardiniers. Espèce de plante du genre des campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 234.

CARDIOSPERMUM. Voy. POIS DE MERVEILLES.

CARDITES (les). Genre 138 des mollusques dits *acéphales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 342. — 2 espèces, 344.

CARDIUM. Voy. BUCARDE.

CARDINE. 2^e espèce de poissons, appelée *la sole*. *Hist. des Poissons*, XI, 312.

CARDON ou CHARDON à foulon ou à bonnetier. *Hist. des Plantes*, XIII, 269.

CAREX (les) ou LEICHES. *Voy. SOUCHETS*.

CARIACOU (le). XXV, 47. — Le cariacou ou biche des bois, XXXI, 184, 195. (note.)

CARIAMA (le). Espèce de grue d'Amérique, LVII, 84. — Sa description, 86.

CARIBOU (le). Sa description, XXX, 110. (note.) — Sa légèreté, 128. (note.) — Si c'est le renne de Laponie, 163. — Sa différence avec le renne, 164. — Histoire suspecte à ce sujet, 165.

CARICA. *Voy. les PAPAYERS*.

CARILLONNEUR (le). Espèce de fourmilier, XLIX, 361. — Ses habitudes particulières, 362.

CARINAIRE (la) ou nautille vitrée, et coquilles vivantes qui paroissent se réunir à ce genre. *Histoire des Mollusques*, IV, 47. — Synonymie de la carinaire, *idem*. — Sa description et son extrême rareté, 48. — Dargenville est le premier qui l'ait fait graver, 49. — Elle vient d'Amboine, ce qui est confirmé par Labillardière, 50. — Le capitaine Huon a légué, par son testament, cette belle coquille au muséum d'histoire naturelle de Paris, 53. — Détails sur cette coquille, donnés par Labillardière, 54. — Il est probable qu'elle est une pièce testacée intérieure, 55. — Faits qui viennent à l'appui de cette hypothèse, 56. — Les formes particulières de la carinaire ne permettent pas de la mêler parmi les argonautes, 58. — Sentimens de quelques auteurs à ce sujet, 59. — Planche 43, fig. 1 et 2, la carinaire, 64.

CARIOPHYLLUS. *Voy. GÉROFLIER*.

CARIS, carios. Insecte du genre des tiques; *ex. caris vespertilionis*. *Hist. des Insectes*, III, 67.

CARISSA. Genre 24 des plantes dites *apocins*. *Hist. des Plantes*, XVI, 192. — 3 espèces, 193.

CARLINES (les). Genre 39 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 72. — Six espèces de France, 73. — 11 espèces connues, 75.

CARMANTINES (les). Genre 6 des plantes dites *acanthes*. *Hist. des Plantes*, XV, 111. — Leur description,

112. — Espèces remarquables, la carmantine fastueuse et celle pourpre, 113. — Celle à double calice, et celle à tige hexagone, 114. — Celle à crochet et celle dite la belle, 115. — Celle tachée et celle teignante, 116. — Celle d'Amérique et celle pectorale, 117. — Celle adathode; noyer de Ceylan, noyer des Indes, 118. — Celle à feuilles d'hysope, 119. — Celle odorante et celle à feuilles sinuees, 120. — 147 espèces connues, 121.

CARNILLET. *Voy. CUCUBALE.*

CARNIVORE. L'homme l'est naturellement, XXIV, 281.

CAROLIN (le). 3^e espèce de poissons du genre des trigles; sa description. *Hist. des Poissons*, IX, 19.

CAROLINE (la). 3^e espèce du genre des poissons appelés argentines. *Histoire des Poissons*, XII, 366.

CARONCULES MYRTIFORMES. Ce que c'est, XVIII, 353.

CARONCULÉ (le). Oiseau de la nouvelle Zélande, de l'espèce du martin, XLVI, 350.

CAROTTE. *Daucus*. Genre 36 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 321. — 5 espèces et leurs propriétés, 322.

CAROUBIER, *ceratonia*. Genre 5 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 251.

CAROUGE (le). Oiseau de Cayenne, XLV, 211. — Sa description, 212. — Ses variétés, 216. — Le petit cul jaune de Cayenne, 217. — Autres espèces de carouge, 220. — Les coiffes jaunes, 224. — Le carouge olive de la Louisiane, 226. — Sa description, 227. — Le kink, 229. — Sa description, 230.

CAROXYLUM (le) d'Afrique. Genre 13 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 30. — Espèce connue, 31.

CARPEAU (le). 7^e espèce du genre des poissons appelés characins. *Hist. des Poissons*, XII, 259, 267.

CARPE (le). Les naturalistes appellent de ce nom la manière dont la main du bras d'un crabe s'emboîte dans la pièce qui lui succède. *Hist. des Insectes*, V, 36.

CARPES (les). Effets de l'eau trop froide sur elles. *Hist.*

des Poissons, II, 43. — Moyens de les engraisser, 62. — La carpe est le poisson que Duverney a choisi pour ses observations, dans son mémoire sur la circulation du sang chez les poissons qui ont des ouies, 159. — Dénombrement des pièces très-nombreuses qui servent à la respiration de la carpe, 171. — Expérience sur une carpe pour reconnoître combien il y a d'air dans le corps des poissons, et combien cet air leur est nécessaire, 174. — Observations sur la structure de son cœur, 246. — La première espèce de ces poissons se nomme carpe-cyprins. XIII, 76. — Lieux où on pêche les carpes, 96. — Leurs voyages, 98. — Leur description, 99. — Leur grosseur, 100. — Leur vieillesse, 101. — Leurs maladies, 102. — Leur patrie naturelle est l'Europe méridionale, 103. — Leur multiplicité, comment on les châtre, et précautions pour retirer d'un étang, qui renferme des carpes, les plus grands avantages, 104. — Sur celles du Rhin, 109. — Comment on les pêche, 110. — On peut faire avec leurs œufs du caviar, 111. — Ce que c'est que la pierre de carpe, et montruosités qu'elle présente, 112. — Son mélange avec d'autres cyprins, 114.

CARPÉSIES (les). Genre 136 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 56. — 1 espèce de France, et 2 espèces connues, 57.

CARPHALE (la) de Madagascar. Genre 23 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 380. — Une espèce connue, 381.

CARPION (le). 11^e espèce du genre des poissons appelés salmones. *Hist. des Poissons*, XII, 113, 186.

CARPODETUS. Genre 27 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 240.

CARRELET (le). 20^e espèce du genre des poissons appelés pleuronectes. *Hist. des Poissons*, XI, 279. — Lieux où il se plaît, 338. — Sa description, 339.

CARRIÈRES. Leur composition, I, 115. — Composition de celles du canton de Moxouris, au haut du faubourg Saint-Jacques, 341. — Etendue de celle de Maëstricht, III, 22. — Différens lits des carrières, 38.

— Note de M. de Lacépède sur celle de Condat, près d'Agen, VIII, 203. Carrières particulières, 205 (note.)
 — Celles de Caumont, près Bouillé, petite ville à quatre lieues de Rouen, offrent des traces d'une ancienne exploitation très-forte. *Hist. des Mollusques*, III, 306.
 — Celle de la Tolfa à Rome, X, 14, 16 21 (note.)

CARTE GÉOGRAPHIQUE des deux parties polaires du globe, avec l'explication, IV, 165. — Cartes magnétiques, avec leur explication, XVI, 55.

CARTHAMES (les). Genre 37 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 65. — Espèce remarquable, celui officinal, 66. — Usage qu'on tire de ses fleurs, 67. — Il est un objet important de culture pour certains pays, 68. — 3 espèces de France, 69. — 16 espèces connues, 70.

CARTILAGES (considérations sur les). XIX, 11.

CARTON. Les guêpes du nouveau Monde font du carton. *Histoire des Insectes*, I, 228.

CARUDE (le). 77^e espèce du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 405; et X, 128.

CARVI, *carum*. Genre 3 des plantes dites *ombelifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 258.

CARYOPHYLLÉES (les), *caryophyllae*, 12^e ordre, famille 87 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 376. — Genres voisins de la famille des caryophyllées, 389. — Leur définition, XVIII, 113.

§ 1. Calices partagés, style unique ou triple, trois étamines. — Genre 1, *ortegia*, 114. — Genre 2, *loestingia*. — Genre 3, *holosteum*, 115. — Genre 4, *polycarpon*. — Genre 5, *donatia*, 118. — Genre 6, *mollugo*. — Genre 7, *minuartia*, 117. — Genre 8, *queria*, 118. — § 2. Calices partagés, quatre étamines; deux styles ou quatre. — Genre 9, *buffonia*. — Genre 10, *sagine*, 119. — § 3. Calices partagés, cinq étamines, ou huit; deux styles, ou trois ou quatre. — Genre 11, *morgeline*, 121. — Genre 12, *pharnaceum*, 122. — Genre 13, *moeringe*. — Genre 14, *elatine*, 123. — § 4, Calices

Calices partagés, dix étamines; trois styles ou cinq. Genre 15, bergia, 124. — Genre 16, spargoute, 125. Genre 17, cherleria. — Genre 18, sabline, 127. — Genre 19, stellaire, 129. — § 5. Calicestubulés alternativement, hypogynes; deux styles, ou trois ou cinq, genre 20, gypsophylle, 131. — Genre 21, saponaire, 133. — Genre 22, œillet *dianthus*, 135. — Genre 23, silène, 138. — Genre 24, cucubale, ou carnillet, 140. — Genre 25, lychnis, 142. — Genre 26, nielle, agrostemma, 145. — § 6. Calices tubulés, moins de dix étamines; deux styles ou trois. Genre 27, velezia. — Genre 28, drypis, 147. — Genre 29, sarothra. — § 7. Genres rapprochés des cariophyllées. — Genre 30, rotala, 148. — Genre 31, frankenia. — Genre 32, lin, 149. — Genre 33, le chea, 153.

CARYOTA (le). Genre 9 des palmiers, celui cassant. *Hist. des Plantes*, VIII, 62. — Ses usages, 63. — Le caryota doux, 64. — 2 espèces connues, 65.

CASOAR (le) Oiseau qui approche de l'autruche. Ses différens noms, XL, 311. — Sa description, 312. — Sur l'espèce de casque de sa figure, 313, 331. — Suite de sa description, 315 et suivantes. — Ses ailes, 318. — Ses plumes, 319. — Comment il se défend, 321. — Ses ongles et son naturel féroce, 322. — Son allure et sa langue, 323. — Sa nourriture, 324. — Description de ses parties internes et externes, 325, 326. — Usage du canal de sa verge, 327. — Lieux qu'il habite, 329. — Ressemblances entre le casoar, l'autruche d'Afrique, et celle de Magellan, 330. — Leurs différences, 331. — Le casoar de la Nouvelle-Hollande, 333. — Sa description, 334. — Ses parties intérieures, 335.

CASQUE (le) noir, ou merle à tête noire du Cap, XLVI, 133.

CASQUES (les). Genre 102 des mollusques gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 98. — Leur description, 99. — Neuf espèces, 100.

CASSARE (le). On appelle ainsi la farine qu'on prépare avec le manioc. Voy. ce mot.

CASSE. Genre 8 des plantes dites légumineuses

Tab. Tome I.

M

Hist. des Plantes, XVII, 255. — Sept espèces, 256. — Leurs propriétés, 258.

CASSE-LUNETTE. Nom donné à l'eufraise officinale, et pourquoi. *Hist. des Plantes*, XV, 49.

CASSE-NOISETTE (le). 2^e espèce d'oiseau du genre des manakuins. D'où lui vient ce nom, XLIX, 244. — Lieux qu'il habite; ses habitudes, son plumage, 245.

CASSE-NOIX (le). Oiseau qui a rapport avec le geai et la pie, XLIV, 268. — Deux variétés, 269. — Son plumage, et lieux où il se plaît, 271. — Ses voyages, 272. — Ses rapports avec les pies, 274.

CASSIA LIGNEA. Nom que l'on donne, dans les pharmacies, à l'écorce de l'arbre dit le laurier-casse. *Hist. des Plantes*, XI, 141.

CASSICAN (le). Oiseau des parties méridionales de l'Amérique, LVI, 82. — Sa description, 83.

CASSIDE, *cassida*. Insecte du genre des galéruques. Ex. *Cassida viridis*. *Hist. des Insectes*, III, 233. — Insectes du genre des chrysomélides, XI, 339. — Leurs larves, 340. — Genre 240. Leur description, XII, 21. — Leurs larves, 22. — 17 espèces, 25.

CASSINE. Genre 8 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 218. — Trois espèces, 219.

CASSIQUE (le) jaune du Brésil, ou l'yapou. Oiseau, XLV, 188. — Addition à son article par Sonnini, 193. — Sa description, 196. — Ses habitudes, 197, 201. — Ses variétés, 199. — Le cassique verd de Cayenne, 203. — Le cassique huppé de Cayenne, 206. — Le cassique de la Louisiane, 209.

CASSUVIUM. Voy. ACAJOU.

CASTAGNEUX (les). Oiseaux de l'espèce des grèbes, LIX, 337. — 1^{re} espèce. Le castagneux des Philippines, 341. — 2^e espèce. — Le castagneux à bec cerclé, 3^e espèce, 343. — Le castagneux de Saint-Domingue, 4^e espèce, 345. — Le grèbe-foulque, 5^e espèce, 347. — Le castagneux des îles Hébrides, par Sonnini, 349.

CASTAGNOLE (le). 28^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 383; et X, 83.

CASTILLA (le) élastique. Genre 5 de la famille des orties; arbre du Mexique. *Hist. des Plantes*, X, 83.

— C'est la même plante que l'arbre connu à Quito sous le nom de *caucho*, 84.

CASTILNÈJES (les). Genre 6 des plantes dites rhinanthacées. *Hist. des Plantes*, XV, 47. — Deux espèces connues, 48.

CASTOR (le). Celui d'Europe, XXV, 60. — Sa synonymie, XXVI, 92. — Produit de la société des castors, comparé à celui de la société de l'homme sauvage, 96. — Qualités purement individuelles du castor, 99. — Singularité de sa conformation extérieure, 101. — Réunion des castors en société, *idem.* — Leurs opérations, 102. — Leurs constructions, 105. — Leurs qualités sociales, 111. — Manière de les chasser, 113. — Auteurs qui ont fait leur histoire, 114 (note). — Les castors solitaires, 117. — Lieux où on les trouve, 118. — Récit des anciens sur les castors, 119. — Détails sur un jeune castor privé, 99, 121. — Castors apprivoisés, 122. — Fourrure du castor, 123. — Pays où se trouvent les plus belles, 124 (note). — Ce que c'est que le castoréum, 125. — Différentes habitudes du castor, 127. — Sa comparaison avec l'ondatra ou rat musqué, XXVII, 84. — Il a reçu de la nature un don presque équivalent à celui de la parole, XXVIII, 92.

CASTRATION. Son usage chez l'homme, XVIII, 337. — Comment elle a lieu chez les Hottentots, *idem.* et XX, 285. — Une femme (*Sémiramis*), est la première qui en a donné l'exemple. Détails à ce sujet, 338 (note.) Castration du taureau, XXIII, 18. — De l'agneau, 69. — Du cochon, 134. — Nocuité de la castration pour les animaux XXIX, 92. — Elle n'empêche pas le bois du renne de se renouveler, XXX, 123.

CASUARINA (le) ou filao. Genre 2 de la famille des conifères. *Hist. des Plantes*, X, 173. — Le casuarina préle, et ses espèces connues, 175.

CATAIRES (les). Genre 18 des plantes labiées *Hist. des Plantes*, XV, 312. — Cinq espèces de France, 313. — 32 espèces connues, 315.

CATALANS (les), pêcheurs de sardines. — Comment ils tendent leurs filets. *Hist. des Poissons*, II, 452.

CATALOGUES. Celui des principaux auteurs et ouvrages qui traitent de la botanique. *Hist. des Plantes*, VI, 183. — Note sur celui des pièces que contenoit le cabinet du prince d'Orange. *Hist. des Moll.* III, 70.

CATALPA. Genre 7 des plantes dites *bignones*. *Hist. des Plantes*, XVI, 136.

CATAPHRACTES (les). Genre 165 des poissons, sous-genre 1, 1^{re} espèce. — Celui callichte. *Hist. des Poissons*, XII, 81, 83. — 2^e espèce. L'américain, 82, 85. — Sous-genre 2, 3^e espèce, le ponctué, 82, 85.

CATARACTE. Opération pratiquée par Cheselden sur un aveugle de naissance, XIX, 417.

CATARACTE. Chute d'eau, II, 105. — Noms de plusieurs; celle de Terni, en Europe, 106. — Celle de Niagara, 107. — Pays où elles sont plus fréquentes, 109.

CATESBÉES (les). Genre 33 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 394. — Deux espèces connues, 395.

CATESBY (le). 11^e espèce du genre des poissons appelés *scars*. *Hist. des Poissons*, IX, 344. — Sa description, 361. — On appelle du même nom la 57^e espèce du genre des poissons appelés *sparcs*, IX, 396; et X, 112.

CATIMBAN (le). Genre 1 des plantes dites balisiers; une espèce connue, IX, 274.

CATINGA. Genre 15 des plantes dites *myrtes*, XVII, 73.

CATOTOL (le). Oiseau de l'espèce du tarin, XLVIII, 212.

CATOSTOME (le). 63^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 93. — Sa description, 212.

CATURE (le) à épi, décrit par Linnæus. Genre 26 de la famille des euphorbes. *Hist. des Plantes*, X, 28. — 3 espèces connues, 29.

CAUCALIDE. Genre 37 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 326. — Quatre espèces, 327.

CAUCUS (le) 29^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 84. — Sa description, 166.

CAUDALE (la). C'est ainsi que s'appelle la nageoire de la baleine blanche. *Hist. des Cétacées*, 115. — Sa manière d'agir, 116.

CAUDEC (le). 6^e espèce de la classe des tyrans, oiseaux gobe-mouches, L, 241.

CAURALE (le), ou petit paon des roses, LIX, 168. — Son plumage, 169.

CAUSES FINALES. Second principe de Platon pour la génération des êtres, XVII, 108. — Quelles sont les causes qu'on peut mesurer, XXI, 253.

CAVERNES. Faits réceus sur leurs affaissemens, II, 451. — Lieux où elles se trouvent, et comment elles se forment, III, 16, 21. — Détails sur plusieurs, 17, 18, 19. — Terrains qui sont particulièrement caverneux, 21. — Elles sont produites, les unes par le feu des volcans, les autres par le mouvement des eaux souterraines. Détails à ce sujet, 23. — Moyen de se former une idée nette des plus anciennes cavernes, 27. — Leur affaissement subit cause fréquemment des tremblemens de terre, 43. — Les premières ont été bâties par les hommes dans la craie, VIII, 180. — Son particulier dans la caverne de la Balme, au mont Vergi (note), 274. — Les cavernes de Bareith sont remplies d'osteocoles, ou ossemens d'animaux pétrifiés, 288. — Les cavernes de Gailenreuth renferment une quantité de squelettes d'une espèce d'ours. *Hist. des Mollusques*, I, 60 (note).

CAVIAR (le). Préparation que les habitans des rives des mers Noire et Caspienne composent avec les œufs des femelles des poissons appelés acipensères. *Hist. des Poissons*, IV, 359. — C'est ainsi qu'on appelle une préparation faite avec les œufs de carpe, XIII, 111.

CAVILLONNE (la). 12^e espèce du genre des poissons appelés trigles. — Sa description. *Hist. des Poissons*, IX, 10, 44.

CAVITÉS des éminences du globe. Elles ont été remplies par les substances métalliques qu'on y voit aujourd'hui, IV, 77.

CAYENNE (l'île de). Sa température, IV, 27. — Ses fleuves, 121. Voyez GULANE.

CAYOPOLLIN (le). Petit animal des montagnes de la Nouvelle-Espagne, XXVIII, 73. — Description de sa structure, 76.

CEANOTHUS. Genre 203 des plantes dites *nerpruns*. *Hist. des Plantes*, XVII, 233. — Trois espèces, et leurs propriétés, 234.

CÉBRION, *cebrio*. Insecte particulier. Ex. *Cebrio gigas*. *Hist. des Insectes*, III, 98. — Genre 32^e des insectes dits *coléoptères*, VIII, 393. — Leurs habitudes, 394. — Le cébrion géant, 395.

CÉBRIONATES. *Hist. des Insectes*, III, 97. — Famille 4 des insectes appelés *coléoptères*, VIII, 380. — Leur caractère, *idem*. — Trois genres différens : celui des cistelles, celui des altiros et celui des cébrions, 382.

CÉCILIES (les). Genre 21 des poissons apodes ou osseux, qui n'ont pas de nageoires et qui ont l'ouverture des branchies sous le cou. *Hist. des Poissons*, V, 318, 319. — Différence des cécilies. La cécilie branderienne, 320, 324. — Le collibranche. Sa description, 324.

CÉCILIES (les). Genre 25 des reptiles ophidiens. Description générale. *Hist. des Reptiles*, VII, 411. — Leurs caractères distinctifs, 413. — Leurs habitudes, 415. Observations de Schneider sur leur squelette, 416. — La cécilie visqueuse, 418. — La cécilie lombricoïde, 420. — Ses dimensions, 422. — La cécilie à ventre blanc, 423. — Ses dimensions, 425. — La cécilie ibiare, 427. — Tableau méthodique des cécilies, VIII, 425.

CÉCYDOMIES. Genre 474 d'insectes de la famille des tipulaires. *Hist. des Insectes*, XIV, 292.

CÈDRE DU LIBAN. Voyez MELÈZE.

CEDRELA. Genre 16 des plantes dites *azéderacks*. *Hist. des Plantes*, XVIII, 249.

CÉILAN (le). 23^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Histoire des Poissons*, IX, 118 et 198.

CEINTURE (la) de préte, ou l'alouette de Sibérie, I, 359. — C'est, de toutes les espèces d'alouette, celle qui a le plus beau et le plus distingué plumage, 360.

CELASTRU. Genre 4 des plantes dites *nerpruns*. *Hist. des Plantes*, XVII, 215. — Une espèce, 216.

- CÉLERIGRADES , *celeripedes*. Insectes particuliers. *Histoire des Insectes*, III, 81. — Insectes de la famille des carabiques, VIII, 213.

CÉLONITE. Insecte du genre des masaris. Ex. *Masaris vespiformis*. *Histoire des Insectes*, III, 368. — Genre 405 d'insectes de la famille des masarides, XIII de la même histoire, 354.

CÉLOSIES (les), ou passe velours. Genre 2 de la famille des amaranthes. *Hist. des Plantes*, XI, 253. — La célosie à crête, 254. — La célosie écarlate, 255. — 18 espèces connues, 256.

CELSIA. Genre 1 des plantes dites *solandés*. *Hist. des Plantes*, XVI, 45. — Trois espèces, *idem*.

CELTIS (les). Voyez STILICOCOULIERS.

CÉMENTATION, ou manière de convertir le fer en acier, X, 384. — Extrait d'expériences faites à ce sujet, 393 (note.) — On peut, par l'effet de la cémentation, juger la bonne et la mauvaise qualité du fer, 403. — On peut, par le même moyen, séparer l'or de l'argent, XI, 65. (note.) — Sur le cuivre de cémentation, 244.

CENCHRAMOS (le) d'Aristote et de Pline, est le même oiseau que l'ortolan, XLVIII, 382.

CENCHRIS (les). Genre 10 des serpens appelés *ophidiens*. *Hist. des Reptiles*, V, 356. — Le cenchris mokeson, 358. — Sa description, 359. — Tableau méthodique des cenchris, VIII, 388.

CENCHRUS (le). Espèce de couleuvre d'Asie. Sa description. *Hist. des Reptiles*, VII, 139.

CENDRES. Pourquoi elles nettoient et détergent le linge par la lessive, X, 86.

CENDRILLARD (le). Oiseau de Saint-Domingue, du genre des coucous, LIV, 113.

CENDRILLE (la). Oiseau d'Afrique, qui a rapport à l'alouette, L, 364.

CÉNIE TURBINÉE (la). Genre 127 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 43. — Une espèce connue, 44.

CÉNOBITES. Peinture de la vie qu'ils mènent, XXIV, 280.

CENTAURÉES (les). Genre 46 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 122. — Leurs fleurons,

123. — Espèces remarquables, 1^o La chausse-trape étoilée, ou le chardon étoilé, 125. — 2^o La centaurée sudorifique, ou chardon béni, *idem*. — 3^o La jacée des prés, 126. — 4^o La centaurée de Raguse ou jacée d'Epidaure, 127. — 5^o Le bluet, 128. — 6^o La grande centaurée, 129. — 7^o La centaurée musquée, ou l'ambrette, 130. — 8^o La centaurée odorante, ou barbeau jaune, 131. — 29 espèces de France, 132. — 122 espèces connues, 140.

CENTÉNAIRES (exemples de), XIX, 385. — Chez les Romains, 391.

CENTENILLES (les). Genre 2 des plantes dites *lysimachies*. *Hist. des Plantes*, XIV, 353. — Une espèce de France et deux espèces connues, 354.

CENTRANODONS (les). Genre 169 de poissons; celui japonais. *Hist. des Poissons*, XII, 97, 98.

CENTRISQUES (les). Genre 20 des poissons cartilagineux. *Hist. des Poissons*, V, 296. — Le centrisque cuirassé, 297. — Sa description, 298. — Le centrisque sumpit, 304. — Le centrisque bécasse, 307.

CENTROGASTÈRES (les). Genre 90 des poissons osseux. — Leurs caractères distinctifs; 2 espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 392. — Le brunâtre et l'argenté, 393.

CENTROLOPHE. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 147.

CENTRONOTES (les). Genre 91 de poissons osseux. Leurs caractères distinctifs; onze espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 395. — Le centronote pilote, 1^{re} espèce. Sa synonymie, 398. — Sa description, 399. — Le centronote acanthias, 2^e espèce, et le centronote glaycos, 403. — Le centronote argenté, le centronote ovale et le centronote lyzan, 4^e, 5^e et 6^e espèces, 405. — Le crevalle, laliche ou le centronote carolinin, le centronote gardenien et le centronote vadigo, 7^e, 8^e et 9^e espèces, 408. — L'éperon, le nègre, ou le centronote éperon et le centronote nègre, 10^e et 11^e espèces, 411.

CENTROPODES (les). Genre 89 des poissons osseux. Leurs caractères distinctifs. *Hist. des Poissons*, VIII,

389 — L'abou-tabak ou le centropode rhomboïdal, 390.

CENTROPOMES (les). Genre 114 des poissons. Une dentelure à une ou plusieurs pièces de chaque opercule ; point d'aiguillon à ces pièces ; un seul barbillon, ou point de barbillon aux mâchoires ; deux nageoires dorsales. 1^{er} Sous-genre : la nageoire de la queue fourchue ou en croissant. 1^{re} espèce, le centropome sandat. *Hist. des Poissons*, X, 259. — Le centropome hober, 260, 278. — Le safga, *idem.* — L'alburne, *idem.* — Le lophar, 260, 279. — L'arabique, 261, 280. — Celui rayé, 261, 281. — Le loup, 261, 282. Les onze rayons, 262 et 286. — Le plumier, 262, 286. — Le muilet, 263, 287. — L'ambasse, 263, 289. — Celui de roche, 264, 291. — Le macrodon, *idem.* — Celui doré, 265, 292. — Celui rouge, *idem.* — 2^e sous-genre, la nageoire de la queue rectiligne, ou arrondie et non-échancrée. — Le nilotique, 265, 295. — Celui œillé, 266, 296. — Celui fascé, 266, 298. — Celui perchot, *idem.* — Celui six raies, 266, 299. — Supplément à leur tableau générique, 2^e sous-genre. La nageoire de la queue rectiligne ou arrondie et sans échancrure. 1^{re} espèce, le centropome six raies. XIII, 297, 298.

CENTROTES (les). Genre 298 d'insectes de la famille des cicadaires. *Hist. des Insectes*, XII, 336. — Trois espèces, 337.

CÉPHALACANTHES (les). Genre 93 des poissons osseux. Leurs caractères distinctifs. *Hist. des Poissons*, VIII, 417. — Le céphalachante spinarelle, 418.

CÉPHALANTE (le) d'Amérique. *Hist. des Plantes*, dites *rubiacées*, XIV, 121. — Une espèce connue, 122.

CÉPHALE (le) 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *muges*. *Hist. des Poissons*, XII, 383, 7 espèces, 386. — Comment on les pêche ; 389. — 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *cyprins*, XIII, 81. — Sa description, 148.

CÉPHALOPHORE (la) glauque. Genre 93 des plantes composées, *Hist. des Plantes*, XII, 297. — Une espèce connue, 298.

CÉPHALOPODES. Mollusques ayant leurs pieds sur la tête. *Hist. des Mollusques*, I, 179. — 7^e genre, la spirule, iV, 9. — 8^e genre, les ammonites, 16. — 9^e genre, les planulites, 28. — 10^e genre, les turrilites, 30. — 11^e genre, les baculites, 33. — 12^e genre, l'orthocère, 36. — 13^e genre, les hippurites, 40. — 14^e genre, les bélemnites, 43. — 15^e genre, les nummulites, 49. — 16^e genre, les rotalites, 59.

CÉPHALOTES. Insectes particuliers. Il y en a trois espèces : le polyphème, le zoé, et le branchiopode. *Hist. des Insectes*, III, 19. — *Voy. ces mots*, t. IV, 281, 282, 288 et 289. — Espèce de cétagées, V, 187.

CÉPHÉLIDES (les). Genre 83 des plantes dites *rubiacees*. *Histoire des Plantes*, XIV, 110. — Espèces remarquables, la céphalide émétique et celle ipécacuanha, 112. — 15 espèces connues, 114.

CÉPHUS. Insecte du genre des tenthrédymes. *Ex. Sirex pygmæus*. *Hist. des Insectes*, III, 303. — Genre 331^e d'insectes de la famille des tenthrédymes, XIII, 141. — Quatre espèces, 143.

CÉPH, suillus. Genre 12 des champignons. *Hist. des Plantes*, III, 65.

CÉPOLES (les). Genre 53 des poissons; une nageoire de l'anus; plus d'un rayon à chaque nageoire thoracine; le corps et la queue très-allongés et comprimés en forme de lame; le ventre à-peu-près de la longueur de la tête; les écailles très-petites. 1^{er} Sous-genre : point de rayons simples ou aiguillons aux nageoires; deux espèces. *Hist. des Poissons*, VII, 177. — 2^e Sous-genre des rayons simples ou aiguillons aux nageoires, 178. — Le cépole *tænia*; sa synonymie et sa description, 180. — Le cépole serpentiforme, 184. — Le cépole trachyptère, 186.

CÉRAMBICINS. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 211. — Cérambicins proprement dits, 214; V, 257. — Famille 34 des insectes. Comment ils sont caractérisés, XI, 259. — Description de leurs différentes espèces, 260. — 1^{re} Sous-famille, les prioniens, 264. — Genre 213^e, les spondyles, *id.* — Genre 214, les priones, 295. — 2^e Sous-famille, les cérambicins

proprement dits, 267. — Genre 215, les lamies, 267. — Genre 216, les capricornes, 282. — Genre 217, les callidies, 286. — Genre 218, les molorques, 302. — Genre 219, les nécydales, 303.

CERASTE DE SIAM (le). Serpent décrit par Seba. *Hist. des Reptiles*, V, 114.

CERATINE. Insecte du genre des apiaires. Ex. *Hilæus albilabris*. *Hist. des Insectes*, III, 381. — Genre 418 d'insectes de la famille des apiaires, XIII, 379. — Celle à lèvre blanche, XIV, 50.

CERATOCARPE (la) des Sables. Genre 24 de la famille des plantes dites artoches. *Hist. des Plantes*, XI, 68.

CERATONIA. Voyez CAROUBIER.

CERATOPHYLLUM. Genre 3 des plantes naïades. Deux espèces. *Hist. des Plantes*, III, 226.

CERATOPOGONS. Genre 473 d'insectes de la famille des tipulaires. *Hist. des Insectes*, XIV, 292.

CERATOSANTE (le) tubéreux. Genre 13 des plantes appelées courges. *Hist. des Plantes*, XIV, 290. — Une espèce connue, 291.

CÉRATOSTÈME (le) du Pérou. Genre 1 des plantes campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 185. — Une espèce connue, 186.

CERBERA. Genre 23 des plantes dites *apocins*. *Hist. des Plantes*, XVI, 190. — Trois espèces, et leurs propriétés, 191.

CERCERIS (les). Genre 394 d'insectes de la famille des philauteurs. *Hist. des Insectes*, XIII, 315. — Trois espèces, 316.

CERCIFIS (les). Voy. SALSIFIS (les).

CERCIS. Voyez GAINIER.

CERCLE. Sa quadrature, XXI, 212, 219. — Ce que c'est qu'un cercle de géomètre, 213.

CERCODEA. Genre 3 des plantes dites *épilobes*. *Hist. des Plantes*, XVII, 37.

CERCOPIS. Espèce d'insecte. Ex. *Cercopis spumaria*. *Histoire des Insectes*, III, 260. — Genre 294 bis des insectes de la famille des cicadaïres, XII, 329. — 27 espèces, 330.

CÉRÉALES (les). Nom donné aux graminées qu'on cultive. *Hist. des Plantes*, VII, 91. — Manière de les cultiver, 92. — Leurs maladies, 96.

CERF (le). Variétés qu'il a subies, XXII, 337. — Sa synonymie, XXIV, 67. — Description de la chasse du cerf, 71. — Manière de connoître l'âge, le sexe et les allures du cerf, 72. — Tems convenable pour la chasse du cerf, 78. — Tems où il met bas, 79. — Changement qui arrive alors à sa tête, 80. — Tems du rut, et combats que se livrent alors les cerfs, 81. — Quand commence et à quel tems finit le rut, 84. — Tems de la portée des biches, 85. — Tems où le cerf est en état d'engendrer, 86. — L'effet de la génération, chez lui, dépend de la surabondance de nourriture, 88. — Production de son bois, 91. — Son accroissement, 97. — Il n'est, chez le cerf, qu'une partie accessoire et vraiment végétale, 101. — Comparaison entre le bois du cerf et les cornes ou défenses des autres animaux, 102. — Remarques de M. le marquis d'Amezaga sur le bois des cerfs, 106. — Remarques de M. le comte de Mellin sur ce sujet, 109. — Durée de la vie du cerf, 113. — Accroissement de sa tête, 114. — Celui de sa taille, 115. — Cerf d'Ecosse, 116. — Des Ardennes, 117. — Discussion relative à celui qu'ont décrit Aristote et Plin^e, 119. — Cerfs du Danemarck, 122. — Si on peut rendre domestiques les cerfs de nos bois, 124. — Le cerf cochon, 125. — Pelage du cerf, 126. — Ses yeux, 138. — Ses qualités morales et physiques 129. — Les cerfs sont généralement répandus par-tout, 138. — Leur bois, 136 (note). — Le cerf d'Amérique, 141. — Méchanceté que contracte le cerf enfermé, 148. — Quatre espèces de cerfs de l'Amérique méridionale, qui portent indistinctement le nom de biches, 177. — Cerf du Gange. *Voyez L'AXIS*.

CERFEUIL. *Chærophyllum*. Genre 11 des plantes ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 268. — Sept espèces, et leurs propriétés, 269.

CERF-VOLANT (le), *lucanus cervus* de Linnæus.

Description de sa lèvre inférieure. *Hist. des Insectes*, II, 113.

CÉRIE, *ceria*. Insecte du genre des papillons syrphies; ex. *Ceria clavicornis*. *Hist. des Insectes*, III, 453. — Genre 519 d'insectes de la famille des syrphies, XIV, 356.

CERINTHE. Voy. MÉLINET.

CERISIER, *prunus cerasus*. Genre 4 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 142. — 7 espèces, 145. — Propriétés, 147.

CÉRITE. Genre 103 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 106. — Son caractère, 107. Son animal constructeur, 109. — 12 espèces, 112.

CEROCOME. Insecte du genre des cantharides; ex. *Cerocoma schefferi*. *Hist. des Insectes*, III, 186. — 166^e genre des insectes, 2^e espèce de la 25^e famille, les cantharides. X, 373. — 4 espèces, 375.

CÉROPALÈS. Insectes du genre des melliniores; ex. *Mellinus hicnotus*. *Hist. des Insectes*, III, 339. — Genre 379 des insectes de la famille des pompiliens, XIII, 283. — 3 espèces, *idem*.

CEROPEGIA. Genre 9 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 173.

CÉROPLATE. Insecte, espèce de papillon; ex. *Keratoplatus tipuloides*. *Hist. des Insectes*, III, 425. — Genre 469 d'insectes de la famille des tipulaires, XIV, 280, 290.

CEROSTOME. Espèce de papillon; ex. *Ypsolophus dorsatus*. *Histoire des Insectes*, III, 416. — Genre 450 d'insectes de la famille des rouleuses. *Hist. des Insectes*, XIV, 233, 247.

CERQUE. Insectes du genre des nitidules; ex. *dermestes pedicularius*. *Hist. des Insectes*, III, 134. — Genre 93 d'insectes, 6^e espèce de la 12^e famille, les nitidulaires, X, 44. — Le cerque pédiculaire, 45.

CERTITUDE. Comment on peut l'acquérir, XXI,

106, III. — Certitude morale et physique, 113. — Sur celle-ci, 120.

CERVEAU. Description du cerveau de l'homme, XXI, 92. — Son action chez les animaux et chez l'homme, 250. — Ses propriétés comme sens intérieur, 268. — Le cerveau n'est nullement le siège du sentiment, XXIV, 253 et suiv. — Réponses à différentes questions qui lui sont relatives, 258. — Sur celui des poissons. *Hist. des Poissons*, I, 125. — Observations des anatomistes sur le rapport du poids du cerveau à celui du corps chez l'homme et chez quelques animaux. *Histoire des Cétacées*, 374.

CERVELLE (la). XXIV, 259.

CERYLON. Insecte du genre des xylophages; ex. *Lyc-tus terebrans*. *Hist. des Insectes*, III, 205. — Insectes de la 31^e famille, les bosrichins. Leurs larves, XI, 222. — Genre 200, leur description, 228. — 11 espèces, 229.

CESULIERS (les). Genre 262 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 159. — 2 espèces connues, 160.

CÉTACÉES (les). Dans l'enfance des peuples, et avant que le pêcheur européen les ait relancés dans les mers qu'ils habitoient, ces animaux y régnoient en paix, et n'étoient pas obligés de fuir au loin, et de transporter avec eux tous les êtres parasites attachés sur leur vaste corps. *Hist. des Mollusques*, I, 315. — Familles analogues de quadrupèdes vivipares, de cétacées et d'oiseaux, LXIV, 133. — 1^{re} division, 134. — 2^e division, 142 — Vues générales sur ces poissons. *Hist. des Cétacées*, 5. — Durée de leur vie comparée à celle de la vie de l'homme, 9. — Association des mâles, des femelles et des petits, 12. — Force de leur odorat, 14. — Leur vue et leur toucher, 15. — L'ouïe, 16. — Réunion de ces sens, 18. — Leurs dimensions, 19. — Leur voix, 21. — Composition de cet organe, 22. — Leur queue et leurs extrémités tant antérieures que postérieures, 25. — Il n'est pas vrai que chez ces poissons le trou ovale reste ouvert, 28. — Guerre que leur font les hommes, 30. — Tableau des ordres, des genres et des

espèces de cétacées; 1^{er} ordre, point de dents; 1^{er} genre, les baleines, 31. — 1^{er} sous-genre, point de bosse sur le dos; 1^{ere} espèce, la baleine franche, 32. *Voy.* le mot **BALÉINE**. — 2^e genre, les baleinoptères. *Voy.* ce mot. — 2^e ordre, des dents. — 3^e genre, les narwals, 34. — 4^e genre, les anarnaks, 35. — 5^e genre, les cachalots, *idem.* — 6^e genre, les physales, 37. — 7^e genre, les physetères, *idem.* — 8^e genre, les delphinaptères, 38. — 9^e genre, les dauphins, 39. — 10^e genre, les hypéroodons, 42. — *Voy.* ces différens noms. Pourquoi tous les cétacées jetés sur le rivage par la tempête, meurent bientôt après, 381.

CÉTÉRAC, *asplenium*. Genre de fougères. *Hist. des Plantes*, III, 181. — 5 espèces, 182; 6^e genre, 206.

CÉTOINE. Insecte du genre des scarabéides. 1^o Cétoïnes proprement dites. *Hist. des Insectes*, III, 153. — 2^o Cétoïnes trichies, 154. — Genre 116 d'insectes; 10^e espèce de la 16^e famille, les scarabéides, X, 208. — Leur butin sur les fleurs, 210. — Leur description, 211. — Leurs larves, 212. — 12 espèces, 219.

CEYLAN (île de). Ses habitans, XX, 180.

CEYLANITE. Espèce de pierre, XVI, 284.

CEYX. Espèce de papillon. *Hist. des Insectes*, III, 462.

CHABASSIE. Espèce de pierre, XVI, 274.

CHABOT (le). 9^e espèce de la classe des poissons appelés *cottes*. Sa synonymie. *Hist. des Poissons*, VIII, 308. — Ses habitudes, 310. — Manière de le pêcher, 311. — Sa reproduction, 312. — Sa description, 314.

CHABRONTÈRE (le). 2^e espèce des poissons appelés *peristedions*. Sa description. *Hist. des Poissons*, IX, 46 et 53.

CHACAL (le). Chien sauvage ou loup, XXXIII, 167. — Ses ressemblances et différences avec l'adive, 168, 178. — Autre espèce de chacal, 173 (note). — C'est le même animal que le *thas* des anciens, 180. — Description d'un chacal-adive, 182. — Habitudes du chacal, 186. — Particularités de sa fourrure, 190 (note).

CHACAMEL (le). Espèce de faisan. Son cri singulier, XLII, 318.

CHAGRINE. 6^e espèce de raie. Voy. le mot RAIE.

CHAHAR. Oiseau de l'espèce des râles, LIX, 128.

CHALAZA. Ce que c'est. *Hist. des Plantes*, II, 114.

CHALCAS. Genre 4 des orangers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 254.

CHALCIDES (les). Genre 16 des reptiles *sauriens*. *Hist. des Reptiles*, IV, 359. — 1^{re} section, chalcides quadrupèdes. — Celui tétradactyle, 362. — Sa description, 363. — Celui tridactyles, 367. — Le chalcide quadrupède monodactyle, 370. — Ses dimensions, 371. — 2^e section, chalcides bipèdes, celui cannelé ou sub-pentadactyle, 372. — Tableau méthodique des chalcides, VIII, 379.

CHALCIS. Insecte du genre des cinipsères; ex. *Chalcis-sispes*. *Hist. des Insectes*, III, 511. — 348 genre d'insectes de la famille des cinipsères, XIII, 219. — 6 espèces, 220.

CHALCOÏDE (le). 36^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 85. — Sa description, 165, 168.

CHACHALACANELT (le). Espèce d'aigle, décrit par Fernandez. XXXVIII, 69.

CHACKAL. Animal très-commun en Arménie, en Turquie et ailleurs, mais absolument étranger au nouveau continent, XXV, 29. — Il a les mêmes habitudes que l'hyène, XXVII, 7. — Cependant il en diffère beaucoup, 14.

CHACRELAS. Espèce de nègre blanc, XXXV, 84.

CHADDEJR (le). Oiseau des l'espèce de guépriers, LIV, 266. — Sa description, 270.

CHADRI (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés *scares*. *Hist. des Poissons*, IX, 342 et 356.

CHALEFS (les), *elæagni*. 2^e ordre, famille 36 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones; leur description et leurs divisions. *Hist. des Plantes*, IV, 280. — Famille 38 des plantes. XI, 214. — § 1. Cinq étamines au moins; 1^{er} genre, les thésium, 216. — 2^e genre, le quinchamali du Chili, 217. — 3^e genre, les osyris, 220. — 4^e genre, le fussan colpoon, 221. — 5^e genre, les argoussiers, 223. — 6^e genre, les chalefs propre-

men

ment dits, 225. — Les chalefs à feuilles étroites, 226, 227. — 7^e genre, le nyssa aquatique, 228. — Huitième genre, les conocarpes, 231. — § 2. Dix étamines ordinaires. — 9^e genre, le bucida cornu, 233. — 10^e genre, les badamiers, 235. — 11^e genre, les chuncoa, 240. — 12^e genre, le palmier de la Guiane, 241. — 13^e genre, le taniboucier, 242.

CHALEUR (la). Elle dépend de la 2^e des forces primitives de la nature, IV, 187. — La chaleur existe sans lumière, 212, 226. — Différence bien essentielle entre l'une et l'autre, *idem*. — Chaleur recueillie sans aucune lumière, 247 (note). — La chaleur considérée en elle-même, et par les effets qu'elle produit seule, 214. — Sa comparaison avec la lumière, 215. — Son principe pourroit être l'attrition des corps, 216. — Diminution de la chaleur, à mesure que l'on monte dans les montagnes; la cause, 220. — Cas où la chaleur se fixe à demeure dans les corps, 228. — Chaleur intérieure de la terre, et ses effets, 235. — Différence entre le feu et la chaleur, 236. — Effets de la chaleur sur l'air, 239. — La chaleur seule ne peut communiquer le feu, que quand elle est assez forte pour être lumière, 276. — Effets de la chaleur du corps des animaux sur l'air, 293. — Effets de celle des végétaux, 294. — Expériences sur la chaleur de l'homme et des animaux, 298. — Elle dépend, chez l'un et chez l'autre, de la force et de l'étendue des poulmons, 299. — Expériences sur les progrès de la chaleur dans les corps, 377. — Suite de ces mêmes expériences dans les substances minérales, V, 5. — La loi du progrès de la chaleur, c'est-à-dire, de son entrée, et de sa sortie dans les corps, n'est point du tout proportionnelle à leur densité, 8. — Conclusions à tirer de ces expériences, 12. — Table des rapports relatifs à ces expériences, 142. — Imperfections de cette table, 150. — La platine est, de tous les métaux, le moins accessible à la chaleur, 169. — Expériences sur les effets de la chaleur obscure, c'est-à-dire, de celle privée de la lumière, de flamme et de feu libre, 261. — Résultats de la première expérience, 267. — 2^e expérience, 273. — 5^e

Tab. TOME I.

N

expérience, 281. — 4^e expérience, 287. — 5^e expérience, 293. — 6^e expérience, 296. — Expériences sur la lumière et sur la chaleur qu'elle peut produire, 301. — Ses effets peuvent bien n'être pas proportionnels à la quantité de lumière, 313. — La chaleur se communique de proche en proche, et se disperse, 316. — Miroirs particuliers à construire et à employer pour mesurer exactement la chaleur, 378. — La chaleur est une matière réelle qui doit avoir son poids comme toute autre matière, VI, 42. — Chaleur observée avec le thermomètre, VII, 332. — Il y a pour le froid, comme pour le chaud, quelques contrées sur la terre qui font exception à la règle générale, 341. — Pourquoi les hommes, les animaux et les plantes supportent-ils plus aisément le grand froid que la grande chaleur, 345. — Elle est la quatrième force, dont la nature se sert pour séparer tout ce que la première force universelle a réuni, 360. — Chaleur réelle de chaque climat, XIV, 8. — Effets de la trop grande chaleur sur les poissons. *Hist. des Poissons*, II, 41.

CHALUS (les). Dragues ou espèces de filets dont on se sert pour la pêche de la raie. *Hist. des Poissons*, III, 229.

CHAMÆROPS (les). Genre 18 des palmiers. *Hist. des Plantes*, VIII, 82. — Celui nain, 83. — 3 espèces connues, 85.

CHAMEAU (le). Callosités de ses genoux et sa dégénération, XXII, 333. — Son urine ne produit pas le sel ammoniac, X, 194. — Preuve que le chameau a existé en Sibérie, XXVIII, 240. — Le chameau et le dromadaire ne désignent pas deux espèces différentes, mais seulement deux races distinctes, XXIX, 5. — Différence du dromadaire et du chameau, 6, 54. — Chameau des Persans, diverses espèces, (note) 7, 11. — Lieux que le chameau habite, 12. — Son pays natal est l'Arabie, 13, 56. — Deux sortes de chameaux, les uns pour les pays chauds, et les autres pour les pays froids, 14. — Parti que les Arabes savent tirer du chameau, 17. — Son poil, *idem*. — Comment les Arabes instruisent et élèvent leurs chameaux,

30. — Le chameau se passe aisément de boire plusieurs jours de suite; c'est l'effet de sa conformation, 23, 28, 29, 33, 53. — Manière de le charger, 25. — Poids qu'un chameau peut porter, 26. — Comment on le fait voyager et comment on le nourrit, 27. — Le chameau est plus complètement et plus anciennement esclave que tous les autres animaux, 29. — Callosités de ses jambes, et d'où elles proviennent, 31. — Ses bosses, d'où elles proviennent, 32, 51. — Sa docilité, 34. — Le chant le réjouit et le fait marcher, 36 (note). — On le hongre, 37. — Son état dans le terns du rut, 38, 55, 64. — Son accouplement, 39, 40, 43. — Comment on traite les femelles, 41. — Ce que dit M. Niebuhr du chameau, dans sa description de l'Arabie, 45. — Le chameau est l'animal le plus utile à l'homme, le trésor de l'Asie, 46. — Il peut produire dans l'état même de domesticité, 16 (note), 45. — Addition à l'article du chameau, par M. Latreille, 50. — Chameaux et dromadaires du jardin des Plantes, 54. — Anatomie du chameau, extraite des écrits de Daubenton, 58. — Ce que dit Sonnini, dans son Voyage d'Égypte, du chameau et du dromadaire, 62. — Le premier a beaucoup d'instinct et d'intelligence, 63. — Il n'y a point, entre lui et les autres quadrupèdes, d'antipathie, 65.

CHAMEAUX, *camelinae*. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, III, 407.

CHAMECK (le) du Pérou. Espèce de singe, et le même que le coaita, de la famille des sapajous; sa description, XXXVI, 143 (note).

CHAMPAC. Voy. MICHÉLIA.

CHAMPIGNONS, *fungi*. Leur anatomie. *Histoire des Plantes*, II, 339. — Famille 1^{re} des plantes acotylédones-cryptogames. Leurs caractères, III, 35. — § 1, Champignons charnus. Genre 1, truffe, 36. — Genre 2, moisissure, *mucor*, 38. — Genre 3, vesse de loup, *lycoperdon*, 40. — Genre 4, clathre, 42. — § 2. Champignons charnus à chapiteaux orbiculaires, sessiles ou imposés sur un pédicule central. Genre 5, satyre, 44. — Genre 6, morylle, *phallus*, *idem*. Genre 7, bolet, — Genre 8, helvelle, ou monocelle, 45. — Genre 9,

pezize, *idem* — Genre 10, chanterelle, 51. — Genre 11, champignon proprement dit, *fungus*, *id.* — Espèces, 52. — Distinction des bons et des mauvais champignons, 63. — Genre 12, le cepe, *suillus*, 65. — Genre 13, hydne ou erinace, *idem*. — § 3. Champignons, la plupart tubéreux, à chapiteaux demi-orbiculaires, pédicules sur le côté ou sessiles. Genre 14, agaric, 67. — Genre 15, merulius, 70 — Genre 16, auriculaire, 71. — Genre 17, héricius, *idem*. — Genre 18, clavaire, 72. — Leurs différentes espèces, IV, 18.

CHAMOIS (le). Il affecte un pays et une situation particulière, XXV, 35. — Sa synonymie, XXX, 201. — Ses différences avec le bouquetin, 204. — Détails particuliers, 208 et suiv. — Ses rapports avec le bouc et le bélier, 218. — Lieux qu'il habite, 236. — Sa chasse, 237. — Ses habitudes, 240. — Sa peau, 242.

CHANGOUN (le). Espèce de vautour décrit par le Vaillant, XXXVIII, 158.

CHANI (le). 2^e espèce du genre des poissons appelés *holocentres*. *Hist. des Poissons*, X, 355, 386. — Sa description, 387.

CHANOS (les). Genre 197 des poissons. — Celui arabe. *Hist. des Poissons*, XII, 396.

CHANT (le) des oiseaux, XXXVII, 76. *Voyez VOIX*. — Celui du faucon chanteur, XXXIX, 153. — Chant particulier de quelques oiseaux. Ils n'en ont point d'inné, XLVII, 279 et 280.

CHANTERELLE. Genre 10 des champignons. *Hist. des Plantes*, III, 51.

CHANTEUR (le petit) de Cuba. Espèce de linotte, par Sonnini, XLVII, 331. — Sa description, 332.

CHANTRE (le). *Voy. POUILLLOT*.

CHANVRES (les). *Cannabis*. Genre 22 des plantes de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 133. — Le chanvre cultivé, 134. — Son usage, 135. — Le chanvre des Indes, 136. — Espèce de France et espèces connues, 137.

CHAPEAU ROUX (le). Espèce de pinson, par Sonnini, XLVIII, 56. — Pourquoi on l'appelle ainsi, 57.

CHAPELET (le). 17^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 116 et 192.

CHAPON. Ses habitudes, XLI, 169. — A quoi on peut le faire servir, 170.

CHAPTALIE (la) tomenteuse. Genre 101 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 349. — Une espèce connue, 351.

CHARACINS (les). Genre 177 des poissons. — 1^{re} espèce, le piabouque. *Hist. des Poissons*, XII, 258, 262. — Le denté, 258 et 266. — Le bossu, 259, 266. — Le mouche, 259, 266. — Le double mouche, *id.* — Le sans tache, 259, 267. — Le carpeau, 259, 267. — Le nilotique, 259, 268. — Le nepasch, 260, 268. — Le pulvérulent, *idem.* — L'anostome, 260, 270. — Le frédéric, 260, 271. — Celui à bandes, 260, 271. — Le melanure, 261, 271. — Le curimate, 261, 272. — L'odoé, *idem.*

CHARADRIOS (le). Oiseau décrit par Aristote, qu'il dit propre à guérir la jaunisse, LVIII, 362, 363.

CHARAIGNE OU CHARAPOT, *chara*. Genre 2 des plantes naïades; 3 espèces. *Hist. des Plantes*, III, 225.

CHARANSON (le). Dégâts que fait cet animal dans le blé. *Hist. des Insectes*, I, 162. — C'est le destructeur de nos noisettes, 166. — Charanson, insecte du genre des fracticornes; *ex. curculio, cordiger*. III, 200. — Genre 190 des charansonites, XI, 125. — 89 espèces, 126.

CHARANSONITES, *curculionites*. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 195. — Famille 28, V, 248; leur description et dégâts qu'ils occasionnent, XI, 49. — Huit à neuf cents espèces européennes; à quoi tient leur beauté, 50. — Leurs habitudes, 51. — C'est sous la forme de larves qu'ils font le plus de mal, 52. — Comment ils détruisent des monceaux de blé très-considérables, 54. — Degré de chaleur qu'il leur faut pour se réunir, 56. — Moyens propres à détruire les charansons ou la calendre de blé, 57. — Les odeurs les plus désagréables n'occasionnent sur eux aucun effet nuisible, 58. — Moyen aussi simple que peu dispendieux de les empêcher de nuire, 60. — Pourquoi on peut attribuer à la négligence les pertes que font éprouver ces insectes, 62. — Cela vient de la partie des édifices destinés à recevoir et à conserver les grains, 63. — Autres moyens de

détruire ces insectes, 65. — Description de la larve d'un autre calendre, 66. — Description du charanson des noisettes, 73. — De celui de l'oseille, 74. — De celui du plantain, de la campanule et du chardon, 75. — Espèces les plus saillantes de chacun des genres des charansons, 76. — 10. les recticornes. — Genre 181, les brentes, 78. — Genre 182, les cylas, 80. — Genre 183, les attetabes, 81. — Genre 184, les ramphes, 93. — Genre 185, les brachycères, 95. — 20. Les fracticornes, les calendres. Genre 186, 97. — Genre 187, les rhines, 101. — Genre 188, les cossones, 105. — Genre 189, les lixes, 106. — Genre 190, les charansons, *curculio*, 125. — Genre 191, les cioncs, 153. — Genre 192, les brachyrhines, 157. — Genre 193, les rhynchènes, 186. — Leur description, 188. — 16 espèces, 189 à 193.

CHARBON (mines de) et CHARBON DE TERRE. Poissons et végétaux qu'elles contiennent, III, 286; et IV, 104. — Rectification de ce que dit M. Gensanne sur le charbon de terre, 106. — Formation des couches de charbon, XVI, 107. — Temps de la formation des charbons de terre, III, 94, 97. — Les détrimens des substances végétales sont le premier fonds des mines de charbon, 301. — Nature, origine et formation du charbon de terre, IX, 5 et suiv. — Chaux formée avec le charbon seul, 8 (note). — cinq esp. de charbon de terre, établies par M. Gensanne, 9. — Matière qui fait le fonds du charbon de terre, 11. — Il s'y trouve beaucoup de matières ligneuses, 12. — Il contient du soufre et du bitume, 14. — Remarques de M. Morand sur le charbon de terre, 16. — C'est un véritable végétal que le bitume a conservé, 20. — Autres opinions sur son origine, 21. — Réfutation de l'opinion de M. Gensanne, 25. — Espèce de charbon appelé *flexcoal*, qu'on emploie à Bermingham, 28 (note). — Ce qui est nécessaire pour mieux entendre la génération primitive du charbon de terre, et développer sa composition, 30. — Houille et charbon de terre sont synonymes, 34. — L'essence du charbon est entièrement de matière végétale, 37. — Direction des veines de charbon, 39. — Conformité entre la configuration du fond de la mer, et celles des couches de charbon de terre, 42. — Sur l'inclinaison et l'épaisseur des veines de

charbon, 45, 71. — Énumération et tableau de toutes les couches ou veines de charbon de la montagne de Saint-Gilles, au pays de Liège, par Genneté, 49. — Sur la bonne et la mauvaise qualité des charbons, 68. — Deux espèces de charbon, 69. — Rapports entre les veines d'ardoises et celles de charbon, par leur formation et leur situation, 72. — Mines de charbon les plus profondes de l'Europe, 74. — Creins et failles des bancs de charbon, 75. — Soufre qui s'y rencontre, 77. — Matières étrangères qui s'y rencontrent, tels que l'alun, le sel marin, 78. — Dans quelques mines de charbon le toit et le sol sont de grès et de pierre calcaire, 79. — Observations sur les lits qui surmontent et accompagnent les veines de charbon, 80. — Métaux qui s'y trouvent, 81. — Quelles sont les mines de charbon les plus aisées à exploiter, 86. — Espèces de vapeurs qui s'en élèvent, 86, 90. — Moyen d'en prévenir les effets en purifiant l'air, 89. — Sur les embrasemens spontanés dans ces mines, 90. — Incommodité que causent les eaux dans les mines, 92. — Usage des pompes à feu, 94. — Qualités des eaux qui coulent dans les terres voisines de ces mines, 97. — Mines de charbon de terre en France, et nature du charbon qu'on y trouve, 98. — Noms différens qu'on a donnés à ces charbons, 100. — Qualités du charbon parfait, 101. — Position plus ou moins grande de la matière végétale dans les charbons de terre, 102. — Quels sont les meilleurs charbons de France, 104. — Notices recueillies sur quelques-unes des mines principales en exploitation, 105. — Remarques sur celles du Languedoc, 114. — Détails sur les charbons d'Angleterre, 122, et sur les fameuses mines de Newcastle, 126. — Sur celles du pays de Liège, 134. — Mines de charbon près d'Aix-la-Chapelle, 140. — En Allemagne, 142. — En Espagne, 147. — En Savoie, 148. — En Italie, 149. — Observations de M. Tozetti sur les bois fossiles, 149 (note.) — Mines en Suède, 154. — En Russie, 155. — En Sibérie, 156. — En Chine et au Japon, *idem*. — En Amérique, 158. — Usage du charbon de terre à Liège, 160. — Briquettes de Valenciennes, 163 (note.) — Comparaison

du feu de charbon et de celui de bois, 164. — Braise du charbon de terre, 165. — Manière de la faire, 166. — Manière de faire les cendres à Newcastle, 167. — Usage du charbon de terre dans le Lyonnais, 169. — Charbons d'Épinac, de Montcenis et de Rivedégié, 176. — Méthode des environs de Gaud, pour épurer le charbon, 177. — Expériences faites à Trianon, avec la méthode du sieur Ling, 178. — Observations de M. Faujas de Saint-Fond, sur le charbon de terre, 180. — 1^o. sur le charbon sec, 181. — 2^o. sur le charbon colant, 182. — Mines du premier, 185. — Mines du second, 186. — Causes des différences entre ces deux espèces de charbon, 188. — Empreintes de diverses sortes de plantes dans les couches des charbons de terre, 189. — Ces empreintes végétales démontrent la véritable origine des charbons de terre, 190. — Laves séparées des charbons, 192. — État des couches de terre et de charbon du puits de Caughleylane, en Angleterre, 193. — Ressemblance du charbon de terre avec quelques bitumes, 216 (note.)

CHARBONNIER (le) du Bugey, espèce de rossignol de muraille, LI, 190, 191.

Autre oiseau du même nom, décrit par M. de Bougainville, LXIV, 122.

CHARBONNIÈRE (la) ou grosse mésange, LII, 218. — Comment, étant en cage avec d'autres oiseaux, elle les tue, 221. — Lieux où elle se plaît; son chant, 222. — Ses habitudes, 223. — Son nid et sa ponte, 224. — Le capuchon de sa tête, 225. — Description de plusieurs de ses parties, 226. — La petite charbonnière, 229. — En quoi elle diffère de la grande, 231. — Lieux qu'elle habite, 232. — Description de quelques-unes de ses parties, 233. — Ses variétés; 1^o la nonnette cendrée, 234. — Lieux où elle se tient, 237. — 2^o celle à tête noire du Canada, 240. — 3^o La gorge blanche, 241.

CHARDON, 4^e espèce de raie. Voyez le mot RAIE.


CHARDON. Particularités du charançon qui détruit le chardon appelé *carduus spinosissimus*. *Hist. des Insectes*, XI, 75. — Pourquoi on a appelé cet insecte *antidontalgicus*, 76.

CHARDONS (les). *Carduus*. Genre 44 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 108. — Le chardon marie, 110 — 15 espèces de France, 111. — 36 espèces connues, 115. — Le chardon étoilé et le chardon bénit, 125. *Idem*. 134. — Le chardon hémorrhoidal, 161.

CHARDONNERET (le). Moyens d'appareiller avec lui des canaris, XLVII, 210. — Description de sa beauté, XLVIII, 133. — Son plumage, 137. — Différences entre le mâle et la femelle, 138. — Son chant, 139. — Structure de son nid, 141. — Ponte de la femelle, et preuve de son attachement pour ses petits, 142. — Amours de ces oiseaux entr'eux et avec d'autres, 144. — Métis de cette espèce, 148. — Habitudes et mœurs du chardonneret, 149. — Sa docilité, 150. — Manière de l'élever, 151. — Temps du rassemblement de ces oiseaux, et manière de les prendre, 155. — Leurs maladies, sur-tout l'épilepsie, et quelle en est la cause, 155. — Longueur totale du chardonneret, 156. — Ses variétés, 157. — Le chardonneret à poitrine jaune, et celui à sourcils et front blanc, 158. — Le chardonneret à tête rayée de rouge et de jaune, 159. — Le chardonneret à capuchon noir, et celui blanchâtre, 160. — Le chardonneret blanc, 161. — Le chardonneret noir, 163. — Renseignemens sur deux chardonnerets de cette dernière espèce, 164. — Le chardonneret noir à tête orangée, 165. — Le chardonneret métis, 166. — Le chardonneret à quatre raies, 169. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au chardonneret; celui verd, ou le maracaxao, 171. — Le chardonneret jaune d'Amérique, 174. — Particularités, et mue de la femelle, 176. — Le chardonneret à face rouge, par Sonnini, 178. — Le chardonneret à tête rouge, par le même, 180. — Le chardonneret perroquet, par le même, 182. — Effets de l'électricité sur un chardonneret, 191. — Ses rapports avec le tarin, 192. — Leurs différences, 195.

CHARDON-ROLAND. Voy. PÉNICAUT.

CHARLATANS. Il en est, en Amérique, qui tirent un



parti fort avantageux de l'aristoloche anguicide pour duper le peuple. *Hist. des Plantes*, XI, 305.

CHARMES (les). *Carpinus*. Genre 9 de la famille des plantes amentacées. Trois espèces. *Hist. des Plantes*, X, 326. — Le charme commun, 327. — Quel est son usage, 328. — Le charme du Levant et celui houblon, 329. — Espèce de France et trois espèces connues, 330.

CHARMUTH (le) ou KARMOUTH. 1^{re} espèce du genre des poissons appelés macroptéronotes. *Hist. des Poissons*, XII, 33, 35. — Sa description, 36.

CHARNIÈRE. Terme particulier pour la description des coquilles valves. *Hist. des Mollusques*, VI, 141.

CHARPENTIER (le). Oiseau de Saint-Domingue, ainsi nommé parce qu'il charpente les arbres, LV, 235, (note), 282, 294.

CHARYBDE. Description de ce fameux courant, II, 262. Gouffre dont le célèbre plongeur Sicilien Pescocola a donné la description. *Hist. des Mollusques*, II, 327.

CHASSE (la). Son éloge, XXIV, 68. — Celle du cerf, 71. — Celle du lièvre, 219. — Différences entre la chassé et la pêche, *Hist. des poissons*, X, 1.

CHASSE-FIENTE (le). Espèce de vautour du Cap de Bonne-Espérance, décrit par le Vaillant, XXXVIII, 160, 165. — Détails sur ce vautour, par Kolbe, 163.

CHASSELAS. *Voy. VIGNES* (les).

CHASTETÉ (la). Poussée trop loin, elle devient funeste. Mémoire à ce sujet, XVIII, 315.

CHAT (le). Sa synonymie, XXIV, 5, (note). — Moralité du chat, 6. — Chaleur de la femelle, 7. — Ses portées, 8. — Manière dont elle transporte ses petits d'un lieu à un autre, 9 (note). — Vivacité et gentillesse des jeunes chats, *idem*. — Chats dressés à chasser, 10. — Conformation particulière de leurs yeux, 11. — Ce ne sont pas des animaux entièrement domestiques, 12. — Leur goût pour la plante appelée *herbe aux chats*, ou *cataire*, 13. — Leurs habitudes

physiques, 14. — Leur sommeil, 15. — Odeur qu'ils répandent, 17. — Le chat sauvage et le chat domestique ne font qu'une seule et même espèce, et en quoi ils diffèrent, 19. — Remarque de Sonnini à ce sujet, 20 (note.) — Le chat mannoul des tartares, *idem.* — Lieux où on a trouvé des chats sauvages, 22. — Description d'un chat sauvage, 23. — Chats de Perse, *idem.* — Chats chartreux, 25. — Chats d'Angora, *idem.* — Chats d'Espagne, 26. — Chats de Syrie, 27. — Chats des Antilles, 28. — Effets qui résultent, sur eux, de leur transport dans d'autres climats, 29. — Chats de la Chine, 30. — Variété observée dans ceux de notre climat, 31. — Addition à l'article du chat, par Sonnini, 36. — Superstition des Egyptiens pour les chats, *idem.* — Les chats, sont, en Egypte, plus doux et plus familiers que par-tout ailleurs. 39. — Attachement dont le chat est susceptible, 42. — On parvient à l'instruire, 43. — Les femelles se prêtent à nourrir de jeunes animaux d'une autre espèce, même leur ennemie, telle que le chien, 44. — Habitudes particulières du chat, 45. — Ses maladies, 46. — Sa castration, 47. — Pourquoi il tombe toujours sur ses pieds, 48. — Ses longues abstinences, 50. — Description de son extérieur, *idem.* — De son intérieur, 52. — Il n'y a point de chat mâle de trois couleurs, 53. — Utilité qu'on tire de sa peau, 54. — Chat-tigre de Cayenne, XXXIII, 154. — Chat-tigre de la Caroline, 159. — Chat sauvage de la Nouvelle-Espagne, 161. — Chat bizaam, 162.

CHAT (le pimelode). 2^e espèce du genre des poissons appelés *pimelodes*. *Hist. des Poissons*, XII, 43, 52.

CHATAIGNES (les). Quelles sont celles de France les plus estimées. *Hist. des Plantes*, X, 336. — Leur récolte, *idem.* — Leur dessiccation, 337. — Procédé de cette dessiccation, par Parmentier, 338. — Leur préparation, 343. — Leur cuisson, 347.

CHATAIGNIER (le). C'est sur sa ressemblance avec une espèce de chêne, qu'est fondée la fausse opinion que les charpentes de nos anciennes églises sont de bois de

châtaignier, tandis qu'elles ne sont que de chêne, VI, 439. — Genre 10 de la famille des plantes dites *amentacées*. Différence entre le châtaignier et le hêtre. *Hist. des Plantes*, X, 331. — Le châtaignier ordinaire, 332. — Sa culture, 333. — S'il existoit autre fois en France et en Angleterre des forêts de châtaigniers, 335. — Le châtaignier nain, espèce de France, et deux espèces connues, 350.

CHATEAULIN. Manière dont s'y fait la pêche du saumon. *Hist. des Poissons*, XII, 141. — Temps où cette pêche s'ouvre, 142.

CHAT-HUANT (le). Sa description, XL, 87. — A quoi on le reconnoît, 89. — Discussion sur le mot *strix*, pour signifier cette espèce de chouette, 90. — Ses variétés, 91. — Chat-huant de Cayenne, 141.

CHATS MARINS. Nom donné aux petites espèces de squales. Voy. ce mot et ses différentes espèces. *Hist. des Poissons*, IV.

CHAT RAUQUE OU CHAT CIVETTE. Sa description, XXVII, 41, 52 (note). — Chat musqué du Cap de Bonne-Espérance, 66.

CHATON (le) Cône, *amentum*. Ce que c'est dans les fleurs. *Hist. des Plantes*, II, 196.

CHAT-PARD (le). Animal d'Amérique, qui tient du chat et de la panthère, XXV, 8.

CHAULIODE. Insecte du genre des mégaloptères. Ex. *Hemrobis pectin*, *cornis*. *Hist. des Insectes*, III, 290. — Genre 315 d'insectes de la famille des mégaloptères, XIII, 43.

CHAUME (le). 3^e espèce de tige des plantes monocotylédones. Son organisation et son développement. *Hist. des Plantes*, I, 213.

CHAUMONT. Petite ville ruinée de l'ancien Vexin Français, dont le territoire et les collines élevées qui l'avoisinent sont composés de sables qui contiennent beaucoup de fragmens de nautilus, chargés à l'extérieur de vers marins. *Hist. des Mollusques*, IV, 146.

CHAUSSE-TRAPES (les). Celle étoilée, ou le chardon

étoilé. *Hist. des Plantes*, XII, 125. — Autres espèces, 132.

CHAUVE-SOURIS (la). Sa synonymie, XXV, 310. — Elle n'est qu'imparfaitement quadrupède, et encore plus imparfaitement oiseau, 312. — Ses habitudes, 316. — Sa description, *idem* (note). Ses espèces, 317. — La première, commune, 319. — La seconde, l'oreillard, 320. — La troisième, la noctule, 321. — La quatrième, la sérotine, 322. — La cinquième, la pipistrelle, *idem*. — La sixième, la barbastelle, 323. — La septième, le fer à cheval, 324. — Deux nouvelles espèces décrites par M. Pallas; la 1^{re}, céphalote, 325. la 2^e *vespertilio soricinus*, 331. — Table du nombre et de l'ordre des dents dans ces espèces de chauve-souris, 328. — Chauve-souris de la Guiane, 332. — Autre espèces, 334. — Autre espèce, 336. Caractère qui lui est particulier, 337. — Sur les chauve-souris qui sucent le sang des hommes et des animaux, XXVII, 115, 120, 121, 122. — Description des différentes espèces de chauve-souris, 144. — La chauve-souris fer de lance, XXXIII, 106. — Pourquoi ainsi nommé, 107.

CHAUVE (tête). C'est ainsi qu'on appelle les habitants de l'île de Micône, XVIII, 395.

CHAUX. Sur la chaux de marbre, VIII, 320. — Calcination de la chaux, et ses suites, 368, 372. — Sur la chaux fondue, 374. — Chaux faite avec le charbon à Alais, IX, 8. (note.) — Sur la chaux de mercure, XII, 49. — Sur la chaux, XVI, 201. — Chaux carbonatée, 216. — Chaux nitratée, chaux muriatée, chaux sulfatée, 222, 223. Chaux fluatée, 225.

CHAVARIA (le) Oiseau de l'Amérique, de l'espèce des jacanas, LIX, 227. — Pourquoi on l'a appelé *fidèle*, 228, 229. — Sa description, 230.

CHAYQUE (le). Espèce de couleuvre, décrite par Séba et Russel. *Hist. des Reptiles*, VII, 161.

CHEELA (le). Espèce d'oiseau de proie de l'Inde, XXXVIII, 17.

CHEILINES (les). Genre 105 des poissons: la lèvre supérieure extensible; les opercules des branchies dénués de piquans et de dentelures; une seule nageoire dorsale, très-séparée de celle de la queue, ou très-

éloignée de la nuque, composée de rayons terminés par un filament; de grandes écailles ou des appendices placées sur la base de la nageoire caudale, ou sur les côtés de la queue. — 2 espèces, le cheiline *scare* et le cheiline trilobé. *Hist. des Poissons*, IX, 305.

CHEILION. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Histoire des Poissons*, X, 147. — On appelle aussi de ce nom le 123^e genre des poissons; 2 espèces, celui doré et celui brun, XI, 84, 85.

CHEILODACTYLES (les). Genre 149 des poissons. — Celui Fascé. *Hist. des Poissons*, XI, 360 — Sa description, 361.

CHEILODIPTÈRES. Genre 106 des poissons: la lèvre supérieure extensible; point de dents incisives, ni molaires; les opercules des branchies dénués de piquans et de dentelures; deux nageoires dorsales. 1^{er} Sous-genre: la nageoire de la queue fourchue ou en croissant. — 1^{re} espèce, le cheilodiptère heptacanthé. — 2^e Espèce, le cheilodiptère chrysoptère. *Hist. des Poissons*, IX, 316, 320, 321. — 3^e espèce, le cheilodiptère rayé, et 4^e espèce, le cheilodiptère maurice, 317, 322, 323. — 2^e sous-genre: la nageoire de la queue rectiligne ou arrondie. — 5^e espèce, le cheilodiptère cyanoptère. — 6^e espèce, celui boops — 7^e espèce, celui acoupa, 318 — 8^e espèce, celui macrolépidote — 9^e espèce, le cheilodiptère tacheté. — 10^e espèce, le cheilodiptère aigle, 319. — Leur description, 325 et suiv. — Supplément à leur tableau générique. 2^e sous-genre, la nageoire de la queue rectiligne ou arrondie et sans échancrure. 11^e espèce, le cheilodiptère aigle. *Hist. des Poissons*, XIII, 292, 293.

CHEIRANTHUS. Voy. GIROFLÉE.

CHÉLIDOINE, ou herbe aux hirondelles: elle n'a pas la vertu qu'on lui attribue, de rendre la vue lorsque les yeux sont crevés, LV, 22. — Genre 5 des plantes papavéracées. Deux espèces, et leurs propriétés. *Hist. des Plantes*, XVIII, 14.

CHELODONTES. (les) Insectes qui ont des mandibules. *Histoire des Insectes*, V, 198. — Premier ordre de la 3^e sous-classe des insectes, les acères, familles dont ils sont formés, VII, 109. — Section 1^{re},

GÉNÉRALE.

207

famille 1^{re}. — Les scorpionides, 110. — Genre 1, les scorpions, 111. — Genre 2, les thélyphones, 130. — Genre 3, les phrynes, 133. — Genre 4, les pinces, 138. — Famille 2, les arachnides, 144. — Genre 5, les mygales, 149. — Genre 7, l'araignée, 170. — Famille 3, les phalangiens, 306. — Famille 4, les pycnogonides, 330. — Famille 5, les acaridies, 334.

CHELONAIRE. Insecte du genre des nécrophages. Ex. *Chelonarium atrum*. *Hist. des Insectes*, III, 119. — Genre 64 d'insectes, 5^e espèce de la 10^e famille des insectes, IX, 221. — Le porte-oreille, 222.

CHELONE ou Galane. Genre 1^{er} des plantes dites bignonées. *Hist. des Plantes*, XVI, 128.

CHELONIENS (les). 1^{er} ordre des reptiles. Voy. TORTUE. Tableau méthodique des chéloniens, VIII, 339.

CHELONOPHAGES (peuples), ou mangeurs de tortues, habitans près de l'Éthiopie, sur les bords de la mer Rouge. *Hist. des Reptiles*, II, 31.

CHÊNE. Expériences sur des chênes de 33, 46, 60, et 100 ans, pour reconnoître leur densité dans les différens âges, VI, 205. — Différences de leur force dans les mêmes âges, 211. — Avantage de la culture du chêne par rapport au bois, 408. — Deux espèces de chêne se trouvent dans les bois, 438, et VII, 10. — Expériences faites sur ces arbres, pour prouver qu'en général les arbres croissent plus du côté du midi que du côté du nord, 11. — Preuves que les chênes crus dans les terrains maigres, ont plus d'aubier que ceux crus dans les bons terrains, 27. — Genre 12 de la famille des plantes dites *amentacées*. Comment on distingue un chêne. *Hist. des Plantes*, X, 358. — 32 espèces environ, 359. — Leur culture, 360. — Comment on fait une forêt de chênes, 361. — Usages du chêne, 362. — Cas particulier qu'en faisoient les anciens, *idem* et 367. — 1^o. Chênes à feuilles découpées en lobes inégaux, obtus ou carrés et plus ou moins profonds. Le chêne pédonculé, 363. — Ses particularités, 364. — Le chêne rouvre ou rouvre, ou chêne commun, 367. — Celui à longues feuilles, et celui lacinié, 368. — Celui noirâtre et celui lanugineux, 369. — Celui à trochets, 370. —

Le chêne pyramidal, 370. — Le chêne grec et celui à lobes obtus ou gris, 371. — Le chêne à gros fruit, 372. — Le chêne lyré et le chêne noir, 373. — Le chêne quercitron, 376. — 20. Chênes à feuilles découpées plus ou moins profondément en lobes inégaux et pointus. Le chêne chevelu, 377. — Le chêne blanc, 379. — Le chêne rouge, 380. — Le chêne écarlate, 382. — Le chêne de Catesby, 383. Le chêne velouté, et celui de Banister, 384. — Le chêne trilobé, 385. — 30. Chênes à feuilles dentées ou crénelées. Celui velani, ou chêne à grosses cupules, *idem.* — Sa description, 386. — Le chêne à feuilles de châtaignier, 387. — Le chêne noir de galle, 390. — Le chêne nain et celui à feuilles rondes, 392. — Le chêne liège, 393. — Le chêne d'Espagne, 394. — Le chêne verd ou yeuse, 396. — Le chêne kermès et celui ballotte, 397. — 40. Chênes à feuilles entières. Celui saule, 399. — Celui à lattes, 401. — Le chêne laurier, 402. — espèces de France, *idem.* 42 espèces connues, 403.

CHENETTE, *dryas*, Genre 24 des plantes dite *rosacées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 126. — Trois espèces, 127.

CHENILLE rendue par le vomissement, et observations particulières sur cette chenille, XVIII, 65, 66. (note.) — Leur nourriture, et diverses particularités sur les chenilles. *Hist. des Insectes*, I, 143, 146, 147, 149, 151, 153, 157, 161, 163, 274, 291. — Raisins rongés par les chenilles, 162, 202, 385. — Travail des chenilles lorsque les œufs de la mère papillon sont éclos, 230. — Habitation des chenilles processionnaires, 251. — Quelques traits de leurs habitudes, par Bonnet, *id.* — Instructions relatives à leur éducation, 297. — Méthode pour les dessécher ou les conserver, 298. — Les chenilles sont les larves des insectes appelés lépidoptères ou papillons. *Hist. des Insectes*, XIV, 72. — Elles se changent en chrysalides, 73. — Leur description, 77. — Particularités qu'offrent celles des papillons machaon et flambé, 79. — (*Voyez* bombicines et bombyx). — Celles des lithosies et des noctuelles, 172. — Celle des phalènes, 210. — Celles des herminies, 214. — Celles
des

aglosses, 214. — celles des galeries, 216. — celles des botys, 219. — celles des pyrales, 232. — celles des teignes, 235. — Leurs fourreaux, 236. — *Voy. TEIGNE*. — celle des yponomes, 240. — celle des cécophores, 242. — celles des alucites, 243. — celles des ptérophores et des ornéodes, 256.

CHENILLES (les) arpeuteuses. Ruses qu'elles emploient pour se soustraire au danger qui les menace. *Hist. des Insectes*, I, 276.

CHENILLE (la) du bombyx, à queue fourchue. Ses moyens de défense dans sa queue. *Hist. des Insectes*, I, 257.

CHENILLE. Genre 73 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 362.

CHENILLE (la) du fenouil, ou celle du papillon machaon. Ses moyens particuliers de défense. *Hist. des Insectes*, I, 255. — Sa corne et son usage, 256.

CHENILLE (la fausse) de l'osier. Sa liqueur défensive. *Hist. des Insectes*, I, 259. — Sa position singulière, 260.

CHENILLE MINEUSE (la). Ses travaux pour son logement. *Hist. des Insectes*, I, 201.

CHENOÏÉE (la) diffuse. Genre 15 de la famille des plantes dites arroches. *Histoire des Plantes*, XI, 38. — Espèces connues, 39.

CHENOPODÉES. *Voyez* ARROCHES.

CHERIC (le). Oiseau de Madagascar; 2^e espèce de figuier, LII, 5.

CHERIWAY (le). Espèce d'aigle, décrit par Sonnini, XXXVIII, 74.

CHERLERIA. Genre 7 des plantes Caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 127.

CHETODIPTÈRES (les). Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 149. — Genre 131 des poissons; celui plumier, XI, 172, 173.

CHETODONOÏDE (le). Poisson de la classe des plectrothinques. Sa description. *Hist. des Poissons*, VIII, 152.

CHETODONS (les). Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 149. —

Tab. TOME I.

Q

Genre 129 des poissons, 1^{er} sous-genre. XI, 103, 119.
 — Leur description, 121. — Lieux où on les trouve, 123.
 — 1^{re} espèce, le chétodon bordé, 103, 124. — celui curacao, 105, 126. — celui maurice, 104, 126. — celui bengali, 104, 127. — celui faucheur, 104, 128. — celui rondelle, 105, 129. — celui sargoïde, 105, 130. — celui cornu, 105, 131. — celui tacheté, 106, 132. — celui tache-noire, 106, 133. — celui soufflet, 106, 133. — celui cannelé, 107, 134. — celui pentacanthé, 107, 135. — celui allongé, 107, 135. — celui couaga, 107, 137. — celui tétracanthé, 138. — Celui pointu, 108, 139. — celui queue blanche, 108, 141. — celui grande-écaille, 108, 142. — celui argus, 109, 143. — celui vagabond, 109, 143. — celui forgeron, *idem*. — celui chili, 110, 145. — celui à bandes, 110, 146. — celui cocher, 110, 147. — celui hadjan, 111, 147. — celui peint, 111, 148. — celui museau-allongé, 111, 150. — celui orbe, 112, 153. — celui zèbre, 112, 155. — celui bridé, 113, 156. — celui perpétilien, *idem*. — celui œillé, 114, 158. — celui huit bandes, *idem*. — celui collier, 115, 157. — celui tétra, 115, 160. — celui surate, 116, 162. — celui chinois, 116, 163. — celui klein, 116, 164. — celui bimaculé, 117, 164. — celui galline, 117, 164. — celui trois bandes, 117, 165.

CHÉTODONIDE (le). 68^e espèce du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 192, 254.

CHEVAL (le). Cheval qui a vécu 50 ans, XIX, 393.
 — Synonymie du cheval, XXII, 75. — Son port, *idem*. — Son esclavage, 77. — Beauté des mouvemens du cheval libre, 78. — Son naturel, 79. — Auteurs anciens et modernes qui ont parlé des chevaux sauvages, 81. — Comment on les chasse en Tartarie, 85. — Chevaux qui, étant égarés, deviennent sauvages, Exemple, 86. — Ce que c'est que le tarpan, 87. — Comparaison entre un poulain sauvage et un poulain domestique, 91 (note). — Le cheval n'étoit pas connu au nouveau monde, 93. — Moyens d'appivoiser les chevaux farouches, 95. — Les mœurs des chevaux, dépen-

dent de leur éducation, 97. — Manière de les élever, 98. — Attention à avoir, lorsqu'on sèvre les poulains, 100. — Sur la bouche du cheval, 103. — Ses allures, 105. — Son pas, 106, 111. — Le trot et le galop, 108. — L'amble, ce que c'est, 114. — L'entrepas et l'aubin, ou trains rompus, 117. — Proportions et élégance dans les parties du corps du cheval, *idem*. — Sa tête et son cou, 118. — Ses yeux, 121. — Manière de les examiner, 122 (note). — Comment on juge des perfections ou des imperfections d'un cheval, 122. — Comment on connoît son âge et ses dents, 125. — Chevaux beguts, 129. — Note de Sonnini sur les moyens d'éviter les supercheries à ce sujet, 130. — Exemple qui prouve que les connoisseurs les plus habiles sont dupés, 135 (note). — A quel âge le cheval peut engendrer, 130. — Choix des étalons, 136. — Qualités des jumens, 139. — Sur la ressemblance des poulains à leur père et à leur mère, 141. — Manière d'employer l'étalon; précautions, 144, 147. — Disposition des haras, 145. — Sur l'hippomane des jumens, 150, 164. — Sur l'accroissement des races relativement aux chevaux, 158. — Moyens à employer, 161. — Soins des jumens pleines, 163. — Durée de la vie du cheval, 166. — Son accroissement, *idem*. — Chevaux arabes et les barbes, 169. — Chevaux d'Espagne, 174. — Chevaux anglais, 177. — Course des chevaux en Angleterre, 178. — Détails à ce sujet, 172 (note). — Chevaux d'Italie, 180. — Chevaux napolitains, 183 (note). — Chevaux danois, 184. — Chevaux d'Allemagne, 185. — Chevaux de Hollande, 187. — Chevaux de France, *idem*. — Chevaux des îles de l'Archipel, 188. — Chevaux arabes et d'Egypte, 189. — Extrait des relations sur les chevaux arabes, 191, 230. — Leurs races, 196 (note). — Chevaux du Levant, 202. — Chevaux de Turquie, 203. — Chevaux de Perse, 204. — Manière dont on les soigne et on les attache, 205. — Chevaux des Indes, 209. — Chevaux chinois, 213. — Chevaux tartares, 215. — Chevaux d'Islande, 217. — Chevaux de Norwège, 218. — Chevaux de Nordlande, 219. — Chevaux des Kalmouks et des Kirguis, 220 (note). — Multiplication des chevaux, dans le nouveau continent,

où l'espèce n'existoit pas, lorsqu'on en a fait la découverte, 223. — Observations sur les chevaux qui vivent en société, 225. — Sur ceux de Finlande, 226. — Chevaux des anciens, 228. — Conclusions à tirer de tous les faits rapportés sur les différentes espèces de chevaux, 230. — Sur l'usage de les hongrer, 232. — Mue des chevaux, 233. — Leurs différens hennismens, 234. — Manière dont le cheval boit, et précautions à prendre à ce sujet, 238. — Causes de la morve, 239. — Addition à l'article *cheval*, par Sonnini, 242. — C'est au milieu des sociétés libres et vagabondes de chevaux errans dans les déserts de l'Afrique, et les landes septentrionales de l'Asie, qu'il faut chercher la souche de toutes les races de chevaux, le type de l'espèce, en un mot, le cheval de la nature, 243. — Chevaux sauvages de l'Amérique méridionale, 244. — Comment ils attirent les chevaux domestiques, 245. — Guerre qu'on leur fait, 246. — Leurs couleurs dominantes, 247. — Dans ce même pays la domesticité du cheval n'est elle-même qu'un état à demi sauvage. 248. — Comment on les dresse, 249. — Force et agilité des chevaux de ces contrées, 250. — Chevaux des plaines de Chili, 252. — Barbarie dont l'homme use envers le cheval, 254. — Il est l'objet, au contraire, de l'affection des Arabes et des autres peuples, 257. — Description abrégée du cheval; sa robe et ses poils, 259. — Description de sa tête, 266. — Description de ses dents et de son col, 267. — De son poitrail et de son dos, 268. — De ses jambes, 269. — De la tumeur appelée châtaigne, 271. — Des mamelles, 272. — De l'estomac, 273. — Ressource qu'offre sa dépouille, 276. — Il étoit inconnu aux Américains, XXV, 10.

CHEVAUX SAUVAGES du Cap de Bonne-Espérance, XXIX, 352 (note). — Exemples d'accouplement prolifique de la mule avec le cheval, 377. — Sur l'hippopotame ou le cheval marin, XXX, 38 (note).

CHEVAL MARIN MORSE, XXXIV, 171 (note). — Ce qu'en ont dit les anciens. *Hist. des Mollusques*, II, 292. — Exemple tiré du cheval, qui prouve que cet animal

s'accoutume à toute sorte de température. *Hist. des Poissons*, II, 25.

CHEVALIER. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Histoire des Poissons*, X, 148.

CHEVALIERS (les). Espèce d'oiseaux fort haut montés, de la nature des oiseaux de marais; six espèces, LVIII, 67. — Le chevalier commun, 1^{re} espèce, 69. — Lieux où on le trouve, 71. — Le chevalier aux pieds rouges, 2^e espèce, 73. — Ses variétés, par Sonnini, 78. — Le chevalier rayé, 3^e espèce, 79. — Le chevalier tacheté, décrit par Sonnini, 80 (note) — Le chevalier varié, 4^e espèce, 83. — Particularité sur un de ces oiseaux, par M. Baillon, 85 (note.) — Le chevalier blanc, 5^e espèce, 87. — Le chevalier verd, 6^e espèce, 89. — Le chevalier à demi-palmé, par Sonnini, 91. — Le chevalier blanc et noir, 93. — Le chevalier aux pieds jaunes, 94. — Le chevalier cendré à raies rouges, 96. — Le chevalier noir, 99. — Le chevalier brun, 100. Le chevalier cendré, 101. Le chevalier de Courlande, 102. Ces sept dernières espèces sont décrites par Sonnini.

CHEVALIERS, equites. Espèce de papillon: Ex. *Papilio priamus*. *Histoire des Insectes*, III, 388. — 1^{re} tribu des insectes appelés papillonides XIV, 81.

CHEVÈCHE. Voy. CHEUETTE.

CHEVEUX. Sur ceux des enfans nouveaux nés, XVIII, 288. — Détails sur ceux de l'homme, 394. — Leur arrangement selon les tems, 402. — Différentes manières de les arranger, XX, 217. — Cheveux changés en laine, 362 (note.) — Cheveux de l'homme, XXI, 89.

CHEVEUX de Florence. C'est une espèce de fils formés par les vaisseaux à soie, après qu'ils ont été séchés et vidés de leur mucosité, qui servent à la pêche à l'hameçon. *Hist. des Insectes*, XIV, 154.

CHÈVRE. Sa dégénération, XXII, 326. — Sa comparaison avec la brebis, XXIII, 92. — Ses bonnes qualités, 97. — Tems de sa chaleur, 101. — Sa nourriture, 102. — Sa fécondité, 103. — Elle se laisse teter par beaucoup d'animaux, 105. — Ses dents, son estomac et ses différentes espèces, 106. — Erreurs rec-

tiées sur les chèvres d'Angora, 107. — Addition à l'article de la chèvre, par Sonnini, 129. — C'est dans la chaumière du pauvre qu'on apprend à connoître son prix, 111. — Elle étoit inconnue en Amérique, XXV, 19. — Elle y a peu réussi, 22. — Ressemblances entre les moutons, les chèvres et les brebis, XXIX, 277. — Voyez BOUQUETIN CHAMOIS, XXX, 222. — La chèvre d'Angora, 223. — Chèvre d'Amboine ou chèvre du Levant, 225. — Chevre de Madagascar, 228. — Les chèvres sont très-communes en Norwege, 230. — De neuf ou dix especes, on doit n'en faire qu'une, 231. — Leur habitude de lécher les pierres, 233. — Elles sont sujettes au vertige, 234. — Nouvelles especes dans ce genre, 332. — Chevre particuliere, 341. — Sa description, 342. — La chevre bleue, XXXI, 53. — Animaux qui ont rapport aux gazelles et aux chèvres, 53. — La chevre de Congo, 173 (note).

CHEVREFEUILLES (les), *caprifolia*. 6^e ordre, famille 43 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes especes. *Hist. des Plantes*, IV, 403. — XIV, 128. § 1. Calice muni d'un second calice extérieur plus petit, ou de bractées; corolle monopétale, un style. — Genre 1, la linnée boréale, 129. — Une espece de France, et une connue, 130. — 2^e genre, les triostès, 131. — 3 especes connues, *idem*. — 3^e genre, les chevrefeuilles proprement dits, 132. — Espèces remarquables, le symphoricarpe et celui d'Acadie ou la dierville, 133. — Le chevrefeuille des haies ou le camerisier, 134. — Le chevrefeuille des jardins ou d'Italie, 135. — 7 espèces de France, 136. — 20 espèces connues, 138. — 4^e genre, le codonium en arbre, 140. — § 2. Calice muni d'un second calice extérieur ou de bractées; un style; corolle presq u'à plusieurs pétales. — Genre 5, les loranthès, 142. — 43 especes connues, 143. — Genre 6, l'hélixanthère parasite, 147. — Genre 7, l'haidie de la Cochinchine, 148. — Genre 8, les guis, 149. — Espèce remarquable, le gui commun, 150. — Une espece de France et 16 especes connues, 153. — § 3. Calice garni de bractées, style nud, trois stygmates; corolles monopétales.

— Genre 9, les viornes, 155. — Genre 10, les sureaux ou yèbles, 162. — § 4. Calice dépourvu de bractées, un style. Corolles polypétales, par l'effet de la profondeur des divisions qui, quoique réunies à la base, semblent autant de pétales distincts. — Genre 11, les cornouillers, 167. — Genre 12, les lieffres, 172. — § 5. Genres qui ont de l'affinité avec les chevrefoilles ou les palétuviers, rhizophoræ, 175. — Genre 13, les égicères, 177. — Genre 14, les rhizophores, 178. — Genre 15, le palétuvier des Indes, 181.

CHEVRETTE. Petit crustacé qu'on dit engendrer l'espèce de poisson appelé *la plie*. Réfutation de cette opinion, par M. Deslandes. *Hist. des Poissons*, XI, 316.

CHEVREUIL (le). Sa synonymie, XXIV, 156. — Sa comparaison avec le cerf, 157. — Ses ruses, 158. — En quoi il diffère du cerf et du daim, 159. — Sur la femelle appelée chevrette, 160. — Nombre des faons, 162. — Leur accroissement, 164. — Celui du chevreuil, 166. — Ses inclinations et ses mœurs, 169. — Sa chair, 171. — Le chevreuil d'Amérique, 172. — Deux espèces au Brésil, 173. — Chevreuil de l'Amérique septentrionale, 175. — Variétés de ceux de l'Amérique méridionale, 177. — 3^e race de chevreuil, 181. — Rapport du chevreuil avec le cerf et le daim, 183 (note). — Le chevreuil des Indes, 184. — Ses dimensions, 191. — Sa description, 193. — Espèce particulière, 192 (note). — Anecdote à ce sujet. Espèce de chevreuil désigné sous le nom *dsheren*, par M. Gmelin, XXX, 270. (note.)

CHEVROLLE, caprella. Insecte du genre des crurettines; ex. *Gammarus linearis*. *Hist. des Insectes*, III, 39. — 35^e genre des crustacés ou crabes, établi par M. Lamarck. Leurs habitudes, VI, 323. — Leur description, et la chevrolle linéaire, 324. — La chevrolle ventrue, 327.

CHEVROTAINS (les) ou petits cerfs de Guinée, confinés dans certaines provinces de l'Afrique et des Indes orientales, XXV, 56. — Pourquoi ils sont ainsi nommés, XXXI, 168. — 5 décrits par Seba, 169 (note). — Ce qu'en dit Kolbe, 173. — Différences des che-

vrotains, 175. — Leur description anatomique, 178. — Le chevrotain de Ceylan, 179. — Le chevrotain ou petite gazelle de Java, 180. — Pays que les chevrotains habitent, 188.

CHEYLETE. Insecte du genre des tiques; ex. *Acarus eruditus*. *Hist. des Insectes*, III, 67.

CHIACHIALACCA. Nom des poules sauvages du Mexique, XLIX, 292.

CHICHICTLI (le). Espèce de chouette du Mexique, XL, 180.

CHICORACÉES (les). 1^{re} espèce de plantes composées, ou famille 40 des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 297. — 1^{re} division, XI, 323. — § 1. Réceptacle des fleurs nu, noix sans aigrette. — Genre 1, le lampane, 324. — Genre 2, les rhagadiolles, espèce de France, 327. — § 2. Réceptacle nu, graine surmontée d'une aigrette à poils simples. Genre 3, les prenantes, 328. — Genre 4, les chondrilles, 334. — Genre 5, les laitues, 336. — Celle cultivée, 337. — Voyez LAITUE. — Genre 6, les laitrons, 347. — Genre 7, les épervières, 354. — Genre 8, les crépides, 377. — Genre 9, le drepania barbu, 387. — Genre 10, les hédipncides, 389. — Genre 11, l'arnoseride fluette, 392. — Genre 12, la zacinthe verruqueuse, 393. — Genre 13, les hyoserides, 394. — Genre 14, la krigie de Virginie, 397. — Genre 15, les pissenlits, 398.

CHICORÉES (les). Genre 30 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 45. — Espèce remarquable, la chicorée sauvage, 46. — Détails sur sa culture, 48. — La chicorée de jardin, ou l'endive, 50. — 3 espèces de France, 5 espèces connues, 52.

CHICQUERA (le). Petit faucon de Chaldenagor, XXXIX, 157. — Sa description, par Vieillot, 158.

CHIEN (le). Expériences faites sur sa semence, XVII, 256, 258, 260, 276. — Preuves de son attachement à l'homme, XXI, 338. — Sa dégénération, XXII, 329. — Preuves qu'il ne produit pas avec le loup et le renard, 366. — Sur le chien de berger, 369. — Union d'un chien avec une louve, 405. — Synonymie du chien,

XXIII, 163. — Exposé de ses qualités. Pour sentir de quelle importance cette espèce est dans l'ordre de la nature, il faut supposer un instant qu'elle n'a jamais existée, 167. — Son empire sur presque tous les animaux, et son courage dans la guerre qu'il leur fait, 168. — Il ne prend guères le change sur l'objet de sa poursuite, 170. — Les chiens sauvages, 171, 179, 239. — Le chien est le seul des animaux, dont la fidélité soit à l'épreuve, 172. — Il est aussi de tous celui dont la nature est le plus sujette aux variétés et aux altérations causées par les influences physiques, 173. — Difficulté, dans la nombreuse variété de ses races, de distinguer celle primitive, celle originaire, 174. — Circonstances qui concourent à cette difficulté, 175. — Chiens d'Amérique, l'alco et autres, 182. — Le chien des bois, 187. — Maladie à laquelle sont sujets les chiens de l'Amérique méridionale, 190 (note). — Leur haine contre les Espagnols et les mulâtres, 191 (note). — Leurs aboiemens, *idem*. — Différences entre les chiens des différens pays, 192. — Le chien de berger est celui qu'on doit regarder comme la souche et le modèle de l'espèce entière, et comme le vrai chien de la nature, 195. — Il se trouve dans presque tous les pays du monde, 197. — Les chiens d'Irlande, 200. — Le grand danois, le mâtin et le levrier, 202. — Le chien de Sibérie, 204, 213. — Le grand chien-loup, 205. — Sa description, 207. — Le chien courant, le braque, le basset, le barbet, et même l'épagneul, peuvent être regardés comme ne faisant tous qu'un même chien, 209. — Le chien turc, 212. — Chiens du Groenland, 215. — Chiens du Kamtschatka, 216. — Les nègres préfèrent la chair du chien à celle de tous les autres animaux, et la font rôtir, 218. — Le chien turc et gredin, 219. — Sa description, 220. — Sur deux chiens de Russie, et table des dimensions du mâle et de la femelle, amenés à Paris, de Pétersbourg, en 1785, 222, 224. Buffon a fait élever une louve de deux ou trois mois, avec un mâtin du même âge; ce qui en est résulté, 227. — Plusieurs chiennes, en chaleur, ayant été successivement enfermées avec un renard, n'ont pas été

couvertes , 229. — Conclusions à tirer de ces deux épreuves, 231. — L'adive ou chacal, quadrupède qui approche du chien. *Voy.* ce mot, 232. — Ce que dit Aristote du mélange entr'eux des chiens, des renards et des loups, 233. — Grand nombre de variétés dans l'espèce seule du chien, 236. — D'où dépend la finesse de son odorat, 239. — Chiens sauvages qui se trouvent dans les terres voisines du cap de Bonne-Espérance, 240. — Dans quel état le chien naît, 243. — Son accouplement, 244. — Fait d'une chienne qui, sans avoir été couverte, a eu du lait comme si elle étoit en gésine, 245. — Pourquoi dans l'accouplement, et même après, les chiens ne peuvent se séparer, 247. — Terns de la gestation des chiennes, 248. — Durée de la vie du chien, *idem.* — Preuve qu'il peut se passer pendant long-tems de nourriture, 249. — Pourquoi il paroît souffrir en rendant ses excréments, 250. — Table de l'ordre des chiens, 251. — Sur le chien de berger, *idem.* — Ce qui est résultat du transport des différentes espèces de chiens, 253. — Chiens métis, 255. — Chiens provenans d'une louve et d'un chien braque, 257. — Description du mâle, première génération, 262. — Description de la femelle, 1^{re} génération, 270. — Description du mâle, 2^e génération, 275. — Description de la femelle, deuxième génération, 280. — Résultats de ces quatre descriptions, 283. — Conclusions à tirer des faits rapportés, 286. — Naturel et habitudes de ces quatre animaux, 288. — Leur combat avec d'autres chiens, 292. — Description de la femelle, 3^e génération, 296. — Précautions qu'elle a prises pour mettre bas, 300. — Trois heures après leur naissance, elle a dévoré six de ses petits, 302. — Réflexions à ce sujet, 303. — Habitudes et naturel de la jeune femelle de la 3^e génération, 304. — Sa description, 307. — Du mâle, 4^e génération, 313. — De la femelle, 4^e génération, 315. — Histoire d'un chien-loup, par M. Leroi, 317. — Autres histoires de chiens-loups, 321. — 3^e exemple du produit d'un chien et d'une louve, 321. — 4^e exemple semblable, 329. — 5^e exemple, 331. — Addition à l'article du chien, par Son-

nini, 334. — Éloge de son intelligence et de son attachement, 335. — Faits curieux à ce sujet, 336. — Sur le chien des Alpes, 337. — Caractères distinctifs des chiens à l'extérieur, 338. — Caractères distinctifs à l'intérieur, 341. — Chienne monstre par défaut; sa description, 342. — Force digestive de l'estomac du chien, 344. — Sa voracité, 345. — Ses habitudes, 346. — Usage qu'on fait de sa peau et de ses excréments, 347. — Espèces de chiens propres à la chasse, 348. — Races de chiens courans, 350. — Chiens greffiers, 351. — Quelles sont les belles formes d'un chien courant, 352. — Grande ressemblance du chien et du loup, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, XXIV, 291. — Comparaison des habitudes de l'un et de l'autre, 292. — Leurs différences, 296. — Utilité des chiens pour la chasse du loup, 305. — Accouplement productif d'un renard et d'une chienne, 320 (note). Chasse des blaireaux avec les chiens, sur-tout les bassets, 336. — Espèces de chiens trouvés en Amérique, XXV, 24. — Ils ont réussi partout, 27. — Instinct et qualités du chien comparés à celles de l'éléphant, XXVIII, 90. — Sur le chien marin, XXXIV, 15 (note). Chiens sans queue, XLI, 194. — Détails sur le combat d'un chien avec un poulpe. *Hist. des Mollusques*, II, 124. — Description des écailles du chien marin ou chien de mer. *Hist. des Poissons*, II, 210. — Nom donné à tous les squales, particulièrement aux grandes espèces. Voy. le mot et ses différentes espèces. *Hist. des Poissons*, IV.

CHILI (le). Ses habitans, XX, 383.

CHILI (le). 21^e espèce de poissons appelés *sparcs*. *Hist. des Poissons*, IX, 380; et X, 72. — 22^e espèce du genre des poissons appelés *chétodons*, XI, 110, 145. — 24^e espèce de poissons appelés *pimelodes*, XII, 49, 72. — Poisson du genre des mugiloides, 394.

CHILOGNATHES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 44.; V, 197. — Ordre 1^{er} de la sous-classe des mille-pieds, VII, 61. — Leur division, 62. — Genre 1, les glomérus, 63. — Genre 2, les lules, 67. — Genre 3, les polydèmes, 77. — Genre 4, les polyx-

nes, 81. — Genre 5, les scutigères, 85. — Genre 6, les scolopendres, 90.

CHIMARRHIS (le), ou bois de rivière. Genre 62 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 59. — Une espèce connue, 60.

CHIMÈRES (les). Genre 7 des poissons cartilagineux. 1^{re} espèce, celle arctique ; sa nomenclature. *Hist. des Poissons*, IV, 307. — Pourquoi on l'a appelé le singe de la mer, 308. — Sa conformation, 309. — Rapports de deux espèces, l'arctique, l'antarctique, 310. — Description de la première, 311. — Mers où on la rencontre, 316. — Description de la seconde, et mers qu'elle habite, 318.

CHIMIE. La méthode chimique n'est pas toujours celle de la nature, IV, 248. — Sur sa théorie, 258. — Sur le feu considéré comme le seul instrument de cet art, 259. — Expérience chimique, contradiction entre MM. Pott et Darcet, sur la fonte des matières par le feu, 265 (note.) — D'où vient l'obscurité de la chimie, 285. — Justice à cet égard rendue à MM. Macquer, de Morveau et Baumé, 286.

CHIN ou GIU. Espèce de hibou décrit par Kramer, XL, 74.

CHINCHE (le). 3^e espèce de l'animal appelé *mouffette*, XXXIII, 248 (note.) — Ce qu'en a dit le père Feuillee, 249 (note.) — Particularités sur cet animal, 250 (note.)

CHINCILLA (le). Espèce de mulot du Chili, décrit par Sonnini, XXXII, 211.

CHINCOU (le). Espèce de vautour décrit par le Vailant, XXXVIII, 155.

CHINOIS (les). Leurs connoissances en astronomie, IV, 15. — Leur manière de travailler le cristal de roche, XII, 365 (note) — S'ils ont connu très-anciennement la boussole, XV, 25 (note) et 84. — Détails sur la foiblesse de leur navigation, 85. — Forme de leur boussole, 86. — Leur théorie sur la nature et les causes des propriétés de l'aimant, 91. — Note d'un de leurs empereurs à l'occasion de la boussole, 92. — Peinture des

Chinois, par J. Hugon, et par d'autres voyageurs, XX, 127.

CHINOISE (la raie). 37^e espèce. Voyez le mot RAIE.

CHINQUIS (le). Espèce de faisan ou de paon, XLII, 227. — Sa description, 228.

CHINTA-NAGOU (le). Variété de la vipère appelée *naja*. *Hist. des Reptiles*. VI, 71.

CHIOCOQUES (les). Genre 63 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 60. — 3 espèces connues, 61.

CHIONANTHES (les). Genre 6 des plantes dites jasminées. *Hist. des Plantes*, XV, 163. — 5 espèces connues, 165. — Ce que c'est que l'arbre de neige, 164.

CHIPEAU (le) ou le RIDENNE. Espèce de canard. Sa description par M. Baillon, LXII, 18. — Remarques relatives à sa nourriture, 19. — Lieux qu'il fréquente, 20.

CHIQUES (les). *Acarus*. Insectes très-nuisibles par leur piqure. *Histoire des Insectes*, I, 370. — Ils sont appelés *mites*, du genre des acaridies. VII, 390. — Autre espèce, 392.

CHIROCENTRE (le), 8^e espèce du genre des poissons appelés *ésoces*. *Hist. des Poissons*, XII, 286, 312.

CHIRONECTE (la lophie). Poisson. *Hist. des Poissons*, IV, 192. Voy. LOPHIE.

CHIRONIE. Genre 9 des plantes dites *gentianes*. *Hist. des Plantes*, XVI, 156. — Quatre espèces et leurs propriétés, 157.

CHIRONOMES (les). Genre 467 d'insectes de la famille des tipulaires. *Hist. des Insectes*, XIV, 289.

CHIROSCELIS (les). Genre 123 d'insectes, 1^{re} espèce de la 18^e famille, les pimeliaires, X, 261.

CHIRURGIEN. Nom qu'on a donné à l'oiseau appelé *jacana*, et pourquoi, LIX, 203. On appelle du même nom la première espèce du genre des poissons appelés *Acanthures*. *Hist. des Poissons*, XI, 224, 231.

CHITTUL. Nom que les Indiens du Bengale donnent

au reptile appelé l'*hydrophis* à bandes noires. Sa description. *Hist. des Reptiles*, VII, 383.

CHLAMYS. Insecte du genre des chryzomèles proprement dits. Ex. *Chlamys tuberosa*. *Hist. des Insectes*, III, 275. — Genre 227 des insectes de la famille des chrysomélides. *Hist. des Insectes*, XI, 361.

CHLOROPHANE. Espèce de pierre, XVI, 225.

CHLORE. Genre 5 des plantes dites *gentianes*. *Hist. des Plantes*, XVI, 154. — Quatre espèces, et leurs propriétés, *idem*.

CHLORION. Insecte du genre des spares. Ex. *Sphex lobata*. *Hist. des Insectes*, III, 333. — Genre 391 d'insectes de la famille des sphegides, XIII, 287, 294. — Son combat avec une kakelac, autre espèce d'insecte, 288.

CHLORIS ERITHACHORIDES. Oiseau de l'espèce des figuiers, décrit par le P. Feuillée, LII, 58.

CHLORIS (les). Genre 36 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 218. — cinq Espèces connues, 219.

CHLORITE (la). Espèce de pierre, XVI, 296.

CHLOROPTÈRE (le). 83^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Histoire des Poissons*, IX, 407; X, 133.

CHÆROPHYLLUS. Voy. CERFEUIL.

CHOCOPITLI (le). Oiseau de l'espèce des courlis, LXIV, 108.

CHOINS (les), *schœnus*. *Hist. des Plantes*, VII, 40. — 6 espèces de France, 41. — 38 espèces connues, *culmi cylindrici*, 42. — *Culmo triquetro*, 44.

CHOLEVE, *choleva*. Insecte du genre des nécrophages. Ex. *Catops sericea*. *Hist. des Insectes*, III, 121. — 71^e Genre d'insecte, 12^e espèce de la famille X; les nécrophages, IX, 249. — Leurs espèces, 250.

CHOMEL (le) épineux. Genre 58 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 52. — Une espèce connue, 53.

CHONDRILLES (les). Genre 4 des plantes dites chicoracées. *Hist. des Plantes*, XI, 334. — 2 espèces de France et 5 espèces connues, 335.

CHOQUARD (le) ou choucas des Alpes. *Voyez* ci-après les **CHOUCAS**.

CHOUCADOR (le). Espèce d'étourneau, par Sonnini, XLV, 92.

CHOUCALES (les). *Voy.* **CALLES**.

CHOUCAS (les). Oiseaux qui ont beaucoup de conformité avec les corneilles. Leur comparaison à cet égard, XLIV, 123. — Ce sont des oiseaux de passage. Les lieux qu'ils habitent sont, les vieux édifices, les anciennes tours, et celles d'architecture gothique de préférence, 127. — Les choucas de France, 129. — Autre espèce de chouca, 130. — Détails sur l'un et l'autre oiseau, par le Vaillant, 131 (note). Variétés des choucas, 132. — Le choquard ou choucas des Alpes, 137. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux choucas. Celui moustache, 142. — Remarques sur son extérieur, 143. — Le choucas chauve de l'île de Cayenne, 145. — Le choucas de la nouvelle Guinée, 147. — Le choucari du même endroit, 149. — Sa description, 150. — Le choucas de la mer du Sud, par Sonnini, 151. — Le choucas d'Owihée, par le même, 155. — Le colnud de Cayenne; sa description, 155. — Le balicase des Philippines, 157. — Le cicrin, 159.

CHORAS (le). Espèce de singe du genre des babouins, XXXV, 254. — Sa description, 255. — Ses habitudes, 257. — Remarques historiques de M. Daubenton sur cet animal, 258 (note).

CHORIEN. Membrane extérieure qui enveloppe le fœtus. Sa description, XVIII, 179.

CHOROK (le). Animal quadrupède du nord, qui a les formes de l'hermine; sa description par M. Pallas, XXXIII, 19.

CHOU, *brassica*. Genre 3 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 28. — 12 Espèces, 29. — Usage et propriétés, 30. — Le chou marin, *crambe*, genre 28 des mêmes plantes, 75. — Six espèces, et leurs propriétés, 76.

CHOUCOU (le). Espèce de chouette d'Afrique, XL, 194. — Lieux où on la trouve, 196.

CHOUCOUKOU (le), par Virey. Espèce de chouette

qui habite les rives fleuries de la rivière d'Orange, en Afrique, XL, 191. — Sa description, 192.

CHOUETTE (la). Genre 2 des oiseaux de proie nocturnes, et son caractère distinctif d'avec le hibou, XL, 10. — Cinq espèces de chouettes: la hulotte ou huette; le chat-huant, l'effraie ou fressaie, la chouette ou grande chevêche, et la chevêche ou petite chouette, 11. — Les oreilles et l'ouïe de ces oiseaux, 24 (note). — Recherches littéraires sur la chouette, 28. — La chouette ou la grande chevêche, 103. — Comment on la reconnoît, 104. — Comment on la distingue de la hulotte et du chat-huant, 105. — Sa demeure ordinaire, 107. — Lieux où elle se trouve, 108. Ses variétés, 109. — La chouette de Sologne, décrite par M. Salerne, 111. — Trois autres espèces de chouettes; celle sylvestre, 112. — Celle à ventre blanc et celle noctuelle, 115. — La petite chouette ou la chevêche, 115. — A quoi on la distingue, 116 (note). — Ressemblance de sa voix avec celle humaine; anecdote à ce sujet, 118 (note). — Ses habitudes, et lieux qu'elle habite, 119. — Caractères distinctifs des cinq espèces de chouettes, 121. — La chouette épervier, 128. — Sa description, 129. — La chouette des monts Ourals, 132. — Le harfang, 134. — Le chat-huant de Cayenne, 142. — La chouette ou grande chevêche du Canada, 143. — Celle de Saint-Domingue, 145. — Sa description, 146. — Oiseaux qui ont rapport aux chouettes, la chouette blanche à aigrettes, de la Guiane, 165. — La chouette de Coquimbo, 167. — La chouette caspienne, 169. — Sa description, 170. — Le wapacuthey, 171. — La chouette blanche; ses caractères, 175. — La chouette de Java, 175. — Sa description, 176. — La chouette de la nouvelle Zélande, 178. — Le cichictli et le tolchiquatili, 180. — La petite chevêche d'Up-lande, 183. — La chouette d'Acadie, 185. — La chevêchetté, 187. — La chouette de l'île de la Trinité, 189. — Le choucouhou, 191. — Le choucou, 194. — Le huhul, 198. — La chouette de Porto-Rico, 200. — La chouette nébuleuse, 202. — La chouette à masque noir, 205. — La chouette à collier, 207.

CHOUGOV;

CHOUGOV GALOU des Mogols. Espèce d'oie. Sa description, LXI, 190 (note.)

CHOU-PALMISTE (le). Ce que c'est. *Hist. des Plantes*, VIII, 48.

CHRIZITRIX (les) du Cap de Bonne-Espérance. Genre 12 des plantes dites *souchets*. *Hist. des Plantes*, VII, 81. — Espèce connue, 82.

CHROKIEL (le), ou grande caille de Pologne, XLIII, 99.

CHROME. Substance métallique, XVI, 188.

CHROMIS (la). 5^e espèce du genre des poissons appelés sciènes. *Hist. des Poissons*, X, 334, 340.

CHRYSALIDE (la) du sphinx du troène. Sa respiration. *Hist. des Insectes*, II, 25. — Nom sous lequel on désigne le changement des chenilles et des insectes lépidoptères, XIV, 73. — Celles des papillonides, 79.

CHRYSANTHÈMES (les). Genre 121 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 19. — Espèces remarquables; celui des prés, 20. — Celui des parterres, et celui caréné, 21. — 10 espèces de France, 23. — 29 espèces connues, 25.

CHRYSIDIDES (les). Insecte d'un genre particulier. *Hist. des Insectes*, III, 316; V, 299. — Famille 65 d'insectes, dont les larves sont inconnues, XIII, 233. Genre 358, les cleptes, 235. — Genre 359, les parnopès, 233, 236. — Genre 360, les chrysis, 234, 237. — Sept espèces, *idem*. — Genre 361, les hédychres, 239.

CHRYSIS. Insecte du genre des chrysidides. Ex. *Chrysis ignita*. *Hist. des Insectes*, III, 317. — Genre 360 d'insectes de la famille des chrysidides, XIII, 237. — Sept espèces, 238.

CHRYSOCOMES (les). Genre 92 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 294. — Une espèce de France et 19 espèces connues, 295.

CHRYSOLITE. Espèce de cristaux topazes, XII, 382. — Chrysolite des anciens, 384. — Chrysolite des volcans, XIV, 188 (note.) — Chrysolite des Français, XVI, 227.

CHRYSOMÉLANE (le). 90^e espèce du genre des pois.
Tab. TOME I. P

sons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 410; X, 140.

CHRYSEMÈLES (les). *Chrysomela* Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 222, 223; V, 259. — (les) insectes; à quoi ils doivent leur nom, leur description, XI, 332. — Genre 230 d'insectes, 375. — 54 espèces, 376, 391.

CHRYSEMÉLINES (les). Famille 36 des insectes; leur description. *Hist. des Insectes*, XI, 323. — 1^{re} section, les criocérides, 324. — 2^e section, les chrysemélines proprement dits, 329.

CHRYOPALE. Espèce de pierre, XVI, 280.

CHRYOPRACE. Espèce de pierre, XVI, 252.

CHRYOPTÈRE (le). 2^e espèce de poissons appelés *cheilodiptères*. *Hist. des Poissons*, IX, 316, 320. — On appelle aussi de ce nom la 42^e espèce des poissons appelés *tutjans*, X, 181, 232.

CHRYOPHILLUM. Voy. CAIMITIER.

CHRYOPLÉNIUM. Voy. DORINE.

CHRYOPS (les). Genre 498 d'insectes de la famille des taoniens. *Hist. des Insectes*, XIV, 324.

CHRYOSTROME (le). Espèce de poisson. *Hist. des Poissons*, X, 145. — Poissons du 50^e genre; celui fiatoloïde, XIII, 303, 304.

CHRYSTOPHORIANE. Genre 23 des plantes renouclacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 354. — Trois espèces, et leurs propriétés, 355.

CHRYSOTOSÉS (les). Poissons du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 154. — Genre 144 des poissons: celui lune, XI, 266, 267.

CHRYSOPAZE. Espèce de pierre, XVI, 252.

CHRYSUZUS (le), ou la Dorade de la mer du Sud. Poisson de la classe des coryphènes. *Hist. des Poissons*, VIII, 218. — Sa description, 219. — Sept traits principaux le font distinguer de l'hippurus, 223. — Ses habitudes, 224.

CHUB (le). 62^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 93. — Sa description, 212.

CHUNCOA (les). Genre 11 de la famille des plantes dites *chalefs*. *Hist. des Plantes*, XI, 240.

CHUNGAR (le) des Turcs, Kratzhot des Russes. Espèce de huron, LXIV, 110.

CHUQUIRAGA (le). Genre 78 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 228. — Une espèce connue, 229.

CHURGE (le), ou l'Outarde moyenne des Indes, XLI, 83. — En quoi elle diffère du pluvier, 84.

CIBOULE (la). Espèce d'ail. *Hist. des Plantes*, VIII, 390.

CICADAÏRES. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, III, 256; V, 272. — Insectes formant la 48^e famille. On les divise en deux familles, les cigales et les cicadelles, XII, 293.

CICADELLES. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, III, 257. — 2^e famille des insectes cicadaïres: elle est très-nombreuse en espèces, XII, 298. — Leurs larves, 299. — Leur description, 307.

CICCAS (les). Genre 4 des plantes dites *euphorbes*, *Hist. des Plantes*, IX, 347. — Espèces connues, *idem*.

CICER. Voyez POIS CHICHE.

CICINDELE. Insecte particulier. *Hist. des Insectes*, III, 77, 80. Genre 7 d'insectes de l'ordre premier des coléoptères, VIII, 194. — Leur description, 195. — Leurs larves, décrites par Geoffroy, 197. — Espèce première, la cicindèle chinoise, 205. — 2^o. celle six-mouchetée, *idem*. — 3^o. celle du Cap. — 4^o. celle purpurine, 206. — 5^o. celle hybride. — 7^o. celle sylvatique, 207. — 8^o. celle ondulée, 208. — 9^o. celle sinuée. — 10^o. celle champêtre, 209. — 11^o. celle némorale. — 12^o. celle allemande, 210.

CICINDELETTE. Insecte particulier. *Hist. des Insectes*, III, 77, 80; V, 206. — Famille 2 des insectes appelés coléoptères, VIII, 184. — Leur description, 185.

CIGOGNE (la), oiseau de rivage. Sa synonymie, LVI, 349. — Il y en a de deux espèces, 351. — Description, mœurs et habitudes de la cigogne blanche, 352. —

Ses voyages, 354. — Sa marche, 356. — Sa ponte, 358. — Rassemblement des cigognes pour leur départ, 360. — Lieux où elles se retirent, 362. — Leur année est composée de deux étés, et elles goûtent deux fois les plaisirs de la saison des amours, 365. — Lieux où on prétend qu'elles ne se trouvent pas, 365. — Elles s'appriivoisent aisément, 366. — Elles ne multiplient pas dans l'état de domesticité. Expérience à ce sujet, 370 (note). — Vertus morales qu'on leur attribue, *idem*. — Soins qu'elles ont de leurs petits, 372. — Soins qu'elles ont de leurs parens, ou trop foibles ou trop vieux, 373. — Culte et respect des Egyptiens pour ces oiseaux, 374. — Respect des anciens pour cet oiseau, 375. — La cigogne noire, 377. — Sa description, 378. — Elle est sauvage et solitaire, 379. — Lieux où on la trouve, 380. — Elle est moins répandue que la cigogne blanche, et moins nombreuse, 381. — Oiseaux étrangers qui ont rapport à la cigogne : le maguari, 382. — Le couricaca, 385. — Le jabiru, LVII, 5. — Le nondapoa, 14. — La tayaya, par Sonnini, 17. — La cigogne toute blanche, par le même, 18. — Le jabiru des Indes, par le même, 19.

CICUTA. Voyez CIGUE.

CICUTAIRE. Genre 14 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 272. — Trois espèces et leurs propriétés, 273.

CIGALE. Manière dont sont nourries les jeunes, celles que Linnée appelle *cicada spumaria*. *Hist. des Insectes*, I, 122. — Cigales vraies, III, 257. — Première famille des cicadaires; en quoi elles diffèrent des cicadelles, XII, 293. — Leur chant, et organe qui le produit, 294. — Leurs larves, 296. — Lieux où on les trouve, 298. — Les cigales vraies, 301. — Genre 286, 302. — Huit espèces, 303.

CIGUE (petite). Genre 15 des plantes dites *ombellifères*. *Hist. des Plantes*, XVI, 274. — Deux espèces, et leurs propriétés, 275. — Cigue grande, genre des mêmes plantes, 305.

CIERGE. Genre 2 des plantes dites *cactées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 10.

CILIER (le). 5e espèce du genre des poissons appelés holacanthès, *Hist. des Poissons*, XI, 202, 211.

CILS. Leur effet chez l'homme et chez les animaux, XVIII, 393.

CIMBEX Insecte particulier. Ex. *Tenthredo lutea*. *Hist. des Insectes*, III, 300. — Genre 325 d'insectes de la famille des tenthredines. Onze espèces, XIII, 119.

CIMBRE (le). 17e espèce de gade, poisson osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 379.

CIMENS naturels. Ce que c'est, et leur division, VIII, 79; XII, 300. — Quel est le premier, 301. — Quel est le second, 302. — Quel est le troisième, 303. — Quel est le quatrième, 305. — Quel est le cinquième, 306. — Quel est le sixième, 308. — Matières où se trouvent les différentes espèces de ciment, 309.

CIMICAIRE, *cimicifuga*. Genre 22 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 353.

CIMICIDES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 240; famille 1 des hemiptères, V, 266. — Famille 45 d'insectes, 1re sous-famille, XII, 235. — Les acanthies, 236. — La punaise des lits, 237. — Les nabis, 238.

CINI (le), ou serin verd de Provence, XLVII, 200. — Sa description, par M. Hebert, 201 (note) et 203.

CINIPS (les). Insectes ruseurs, qui se font la guerre. *Hist. des Insectes*, I, 170, et III, 312. — Insectes particuliers de la famille des cinipsères, XIII, 212. — Leur description, 213, 221. — Leurs larves, 214, 217. — Leurs œufs, 216. — Leur accouplement, 217. — Neuf espèces, 224.

CINIPSÈRES (les). Espèce d'insecte. Famille 5 et 63. *Hist. des Insectes*, V, 296. — Leurs caractères, XIII, 212. — Leurs variétés, 212. — Genre 347, les leucopies, 281. — Genre 348, les chalcis, 219. — Genre 349, les cinips, 221.

CINNA (le) en roseau. Genre 1er des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 102.

CIONE. Insecte du genre des fracticornes. Ex. *Cionus blattariæ*. *Histoire des Insectes*, III, 201. — Genre 191 d'insectes, XI, 153. — Celui de la scrophulaire,

154. — Celui du thapsus, celui du verbascum et celui de la blattaire, 155. — Celui du lythrum, 156.

CINABRE. Nom qu'on donne à la mine de mercure, XII, 17. — Ce n'est point un vrai minéral, 35. — Manière de faire le cinabre artificiel, 36 — Action du feu sur le cinabre dans des vaisseaux clos ou ouverts, 43. — Union du soufre avec le mercure dans le cinabre, 52.

CINCHONA. *Voy.* QUINQUINA. *Hist. des Plantes*, XIV, 17.

CINCLE (le). Oiseau de rivage, LVIII, 171. — Le cincle à collier roux, 174.

CINDERS (les). Nom qu'on donne à la formation des pelotes du charbon de terre, et manière de les faire à Newcastle, IX, 167.

CINÉRAIRES (les). Genre 106 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 385. — Huit espèces de France, 386. — 54 espèces connues, 389.

CIPEROÏDES (les). Plantes. Leur anatomie. *Hist. des Plantes*, II, 374.

CIPONIMA. Genre 8 des plantes dites plaqueminiers. *Hist. des Plantes*, XVI, 215.

CIPURA (le) des marais. Genre 8 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 118. — Une espèce connue, *idem*.

CIRCASSIE. Sur les femmes de ce pays, XX, 222.

CIRCÉE. Genre 6 des plantes dites épilobes. *Hist. des Plantes*, XVII, 38. — 2 espèces et leurs propriétés, *idem*.

CIRCON ou JARGON, et les circonites. Espèces de pierres, XVI, 243.

CIRCONCISION (la). Son histoire et son usage, XVII, 329 — Celle des filles, 331. — Détails de Sonnini à ce sujet, *idem*. (note). — La circoncision a pour objet la propreté, 394. — Circoncision des insulaires O-Taïtiens, XXI, 16. — Espèce particulière de circoncision, 22.

CIRCULATION DU SANG. Ce qu'elle est dans les quadrupèdes et les oiseaux, LIV, 381 (note). — Circula-

tion du sang chez les insectes. *Hist. des Insectes*, II 10.
— Circulation du sang chez les poissons. *Hist. des Poissons*, I, 96. — Extrait du mémoire de Duverney sur ce sujet. II, 159.

CIRIERS (les). *Myrica*. Genre 70 de la famille des plantes dites amentacées, 8 especes *Hist. des Plantes*, X, 309. — D'où leur vient le nom de *myrica*. Le cirier galé ou piment royal, 310. — Celui de Pensylvanie et celui de la Louisiane, 311. — Comment on tire leur cire, et ce qu'on en fait, 312. — Autres especes de cirier, 313. — Especes de France, et 8 especes connues, 314.

CIRON, *siro*. Insecte du genre des phalangiens; ex. *siro rubens*. *Hist. des Insectes*, III, 62. Genre 10 des insectes dits phalangiens, VII, 329.

CIRQUINCON (le) ou le tatou à dix-huit bandes, XXVII, 307.

CIRRHITES (les). Genre 148 des poissons; celui tacheté. *Hist. des Poissons*, XI, 357. — Sa description, 358.

CIS. Insecte du genre des xylophages; ex. *Anobium boleti*. *Histoire des Insectes*, III, 205. — Insecte de la 31^e famille, celle de bostrichins, XI, 223. — Genre 199, leur description, 227. — 2 especes, celui du bolet et celui nain, 228.

CISSAMPÉLOS. Genre 1 des plantes menispermées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 311.

CISSUS. Genre 2 des plantes vignes. *Hist. des Plantes*, XVIII, 238.

CISTELENIES Espece d'insectes. *Hist. des Insectes*, V, 246. — 27^e famille des crustacées et des insectes; leur description, XI, 5. — Genre 165, l'œdemere 6. — 20 especes 7. — Genre 176, la cistele 17. — Ce qui la distingue des œdémères, *idem*. — 11 especes, 19. — Genre 177, le rhinomacer, 22. — Sa description et ses deux especes, 23. — Genre 178, le rhinosime, 23. — 6 especes, 26.

CISTES (les). Douzieme ordre, famille 98 de la 4^e classe des plantes dicotylédones; leur description et

leurs différentes especes. *Hist. des Plantes*, V, 391. — Genres qui ont des rapports avec cette famille, 392. — Leur description, XVIII, 154. — Genre 1, le ciste, *idem* — 7 especes, 155. — Leurs propriétés, 156. — Genre 2, violette, 157. — Genre 3, piriquetta, 159. — Genre 4, piparea; et genre 5, tachibota, 160.

CITHAREXILUM. *Voy COTELETS.*

CITROUILLES IROQUOISES. *Hist. des Plantes*, XIV, 283. — Cette trompette, 280. —, 383.

CIVETTE (la). La vraie est un animal des pays méridionaux de l'ancien continent, XXV, 30. — Différences entre la civette et l'hyène, XXVII, 16. — Sa synonymie; les nomenclateurs n'ont pas fait de distinction entre la civette et le zibet, et les caractères qu'ils leurs attribuent sont communs à tous les deux, 34. — Ce sont cependant deux especes réellement différentes, 37. — Deux especes de civettes ou chats musqués, ou chats civettes, 41. — Sur la liqueur odorante de la civette, 42. — Si la civette est l'hyène des anciens, 43. — Climats où elle se trouve, 44. — Erreur de Bolivar à ce sujet, 45. — Elle ne s'est jamais trouvée dans le nouveau monde, qu'après y avoir été transportée, 49. — Quelle espèce de civette on doit préférer, 51. — Comment on recueille son parfum, 52. — Force de ce parfum, et son réservoir, 54. — Les civettes, quoiqu'un peu farouches, peuvent être aisément apprivoisées, 65. — Comment on emploie l'humour qu'on appelle en français civette, 57.

CIXIES (les). Genre 289 d'insectes de la famille des cicadaires. *Hist. des Insectes*, XII, 310. — 5 especes, 311.

CLAIRON. Genre 52 d'insectes. Leur description. *Hist. des Insectes*, IX, 150. — 3 especes, 153.

CLAIRONNES, *clerij*. Insectes particuliers; ex. *Trichodes apiarius*. *Hist. des Insectes*, III, 110, 111, 112. — V, 218. — Famille 7^e, IX, 139. — 1^o les tilles. Genre 49, 141. — 2^o les énoplies. Genre 50, 146. — 3^o les opiles. Genre 51, 148. — 4^o les clairons. Genre 52, 150. — 5^o les nocrobies. Genre 153, 155.

CLANDESTINES (les). 18^e genre des plantes dites rhinanthacées. *Hist. des Plantes*, XV, 88. — 2 espèces de France, 89. — 3 espèces connues, 90.

CLATHRE. Genre 4 des champignons. *Histoire des Plantes*, III, 42. — 4 espèces, 43.

CLAVAIRE. Genre 18 des champignons. *Hist. des plantes*, III, 72. — 3 espèces, *idem*. — Leur commune qualité, 74.

CLAVALIER, *zantoxylum*. Genre 29 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 201. — 2 espèces, et leurs propriétés, 202.

CLAVATULE. Genre des mollusques gastéropodes, établi, par M. de la Marck. *Hist. des Mollusques*, VI, 70.

CLAVIÈRE (le). 81^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 407. — X, 131.

CLAYTONIA. Genre 14 des plantes dites portulacées. *Hist. des Plantes*, XVI, 377. — 3 espèces, et leur culture, 378.

CLÉMATITE. Genre 1 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 318. — 6 espèces, et leurs propriétés, 319.

CLÉONIE (la) de Portugal. Genre 51 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 405. — Une espèce connue, *idem*.

CLÉOME. Voy. MOSAMBÉ.

CLEPTE, *cleptiases*. Insectes particuliers; ex. *Ichneumon semi-curvatus*. *Histoire des Insectes*, III, 315, 316, V, 298. — Genre 358 d'insectes de la famille des chrysides. XIII, 235. — 2 espèces, 236.

CLERODENDRUM. Voy. PERAGUS.

CLETHRA. Genre 6 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 236.

CLIBADE (la) de Surinam. Genre 108 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 252. — Une espèce connue, 253.

CLIFFORTIA. Genre 14 des plantes dites rosacées.

Hist. des Plantes, XVII, 107. — 3 espèces et leurs propriétés, 108.

CLIGNOT (le), ou traquet à lunettes. Oiseau des bords de la rivière de la Plata, II, 291. — Sa description et singularité de la membrane qui fait cercle autour de l'iris de son œil, 292.

CLIMAT. L'homme peut modifier les influences du climat qu'il habite, IV, 30, 162. — Climats sur la terre où le froid et le chaud font une exception à la règle générale, VII, 341. — Influence du climat dans les variétés de l'espèce humaine, XX, 240, 310. — Il est la cause première de la couleur des hommes, 454. — Ce qu'on doit entendre par climat, XXI, 29. — Son influence sur l'homme et sur les animaux, XXVI, 170. — Il influe autant sur le plumage des oiseaux, que sur le pelage des quadrupèdes, XLII, 148.

CLINOPODES (les). Genre 38 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 373. — Une espèce de France, et trois espèces connues, 374.

CLIOS (les). Genre 17 des mollusques pteropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 64. — Description de ces animaux à coquilles, 65. — Mers où on les trouve, 67. — 4 espèces, 68.

CLYPEACÈS, *asphidiota*. Insecte particulier. *Hist. des Insectes*, III, 14. — *Idem*. IV, 67.

CLITORIE. Genre 52 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 326. — 5 espèces et leurs propriétés, *idem*.

CLITORIS. Partie génitale de la femme ; son amputation dans quelques contrées de l'Orient, XVIII, 332 (note).

CLIVINE. Insecte du genre des melanchlènes ; ex. *Scarites arenarius*. *Hist. des Insectes*, III, 96. — insectes du genre des carabiques, VIII, 378. — Espèces, 1^o le clivine arénaire, 2^o celui thoracique, 3^o celui fauve, 4^o celui bossu, 379.

CLOPORTE (le) *armadille*. Situation qu'il prend dans le danger. *Hist. des Insectes*, I, 275. — Organisation intérieure des cloportes, II, 15. — Oniscus,

insecte du genre des cloportides; ex. *Oniscus asellus*, III, 43. — *Oniscus*, genre des insectes polygonates, V, 152. — Genre 6 des insectes; leur comparaison avec les autres genres de famille, VII, 33. — Leur description, 34. — Leur ponte, 35. — Leur usage en médecine, 36. — Leurs espèces établies par Cuvier, 37. — Observations sur les organes de la manducation, 39. — Leur queue, 41. — Espèces, 1^o cloporte ordinaire, 2^o Cloporte crénelé, 42.

CLOPORTIDES. Espèce d'insectes. *Hist. des Insectes*, V, 196. — Famille 2 des insectes. VII, 25.

CLOTHONIE. Genre 18 des reptiles ophidiens; leur description générale. *Hist. des Reptiles*, VII, 283. — La clothonie anguiforme, 285. — 2 autres espèces, 286. — Tableau méthodique des clothonies, VIII, 420.

CLUPANODONS (les). Genre 205 de poissons, celui cailleu-tassart, celui nasigue, celui pilchard. *Hist. des Poissons*, XIII, 61. — Celui chinois, celui africain et celui Jussieu, 62 et suiv.

CLUPÉES (les). Genre 203, la clupée hareng, 1^{re} espèce. *Hist. des Poissons*, XIII, 5. Voyez HARENG. — La clupée sardine. Voyez SARDINE. — La clupée alose. Voy. ce mot. — La clupée feinte, 6. — La clupée rousse, 7 et 44. — La clupée anchoi. Voy. ce mot. — La clupée athérinoïde, celle raie d'argent, celle apalike, 7. — Celle belame, celle dorab, celle malabar, celle tuberculeuse, 8, 9. — Celle chrysoptère, celle à bandes, celle macrocéphale, celle des Tropiques, 10, 50, 53 et suiv. — Note de M. Noël sur la clupée feinte, 42.

CLUPÉOÏDE (le). 20^e espèce des poissons appelés corégones. *Hist. des Poissons*, XII, 226, 256. — 37^e espèce du genre des poissons appelés cyprins, XIII, 86. — Sa description, 168.

CLUSIA. Genre 2 des plantes galties. *Hist. des Plantes*, XVIII, 269. — 4 espèces et leurs propriétés, 270.

CLUTELLES (les). Genre 9 des plantes dites euphorbes. *Hist. des Plantes*, IX, 361. — Espèce remarquable.

ble; la chutelle élégante, 362. — 12 espèces connues, 363.

CLUTIA PULCHERRA. Plante dioïque, qui a fourni à Linnæus le sujet de deux expériences curieuses sur la fécondation. *Hist. des Plantes*, II, 61.

CLYPEACUS. *Hist. des Insectes*, V, 185.

CLYPEOLA. Voy. JONC-THÉSPI.

CLYSTÈRE. Son invention attribuée à l'Ibis, LVIII, 190.

CLYTHRE. Insecte du genre des chrysomèles proprement dits. *Hist. des Insectes*, III, 225; ex. *Clythra longipes*. Genre 226 d'insectes de la famille des chrysomélinae, XI, 355. — 17 espèces, 356.

CNEORUM. Voy. CAMELÉE.

CNÉSTIS. Genre 27 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 199.

CNIQUETS (les.) Genre 43 des plantes composées. *Voy. leur Histoire*, XII, 92. — 21 espèces de France, 93. — 53 espèces connues, 100.

CNODALON. Insecte du genre des cossypheurs; ex. *cnodalon amethystinum*. *Hist. des Insectes*, III, 164. — 151^e genre d'insectes de la famille des diapériales. IX, 320.

COAITA (le). Espèce de singe de la famille des sapajous; ses différences d'avec l'ouarine, XXXI, 132. Sa synonymie, 136. — Sa domesticité, 137. — Variétés de son espèce, 142. — Description d'un chanek ou coaita des côtes du Pérou; adresse de ces sapajous, 145. — Ce qu'en dit Joseph d'Acosta, 146 (note). — Leurs caractères distinctifs, 147. — Critique de M. Vosmaer, et réponse de M. de Buffon, 148. — Autres détails, 151. — Le coaita est, de tous les singes bien connus, le seul qui n'ait que quatre doigts aux mains, 153 (note). — Celui que M. Delaborde indique sous le nom de *quouata*, 152. — Sa description anatomique, par Daubenton, 155. — Ce qu'en dit Stedman, 156 (note). — Ce qu'en dit le docteur Bancroftin, 159 (note).

COAK. Nom qu'on donne à la demi-combustion du charbon de terre, IX, 165. — Manière de le former, 166 (note). — Son usage en Angleterre, 172.

CÔASE (le). Animal de Virginie, 1^{re} espèce de ceux appelés *mouffettes*, à cause de l'odeur forte qu'ils répandent, XXXIII, 241. — Sa description, par Seba, qui l'appelle *ysquiepall*, 242.

COATI (le). Espèce d'animal qu'on appelle aussi *coatimondi*, XXVI, 141. — Ses variétés ou espèces, 142. — Ses différences avec le raton, autre animal, 143. — Ce n'est pas le même que le *blaireau-cochon*, 145. — Il est sujet à manger sa queue, ainsi que d'autres animaux qui ont le même goût, 146, 149. — Extrait d'un mémoire de Linnæus sur cet animal, 147 (note). — Ses habitudes, 149.

COBALT (le). Qualités de ce minéral métallique, XII, 219. — Son mélange avec d'autres métaux dans ses mines, 220. — Son régule, 221. — Ses minières, 222. — Indices qui les annoncent, 223. — Moyen de les essayer pour les reconnoître, 227, 230. — Moyen d'en extraire l'argent et l'or, 228. — Substances du cobalt, 232. — Alliage de son régule, 233. — Sa dissolution, 235. — Minières de cobalt en France et ailleurs, *idem*. — Mines de Saxe, 259. — La matière la plus difficile à séparer du cobalt, est le fer, 241. — Le cobalt fournit la composition de l'encre de sympathie, 242 (note). — Pourquoi on a appelé cobalt les mines dont l'arsenic fait la partie dominante, 226 (note). — Du cobalt et de ses différentes espèces, XVI, 179.

COBEL (le). Espèce de couleuvre. *Hist. des Reptiles*, VII, 121.

COBITES (les). Genre 150 des poissons. — 1^{re} espèce, le corbite loche. — 2^e, celui *tœnia*. — 3^e, celui trois barbillons. *Hist. des Poissons*, XI, 362.

CORRA de *capello*. Vipère à lunette du Bengale; expérience sur sa morsure; cure singulière. *Hist. des Reptiles*, V, 77, 93.

CORRA MONIS (le). Nom donné, à la côte de Coromandel, à plusieurs serpens. *Hist. des Reptiles*, VI, 11.

COCCINELLES (les). Insecte du genre des tridigités; ex. *Coccinella bipustulata* *Hist. des Insectes*, III, 237, 238. — Insecte de la 38^e famille, les tridigités, vulgairement nommées *bêtes-à-Dieu*. XII, 45. — Leur

description, 46. — Genre 245, 49. — Nomenclature de leurs espèces au nombre de quarante-trois, 51 à 55.

Cocco. Nom d'une terre qu'on trouve en Italie, dans les sources de pétrole, IX, 220 (note).

Coccocipsile (le). Genre 24 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 381. — 2 espèces connues, 382.

COCHENILLE, coccus. Espèce d'insecte; ex. *Coccus hesperidum*. *Histoire des Insectes*, III, 267. — espèce d'insectes de la famille des gallinsectes, XII, 356. — Un seul genre des cochenilles et des kermès, 357. — Cochenilles de la 1^{re} division, 358. — Cochenilles de la 2^e division, 359, 360. — Les cochenilles précieuses; celle du nopal ou du cactier, qui vient du Mexique, 360. — Plante sur laquelle on élève la cochenille fine, 361. — Sa culture, par les Indiens, *idem*. — Comment on la sème, et sa dessiccation, 362. — La cochenille sylvestre, 363. — La cochenille de l'orme, 366. — Celle du figuier, 367, 382. — Celle de l'olivier et de l'euphorbe, offrant dix faits singuliers, 368. — Celle du chêne, 370, 373. — Sa récolte, 371. — C'est avec elle qu'on fait le sirop de kermès, 372. — Manière de préparer la cochenille qu'on destine à la teinture, 373. — 30 espèces de cochenilles de la première famille; et 20 de la seconde, 374. — Cochenille coccus, genre 304, 382. — 18 espèces, *idem*. — Récolte de la cochenille, *Hist. des Plantes*, XVII, 13.

COCHER (le). 24^e espèce du genre des poissons appelés *chétodons*. *Hist. des Poissons*, XI, 110, 147.

COCHICAT (le). 4^e espèce des toucans, oiseaux de l'Amérique méridionale, LVI, 59.

COCHIN. Nom d'un chat de Sumatra, XXIV, 31. (note).

COCHINCHINOIS (les). Leur description, XX, 143.

COCHITOTOL (le). Femelle du promerops orange, oiseau du Mexique, LIV, 201.

COCHEVIS (le), ou grosse alouette huppée du cap de Bonne-Espérance, L, 368. — Description de sa crête, qui lui a donné son nom, 371. — Lieux où la rencontre, 372. — Chant du mâle, 373. — Nid et ponte de la

femelle, 375. — Manière d'élever les petits, 376. — Comment on les prend, 377 (note). — Description du cachevir, par Sonnini, 378 (note). — Cet oiseau peut apprendre plusieurs airs, 379. — Sa longueur totale, 380. — Oiseaux étrangers qui ont rapport à cet oiseau. La grisette ou le cochevis du Sénégal, LI, 8. — L'alouette rougeâtre, par Sonnini, oiseau des environs de Gibraltar, qui a rapport au cochevis, 11.

COCHON (le). Il est généralement répandu, IV, 34. — Le nôtre, celui de Siam et le sanglier, ne font qu'une seule et même espèce, XXIII, 113. — Description des différentes parties du cochon, 116. — Comment il est une espèce d'exception à deux règles générales de la nature, 118. — Induction à tirer de la singulière conformation du cochon, 120. — La graisse du cochon est différente de celle des autres animaux, 128. — Il perd une de ses premières dents, *idem*. — Remarques sur ses dents canines, 129. — Le cochon est, de tous les animaux quadrupèdes, le plus brut, et ses habitudes sont grossières, 131. — Ce qui le rend ladre, 132. — Comment on l'engraisse, 133. — Sa castration, 134. — Qualité du mâle pour propager l'espèce, 136. — Education des cochons domestiques, 139. — Leur gourmandise, 140. — Profits qu'on en tire, 144. — Il n'y en avoit pas dans le continent du nouveau monde, *idem*. — Les cochons de la Chine, 145. — Autres lieux où on en trouve, 146. — Poids énorme que le cochon pèse dans certains cas, 147. — Leur couleur et leur génération, 148. — Addition à l'article du cochon, par Sonnini, et remarques sur son extérieur, 149. — Manière de distinguer les traces du pas du sanglier de celles du cochon, 153. — Description de ses parties intérieures, 156. — Nuances et variétés des cochons, 157. — Cochons d'Italie, 158. — Cochons bandés en France, 159. — Fécondité de la truie, *idem*. — Les cochons n'ont pas tous la stupide grossièreté qu'on leur attribue, 160. — Services qu'ils rendent, 161. — Le cochon domestique, et autres, étoient inconnus en Amérique lors de sa découverte, XXV, 20. — Il y a beaucoup multiplié, 23.

COCHON de Guinée. Sa description, XXV, 24. — Détails particuliers sur ce cochon, XXVII, 108.

COCHON de Siam, XXIII, 113. — Sa description, 115. — La race de nos cochons d'Europe est celle des cochons de Siam ou de la Chine, 145.

COCHON de terre (le). XXVII, 245. — Sa description, par M. Allamand, 246. — Description, par M. Kolbe, 252. — Ses dimensions, 253.

COCHON d'Inde (le). D'où il est originaire, XXV, 226. — Description de celui de France, 227. — Il est d'un tempérament précoce et très-chaud, 228. — Ses habitudes, 229.

COCHON d'Italie, XXIII, 158. — Maladie qu'il prend du buffle, et ses différences à cet égard, XXIX, 190.

COCHON marin (le), par Sonnini. Espèce de phoque des parties méridionales de l'Amérique, décrit par Molina et par Sonnini, XXXIV, 156.

COCK (le). 89^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 142, 269.

COCHLEARIA. Genre 20 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVII, 60. — Ses usages, 61.

COCO DE MER (le), ou des Maldives. Fruit qui appartient au palmier appelé *lodoicea*. *Hist. des Plantes*, VIII, 79. — Fables à son sujet, 81.

COCONIÈRE (le) et MAGNANIÈRE. C'est ainsi qu'on appelle le local destiné à l'éducation des vers à soie; précautions à prendre pour l'établissement de ce bâtiment. *Hist. des Insectes*, XIV, 155. — Comment est composé l'atelier, 156. — Instrumens qui y sont nécessaires, 158. — Comment on fait élever les vers à soie, 164.

COCOTIERS (les). Genre 6 des palmiers. Leur description. *Hist. des Plantes*, VIII, 50. — Espèces remarquables, le cocotier des Indes, *nucifera*, 51. — A quoi on emploie ses différentes parties, 52. — De la coquille, de la noix et de sa liqueur, 55. — Le cocotier du Brésil, 55. — Celui à fruit amer, ou le palmiste amer; 4 espèces connues, 56.

COCOTZIN (le). Espèce de tourterelle d'Amérique, XLIII,

XLIII, 298. — Différens noms qu'on lui a donnés, 300.

COCQUAR (le), ou le faisan bâtard, **XLII**, 193.

COCOTRES (les). *Rhinanthus*. Genre 12 des plantes dites rhynanthacées. *Hist. des Plantes*, **XV**, 70. — 3 espèces de France, 72. — 10 espèces connues, 73.

CODONIUM (le) en arbre. Genre 4 des chevrefeuille. *Hist. des Plantes*, **XIV**, 140. — Une espèce connue, 141.

COENDOU (le). Espèce de porc-épic, **XXXI**, 266. — 2 espèces, 270, 274. — Sa différence avec le porc-épic, 271. — Ses piquans, 273. — Le coendou à longue queue, 276. — Sa description, 277. — Autre description, par M. Roume de Saint-Laurent, 279.

COENOMYX. Insecte du genre des papillons taoniens; ex. *Sicus ferruginea*. *Hist. des Insectes*, **III**, 449.

COESDOES. *Voy. CONDOMA*.

CŒUR. Sa description, **XXI**, 94. — Son action chez les animaux et chez l'homme, 251. — Cœur des insectes *Histoire des Insectes*, **II**, 10 et suivantes. — Observations de Duverney sur la structure du cœur des poissons, et principalement sur celui de la carpe. *Hist. des Poissons*, **II**, 246.

COFFRES (les). Poissons ainsi nommés par rapport à l'enveloppe solide dont ils sont recouverts. *Hist. des Poissons*, **V**, 10. — Observations de Lacépède sur leur conformation, 15. — Phrase caractéristique de M. Gouan à ce sujet, 18. — Ce qu'a dit Artedi sur le même sujet, 19. — Lieux où se trouvent les poissons coffres, 20. — Le coffre lisse, 21. — Pourquoi on l'a appelé triangulaire, 22. — Sa description, 23. — Réflexions sur ce poisson, 24. — Le coffre où l'ostracion maillé, 26. — Le guamaïacu, 28. — Le coffre pointillé; sa description, 30. — Le coffre tuberculé, 32. — Le coffre belonien, 34. — Le coffre à bec, ou l'ostracion museau-allongé, 36. — Le coffre à bec très-pointu, 38. — Le coffre à deux tubercules, 39. — Sa description, 40. — Le coffre tigré, 42. — Le coffre bossu, 46. — Le coffre à trois aiguillons; le coffre à perles; le coffre à deux piquans, 49. — L'ostracion trigone, 52. — Le

Tab. TOME I.

Q

coffre à quatre-piquans; le coffre lister, 54. — Le coffre taureau de mer; le coffre chameau; l'ostracion quadrangulaire et l'ostracion dromadaire.

COGTOILS (les). Poissons de l'espèce des scombres, et qui habitent la Méditerranée. *Hist. des Poissons*, VII, 370.

COIFFES JAUNES (les). Oiseaux de l'espèce des carouges de Cayenne, XLV, 224.

COIFFE NOIRE (la). 9^e espèce moyenne des oiseaux dits tangaras, XLVIII, 337.

COIGNASSIER, *cydonia*. 3^e genre des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 86. — 4 espèces et leurs propriétés, 87.

COLASPIS. Insecte du genre des chrysomeles proprement dites; ex. *Chrysomela surinamensis*. *Hist. des Insectes*, III, 227. — Genre 231^e d'insecte de la famille des chrysomélines, XI, 392.

COLCHIQUES (les). Genre 2 de la famille des plantes mérendères. *Hist. des Plantes*, VIII, 215. — Espèces remarquables, 19 le colchique d'automne, 216. — C'est un poison très-actif, 218. — 2^o Le colchique de montagne et celui varié ou panaché, 219. — 2 espèces de France et 3 espèces connues, 220.

COLDENIA. Genre 13 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 86.

COLENICUI (le). Espèce de caille, de poule de bois ou de perdrix, d'après différens naturalistes, XLIII, 123.

COLÉOPTÈRES. Insectes qui tirent leur nom de leurs ailes. *Hist. des Insectes*, I, 244. — Sur ceux appelés *taupins*, 249. Voyez aussi le 3^e Vol de la même histoire, 74; et le 5^e, 205. — 1^{er} ordre des insectes appelés *ptérodicères*, VIII, 118. — Leur description, 119. — Nom que leur donne le vulgaire, 121. — Leurs habitudes, 122. — Leurs organes de mouvement et de nutrition, 122, 123. — Leurs antennes, 125. — Les élytres ou ailes, 127. — Leurs pattes, *idem*. — Leurs métamorphoses, 129, 133. — Leurs parties génitales, et leur accouplement, 130. — Leurs œufs, 132. — Lieux où on les trouve, 138. — Usages économiques

et propriétés médicinales des coléoptères, donnés par Olivier, 139. — Leurs divisions d'après Geoffroy ; 1^{re}, étuis durs couvrant tout le ventre, 141. — 2^e, étuis durs ne couvrant qu'une partie du ventre, 143. — Ce qu'en disent d'autres auteurs, 144. — Tableau de ces insectes, par Cuvier et Dumeril, 146. — Famille 1^{re}, les hydrocanthares, 147. — Famille 2^e, les cicindélettes, 184. — Famille 3^e, les carabiques, 211. — Famille 4^e, les cébrionates, 380. — Coléoptères dont les tarses de devant et ceux du milieu ont cinq articles, et les postérieurs quatre, X, 257. — Coléoptères dont tous les tarses ont quatre articles, divisés en 1 hynchophores et en platyprosopes ; leur description, XI, 29. — Coléoptères dont tous les tarses ont trois articles, XII, 45. — Coléoptères dont tous les tarses ont deux articles, 79.

COLEUS (le) d'Amboine. Genre 40 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 375. — Une espèce connue, 376.

COLIAS (le). Poisson qu'on peut ranger dans la classe du maquereau. *Hist. des Poissons*, VII, 369.

COLIBRI (le). Rapports et différences des colibris avec les grimpeaux, LII, 366. — Oiseau du Brésil ; sa beauté, LIII, 251. — Sa comparaison avec l'oiseau-mouche, 252. — Son attachement pour ses petits ; anecdote à ce sujet, 253. — Son chant et son cri, 255. — Lieux qu'il habite, 256. — Il n'y en a ni en Afrique, ni dans aucune autre partie de l'ancien continent, 257. — Le colibri topaze, 1^{re} espèce, 258. — Sa description, 259. — Lieux où il se tient, 261. — Le grenat, 2^e espèce, 262. — Variété, 263. — Le brin-blanc, 3^e espèce, 264. — Le zitzil ou colibri piqueté, 4^e espèce, 266. — Le brin-bleu, 5^e espèce, 268. — Erreurs de Séba à ce sujet, 269. — Le colibri verd et noir, 6^e espèce, 271. — Le colibri huppé, 7^e espèce, 273. — Le colibri à queue violette, 8^e espèce, 275. — Le colibri à cravate verte, 9^e espèce, 277. — Le colibri à gorge carmin, 10^e espèce, 279. — Le colibri violet, 11^e espèce, 281. — Le hausse-col verd, 12^e espèce, 283. — Le collier rouge, 13^e espèce, 285. — Le plastron noir, 14^e espèce, 286. — Ses variétés, 288. — Le plastron blanc, 15^e espèce,

291. — Le colibri bleu, 16^e espèce, 295. — Le verd-perlé, 17^e espèce, 295. — Le colibri à ventre roussâtre, 18^e espèce, 296. — Ses variétés, par Sonnini, 298. — Le petit colibri, 19^e espèce, 300. — Le colibri cendré, par Sonnini, 302. — Le hausse-col doré, 304. — Le hausse-col à queue fourchue, 306. — L'arlequin, 307. — Le colibri à front jaune, 309. — Le colibri à tête, demi-collier, et queue pourprés, 310. — Le colibri à tête orangée, 311. — Le colibri à ventre piqué, 312. — Le colibri verd, 315. — Le colibri à gorge et croupion bleus, 316. — Le colibri à casque pourpre, 317. — Le petit colibri varié, 318. — (Tous ces colibris, depuis celui de la page 302, sont décrits par Sonnini).

COLIN (le). 9^e espèce des gades, poissons osseux. Sa description. *Hist. des Poissons*, VI, 342. — Pourquoi on l'a nommé poisson charbon, ou charbonnier, 343. — Sa pêche. VII, 68.

COLINS (les). Espèce de caille du Mexique, XLIII, 113. — Le grand colin, 119.

COLIOS (le). Oiseau décrit par Aristote; s'il est le même que le loiot, LV, 240.

COLIOT (le). Oiseau qui tient à l'espèce des veuves, et à celle des bouvreuils; ses rapports avec ces oiseaux, XLIX, 219. — Remarques de M. Mauduyt sur cet oiseau, 221. — Lieux où se trouvent les colious, 223. — Quatre espèces, savoir: 1^o. le coliot du Cap de Bonne-Espérance, 224. — 2^o. le coliot huppé du Sénégal, 225. — 3^o. Le coliot rayé, 227. — 4^o. le coliot de l'île Panay, 228. — Addition à l'article des colious, par Sonnini. Trois autres espèces qu'il décrit, 1^o. le coliot à croupion blanc, 230 — 2^o. le coliot des Indes, 231. — 3^o. le coliot verd, 232.

COLLADONA (le) à deux épis. Genre 43 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 231.

COLLE. Celle faite avec la vessie natatoire de la morue est excellente. *Hist. des Poissons*, VI, 302.

COLLE DE POISSON, *ichthyocolle*. Celle qu'on prépare avec la vésicule aérienne du huso, poisson du genre des acipensères. *Hist. des Poissons*, IV, 367, 368 (note) — Usage en médecine de cette colle, et dans les arts, 369.

— On pourroit faire la même colle avec plusieurs poissons de France, 370.

COLLERET (le). Espèce de filet dont on se sert pour la pêche. *Hist. des Poissons*, XI, 57. — Sa description, 58. — Son usage, 59.

COLLET A RESSORT. Nom d'un piège des plus sûrs pour prendre les renards, LXI, 315 (note).

COLLETE. Insecte du genre des andrenettes. Ex. *Apis succincta*. *Histoire des Insectes*, III, 372. — Genre 406 d'insectes de la famille des andrenettes; celle ceinturée. XIII, 359.

COLLETTIA. Genre 19 des plantes dites *nerpruns*. *Hist. des Plantes*, XVII, 233.

COLLIBRANCHE (le). Poisson du genre des cicidies. Sa description. *Hist. des Poissons*, V, 324.

COLBIER (le). 34^e espèce du genre des poissons appelés *chétodons*. *Hist. des Poissons*, XI, 115, 153.

COLLIER ROUGE (le). 13^e espèce de colibri, LIII, 285.

COLLINES. Ce que produit leur penchant sec. *Hist. des Plantes*, I, 353. Voy. MONTAGNES.

COLLINSONES (les). Genre 9 des plantes dites *labidés*. *Hist. des Plantes*, XV, 284. — Quatre espèces connues, 285.

COLLIURE. Insecte du genre des cicindelettes. Ex. *collyris longicollis*. *Hist. des Insectes*, III, 79. — Genre 5 des insectes du 1^{er} ordre des coléoptères, VIII, 189. — Celui longicol, 190.

COLMA (le). Espèce de fourmilier, XLIX, 354.

COLNUD (le) de Cayenne. Espèce de choucas, oiseau, XLIV, 155.

COLOCASE (la). *Hist. des Plantes*, VII, 417.

COLOCOELA (le). Chat-tigre de l'Amérique méridionale, XXXIII, 166.

COLOMBAUDE (la petite) des Provençaux, est une variété de la sauvette à tête noire, LI, 102.

COLOMBE. Voy. PERON.

COLOMBELLE (la). Genre 82 des gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 5. — Deux espèces, 6.

COLOMBIER. Choix pour son local, XLIII, 172.

COLUMNÉE. Genre 22 des plantes dites *personées*. *Hist. des Plantes*, XVI, 34. — Deux espèces, *idem*.

COMANATH (le). Espèce de poisson que ne pêchent jamais les habitants du golfe d'Arabie, sans lui ouvrir le ventre pour lui chercher des perles; histoire de Thevet à ce sujet. *Hist. des Mollusques*, II, 169 (note).

COMARET. Genre 22 des plantes dites *rosacées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 122.

COLONNE de Pompée en Egypte, VIII, 49 (note).

COLOQUINELLE (le). Division du Pepon polymorphe. *Hist. des Plantes*, XIV, 282.

COLOQUINTE (la). *Hist. des Plantes*, XIV, 272. — Coloquinte fausse, 282.

COLUBER VIPERA (la). La prétendue vipère d'Egypte. *Hist. des Reptiles*, VI, 214.

COLUBRINES (les). Genre 154 des poissons. *Hist. des Poissons*, XI, 397. — Celle chinoise, 398. — 3^e espèce du genre des poissons appelés *murenophis*, XIII, 234. — Sa description et ses espèces, 252.

COLUMELLE (la) bitannuelle. Genre 117 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 420.

COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.

COLYDIES (les.) Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 208. — Genre 201 des insectes de la famille des xylophages, XI, 237. — Quatre espèces; le colydie sillonné; celui allongé; celui filiforme, et celui tête rousse, 238, 239.

COMBATTANS (les), vulgairement paons de mer. Oiseaux qui se battent entre eux, LVIII, 104. — Lieux d'où ils viennent, et ceux qu'ils habitent, 106. — Leur description, 108. — Leur puissant physique en amour, par Baillon, 110. — Manière de les chasser, 111. — Leur adresse guerrière. Description de la crinière des mâles, 112. — Leur nids et leurs œufs, 114.

COMBES (les). Nom qu'on a donné à des terrains enfoncés, des espèces de vallons secs et froids, où le bois n'est jamais beau, et pousse plus tard. Pourquoi ils sont très-sujets à la gelée, VI, 433.

COMBOU-NAGOU (le). 7^e variété de la vipère appelée *naja*. *Hist. des Reptiles*, VI, 73.

COMBRE (le). 123^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 157, 299.

COMBRETUM. Genre 13 des plantes dites *épilobes*. *Hist. des Plantes*, XVII, 48.

COMBUSTION. Différences entre les matières combustibles et celles qui ne le sont pas, IV, 242. — Ce que la combustion suppose, 243. — Nature des matières combustibles, 247. — Effets de la combustion, comparés avec ceux de la calcination, 280, 292. — Combustibilité des minéraux, 309.

COMEPHORES (les). Genre 38 des poissons osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 187. — Le comephore baikal, 188.

COMÈTES (les). Leurs mouvemens, I, 168. — Ce qu'elles peuvent produire en tombant sur la surface du soleil, 169, 172, 176. — Torrent de matière projetée par les comètes, 170. — Elles paroissent avoir été mises en mouvement par des impulsions différentes de celle des planètes, III, 215. — Le choc d'une comète a projeté hors du soleil les matières des planètes, 217. — On ne pourra jamais savoir au juste quel est le nombre des comètes dans le système solaire. Evaluation pour fixer le nombre de ces corps circulans autour du soleil, 221. — Comment une comète pourroit former de nouvelles planètes, 227. — Sur la matière dont le noyau des comètes est formé, IV, 69. — Sur la chaleur qu'elles reçoivent du soleil, lorsqu'elles en approchent, 404. — Immensité de l'espace qui se trouve au-delà de l'aphélie de nos comètes, VII, 293. — Les planètes sont issues et sorties du soleil par le choc d'une comète, 300. — Sur la circulation et les vicissitudes des comètes, XXIII, 358.

COMMANDEUR (le). Oiseau du nouveau-monde; d'où lui vient ce nom, XLV, 138. — Sa description et lieux où il est répandu, 140, 147. — Ses habitudes, 141. — Filet dont on se sert pour le prendre, 142. — Profit que l'on tire de sa destruction, 143 (note). — Ses variétés, 144.

COMMELINES (les). *junci*. 2^e ordre, famille 17 des plantes monocotylédones proprement dites. — Leur

description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 139. VIII, 177. — Genre 1, le mayaca des rivières, 179. — Genre 2, la pollie du Japon, 180. — Genre 3, la callisie rampante, 181. — Genre 4, les commelines, 183. — Espèces remarquables ; celle commune, 185. — Celle à tige droite, 186. — Celle tubéreuse et celle paniculée, 187. — 13 espèces connues, 188. — Genre 5, les éphémères, 189. — Aspect général de la famille des commelines, IX, 415.

COMPASSION (la). Ce que ce mot exprime, et ce qui en résulte, XXIV, 248.

COMPOSÉES (les). Famille 40 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 296. — Savoir : 10. les chicoracées, leurs espèces. *Voyez* ce mot, 297, 323. — 20. les cynarocéphales, *voy.* ce mot, 308. — 30. les corymbifères, *voyez* ce mot, 319. — 5^e ordre, famille 42 des plantes. Les syngénèses. *Hist. des Plantes*, XI, 315. — Leurs fleurs, 317. — Détails particuliers, 319.

COMPRIMÉS. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 325.

COMPTONIA (le) à feuilles de célerach. Genre 15 de la famille des plantes amentacées. *Hist. des Plantes*, X, 416. — Particularités sur cet arbrisseau, 417. — Espèce connue, 418.

CONCAMÉRATIONS. On appelle ainsi les cloisons isolées et détachées des nautilus. *Hist. des Mollusques*, IV, 323. *Voy.* le mot NAUTILES.

CONCEPTION. Elle devance quelquefois les signes de la puberté, XVIII, 373. — Signes de la conception, 376. — Fait particulier, 379.

CONCHOLEPAS (les). Genre 41 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 246. — Leur description, 247. — Celui péruvien, 249.

CONCHYLOGIE (Système de), par Adanson. *Hist. des Mollusques*, IV, 211 (note).

CONCOMBRE sauvage (le). Celui d'âne. *Histoire des plantes*, XIV, 263. — Les concombres, genre 10 des plantes appelées courges, 267. — Espèces remarqua-

bles. Le concombre commun ou cultivé, 268. — Celui serpent, 270. — Autres espèces, 271, 272. — Le melon, voy. ce mot, 273. — 12 espèces communes de concombre, 277.

CONCRÉTIONS vitreuses mélangées d'argile, XIII, 249. — Concrétions métalliques, XIV, 101. — Celles du fer, 106. — Celles de l'or, 140. Celles de l'argent, 145, 151. — Celles du cuivre, 154. — Celles de l'étain, 163. — Celles du plomb, 165. — Celles du mercure, 168. — Celles de l'antimoine, 171. — Celles du zinc, 174. — Celles de la platine, 176.

CONDALIA. *Hist. des Plantes*, XIII, 406.

CONDOMA (le). Quadrupède du Cap de Bonne-Espérance. Sa description, par Caius, XXXI, 152. — C'est l'animal indiqué par Kolbe sous le nom de chèvre sauvage, 135. — Description par M. de la Brosse, 137. — Notices de MM. Forster, 140. — Description par M. Allamand, 141. — Dimensions du condoma, 149.

CONDOR (le). Espèce de vautour, XXXVIII, 192. — Sa description, 193. — Celle du P. Feuillée, 194. — Ce qu'en dit Grezier, 197. — Il est beaucoup plus grand et plus fort que l'aigle, 198. — Description par Molina, 200 (note). — Son courage et sa force, 203. — Lieux où il se trouve, 204. — Ce qu'en dit Garcilasso sous le nom de Roc, 204. — Faits relatifs à cet oiseau, 208 — Son plumage, 210.

CONDYLIPODES. Insectes ainsi désignés par Latreille. *Hist. des Insectes*, III, p. vij de l'Avertissement; et IV, pag. 5.

CONDORI, *adaenanthera*. Genre 14 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 265.

CÔNE (le). Ce que c'est dans les fleurs, *Hist. des Plantes*, II, 197. — Situation du fruit, 215.

CONES (les) Genre 75 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 400. — Leur description, 401. — C'est à M. Adanson que l'on doit les connoissances les plus positives sur ces animaux, 402. — Dix espèces, 404.

CONEPATE (le). 2^e espèce de l'animal appelé mout-fette, XXXIII, 246.

CONFERVE. Genre 2 des plantes dites *algues*. *Hist. des Plantes*, III, 78. — 23 espèces, 79.

CONFORMATION. Nature des diverses conformations animales. *Hist. des Poissons*, 385.

CONGÉLATION. Elle présente d'une manière inverse les mêmes phénomènes que l'inflammation, IV, 323.

CONGRE (le). Espèce d'anguille ou de *marène*, 5^e espèce. En quoi il diffère de l'anguille. *Hist. des Poissons*, VI, 127. — Ses habitudes, 130. — Ce qu'en dit Redi, 131. — Comment on prend ce poisson, 132. — Comment on le fait sécher, 133.

CONGRÈS (observations sur le) XVIII, 371.

CONIÈLES (les). Genre 3 des plantes dites *labiées*. *Hist. des Plantes*, XV, 256. — Une espèce de France. — Cinq espèces connues, 257.

CONIFÈRES (les), *coniferæ*. 4^e ordre, famille 27 des plantes dycotylédones ; leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 208. — Famille 31 des plantes, X, 168. — Sa division en deux sections, 69. — § 1^{er}, fleurs munies d'un péricarpe ; genre 1, les *ephedra*, 171. — Genre 2, les *casuarina* ou *filao*, 173. — Genre 3, les *ifs*, 175. *Voy.* ce mot. — § 2, point de péricarpe ; écailles portant les étamines. Genre 4, les *genévriers*, 181. — Genre 5, les *cypres*, 192. — Genre 6, les *thuya*, 202. — Genre 7, le *pin* du Chili, 207. — Genre 8, les *pins*, 209. — Genre 9, les *sapins*, 231. — Genre 10, les *mélèses*, 242. *Voyez* ces différents mots.

CONISES (les). Genre 90 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 277. — Celle vulgaire et celle balsamifère, 278. — Celle émoussée ; et 4 espèces de France, 279. — 92 espèces connues, 280.

CONNAISSANCES. On ne les acquiert que par la voie de la comparaison ; XVIII, 237.

CONOBÉE (la) aquatique. Genre 23 des plantes dites *lysimaiches*. *Hist. des Plantes*, XIV, 399. — Une espèce connue, *idem*.

CONNARUS. Genre 4 des plantes dites *térébintacées*. *Hist. des Plantes*, XVII, 176.

CONOCARPES (les). Genre 8 de la famille des plantes

dites chalefs. *Hist. des Plantes*, XI, 231. — 3 espèces connues, 232.

CONOPS. Insecte du genre des papillons; ex. *Conops macrocephala*. *Histoire des Insectes*, III, 443. — Genre 514 d'insectes de la famille des conopsaires, XIV, 345. — 2 espèces, 347.

CONOPSAIRES. Insectes du genre des papillons. *Histoire des Insectes*, III, 342; V, 333. — 95^e famille des insectes; leur description, XIV, 345. — Genre 514, les conops, 347. — Genre 515, les zodions, 348. — Genre 516, les myopes, 349. — Genre 517, les stomoxes, *idem*.

CONORIA. Genre 5 des plantes dites vinettiers. *Hist. des Plantes*, XVII, 392.

CONQUE (la) persique. *Voy. POURPRE*.

CONSOUDE, *symphytum*. Genre 19 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 96. — 3 espèces et leurs vertus, 97.

CONTINENCE. Ses funestes effets. Mémoire à ce sujet, et observation, XVIII, 315, 327.

CONTINENS. Pointes formées par les continens, II, 186. — Epoque de leur séparation, III, 189, 308, 383 et 403. — Un des deux contient à proportion beaucoup plus de terre que l'autre, 272. — Ils étoient continus dans les temps qui ont succédé à la retraite des eaux, 405. — Preuves de leur continuité, 407. — La séparation des deux grands continens est plus ancienne que la date des déluges, 418. — Epoque de la séparation de différentes contrées, 422. — Dans tous les continens du monde la pente est plus rapide du côté de l'occident que du côté de l'orient, IV, 114. — Origine des continens. *Hist. des Mollusques*, I, 70.

CONVALLAIRES (les), ou les muguets. Genre 14 des plantes dites asperges, VIII, 123. — 2 espèces, le convallaria verticillata, et le convallaria bifolia, 124.

CONVOLVULI. *Voy. LISERONS*.

COOKIA. Genre 7 des orangers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 255.

COTAHU, *copaifera*. Genre 9 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 381.

COPROPHAGES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 139 ; V, 228. — 14^e famille des insectes, X, 82. — Leur description, 84. — Culte que les Egyptiens leur ont rendu, 88. — 1^o les ateuchus sacrés, *idem.* et 92. — 2^o les bousiers, 98. — 3^o les onitis, 103. — 4^o les ontophages, 108. — 5^o les aphodies, 117. *Voyez ces différens mots.*

COPROSMEs (les). Genre 68 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 88. — 2 espèces connues, *idem.*

COPULATION. Moyen par lequel la plus grande partie des animaux se perpétuent, XVIII, 12.

Coq (le). Erreurs d'Harvey sur les parties génitales du coq, XVII, 162. — Son histoire, XLI, 104. — Difficulté pour lui assigner une place parmi les oiseaux, 105. — Son chant, et sa description, 108. — Ses habitudes, 109. — Suite de sa description, 110. — Caractères du bon coq, 112. — Ses amours, 113. — Ses attentions pour ses poules, 115. — Sa jalousie, 116. — Antipathie mutuelle des coqs, et leurs combats, 117. — Anecdotes à ce sujet, 118 (note). — Singularité des coqs de Rhodes, 119. — Œufs de coq, 126. — Mue du coq, 127. — Détails sur la fécondation des œufs par le coq, 130. — Premier effet de cette fécondation, 132. — Endroit où se forme la voix du coq, 165. — Son tube intestinal, et ses testicules, 167. — Son accroissement et durée de sa vie, 172. — Coqs sauvages, 174. — Le coq appartient en propre à l'ancien continent, 177. — Variétés de ses races, le coq commun et le coq huppé, 179. — Le coq sauvage de l'Asie, et celui de Madagascar, l'acoho, 182. — Le coq nain de la Chine, 183 (note). — Le coq de Pantan, 185. — Le coq de l'île de Java, 187. — Le coq d'Angleterre et celui de Turquie, 188. — Le coq d'Hambourg et le coq frisé, 189. — Le coq nègre, 191. — Le coq sans croupion ou coq de Perse, 193. — Le jago de Sumatra, 196. — Le coq de Caux ou de Padoue, 197. — Différentes autres espèces, 198. — Discussion sur sa souche primitive, très-difficile à trouver, 199. — Le coq et la poule sauvages de la Guyane, 206, par Sonnini,

qui les a décrits dans le journal de physique' août 1775.
 — Coqs dans les Gates, montagnes de l'Inde, 209. — Ce qu'a dit Sonnerat du coq et de la poule sauvages des Gates, 210. — Leur description, 216. — Coq et poule sauvages de la Guiane, 214. — Différence entre la poule d'Inde et le coq, 234. — Coq d'Inde. Voyez DINDON. Le tetras ou le grand coq de bruyère. Voy. TETRAS, 315. — Anecdote sur le combat d'un jeune coq avec un épervier, LIII, 361. (note.)

COQ DE ROCHE (le). Oiseau de l'Amérique méridionale, XLIX, 282. — Description de sa huppe, 284. — Différences entre le mâle et la femelle, 286 (note). — Ses habitudes naturelles, 287. — Lieux où on le trouve, 288. — Le coq de roche du Pérou, 290.

COQUILLADE (la). Espèce d'alouette de Provence, LI, 5.

COQUALLIN (le). Animal d'Amérique. Ses différences avec l'écureuil, XXXII, 165.

COQUANTOTOTL (le). Oiseau huppé, de la figure d'un moineau, et du genre des manakins, XLIX, 266.

COQUE (la), *coccum*. Capsule à plusieurs loges, espèce de fruit. *Hist. des Plantes*, II, 211.

COQUELUCHE (la). Espèce d'ortolan, XLIX, 17.

COQUELUCHEOLES (les). Genre 77 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 374. — 2 espèces connues, 375.

COQUERET. Voy. ALKEKENCE.

COQUILLES. Leur multitude innombrable, I, 375, 383. — Celles de Touraine, 376. — Ce qu'en dit Bernard Palissy, 377. — Lieux où on trouve et où on ne trouve pas les coquilles, 391. — Ce qu'a dit Voltaire des coquilles, 396. — Bancs de coquilles dans les collines des environs de Paris, 403, 412. — Dans les pays étrangers, *idem*. — Ce que dit Orléarius à ce sujet, 409. — Autres endroits où l'on trouve des coquilles marines, 412. — S'il y en a sur les plus hautes montagnes, 418. — On trouve les coquilles marines dans des états différents, naturelles ou pétrifiées, 420. — Coquillages du fond des mers appelés *pelagie*, 424. — Autres remarques sur

les coquilles pétrifiées, 428. — S'il est vrai qu'il n'y ait aucune production marine dans les montagnes du Pérou, 433. — Ce que dit Woodward des coquilles, 438. — Il n'y a pas de coquilles sur le sommet des plus hautes montagnes, II, 55. — Temps de la formation des premiers coquillages, III, 203. — Fait particulier sur deux coquilles pétrifiées, IV, 93 (note). — Travail des animaux à coquille sur la substance de l'eau, 324, et VIII, 166.

COQUILLES FOSSILES, C'est par elles qu'on peut mieux connoître la composition et les changemens du globe terrestre. *Histoire des Mollusques*, I, 70. — Sur celle qui appartient au mollusque appelé *l'argonaute papiracé*; combien elle est précieuse dans les Indes. *Hist. des Mollusques*, III, 160. — Coquilles d'argonaute d'un pied de long, 168. — Lister et ses deux filles, qui avoient le même goût que lui pour les coquilles, sont, parmi les savans, ceux à qui les conchyliologues ont le plus d'obligation, 172. — Linnæus est le premier qui ait nommé ces coquilles argonautes, 179. — Différence entre les coquilles vraiment chambrées et celles seulement cloisonnées dans les mollusques, 250. — Les marchands, qui polissent les coquilles, mettent à découvert une partie de leur anatomie, 251. — Détails à ce sujet, 252. — Sur le déplacement de la partie postérieure ou queue dans toutes les coquilles terrestres et marines, 260 (note). — Causes de la coloration des coquilles, 262. — Sources des couleurs de celles des mollusques, 274. — Sur le nom de *mélanie*, donné par Lamarck à un genre de coquilles, 276. — Détails sur la formation des coquilles, 281. (note). — Luxe que mettent les Hollandais dans l'organisation des belles coquilles, 367. — Genre de coquilles qui se rapprochent, à beaucoup d'égards, de celles des argonautes, 379. — Les coquilles pétrifiées forment le complément philosophique de l'histoire des mollusques, 387.

Coquilles microscopiques construites par des mollusques encore plus petits qu'elles, et à qui elles servent d'enveloppes. *Hist. des Mollusques*, IV, 8. — Travaux de Soldani et de Plancus sur les coquilles mi-

croscopiques, 26, 27. — Belles observations de Boulanger sur ces coquilles, 28. — Coquilles microscopiques de Mayence, 32. — Leur distinction en quatre classes, par Soldani, 33. — Réflexions à ce sujet, 35. — Parmi les dix-sept espèces de coquilles qu'il établit, on ne trouve point d'argonautes, 37. — Figurés de coquilles ayant l'aspect des argonautes, et fortement grossies au microscope, 38. — Coquilles de mollusques multivores faites en poire, 39. — Les orbulites de Lamarck, 44. — Coquilles naturelles et vivantes recueillies par Plancus et Soldani, 45. — Planche 42, figure de coquilles microscopiques dont les formes se rapprochent des argonautes, 46. — De la carinaire ou nautile vitré, etc., 74. *Voy. CARINAIRE.* — Dès qu'une coquille existe, elle ne peut être, que parce qu'elle a été construite par un animal, 65. — Sel marin qui pénètre les coquilles marines, et qui s'y effleurit dans les tems humides, 134. — Coquilles défigurées par quelques accidens, et abandonnées. qu'on recherche aujourd'hui. IV, 206. — Coquilles microscopiques, 235. — Réflexions sur la petitesse constante de ces coquilles, 236. — Et sur leur effrayante multiplication, 237. — Coquilles des gastéropodes. V, 90. — Leur description, 92. — Comment on les recueille, 96. — Comment on les détache de l'animal, 97. — Utilité qu'en tire l'art, 98. — Leur origine, 102. — Ce que c'est que la base d'une coquille fossile, 105. — Explication des autres termes, employés par les conchylogistes pour désigner les différentes parties de la coquille, 6 10 et suivantes. — Coquille mastiquée, ce que c'est, 222. — *Voyez* les gastéropodes. — Nomenclature des termes particuliers employés dans la description des coquilles bivalves, VI, 140, 142. — Leurs sommets, 153.

CORACAN (le) des Indes Plante du genre des graminées cretelles. *Hist. des Plantes*, VII, 255.

CORACIAS (le) ou le CRAVE, espèce d'oiseau. Sa description, XLIII, 313 (note). *Voyez* CRAVE. — Singulière habitude d'un coracias, 315. — Son cri, et ponte de la femelle, 317. — Lieux où il se trouve, 318. — Autre espèce, 321. — Le coracias huppé ou le sonneur, 322. — Sa description, 323.

— Sa huppe, *idem*. — Ses habitudes, 325. — Lieux où il se trouve, 326.

CORAIL. Les coraux ne sont pas des plantes marines, I, 423. — Comment le corail est produit, et lieux où on le trouve, XIII, 326. — Mémoire de M. Fraticelli sur celui de Corse et sur sa pêche, 327. — Détails par Azuni, sur la pêche du corail dans les mers de Sardaigne, 331 (note). — Sa pêche en Sicile, par M. Bridone, 332. — Tournefort met le corail au nombre des plantes marines. *Hist. des Plantes*, III, 246. — 13 espèces, 247.

CORAIL des Jardins. *Voy. PIMENT*.

CORALINE. Plante marine. *Hist. des Plantes*, III, 242. — Plusieurs espèces, 243.

CORALLES (les). Troisième genre des serpens; leur description. *Hist. des Reptiles*, V, 256. — Le coralle à tête obtuse, 259. — Sa description, 260. — Ses dimensions, 262. — Tableau méthodique des coralles, VIII, 384.

CORALLIN d'Amboise (le). Espèce de serpent décrit par Séba. *Hist. des Reptiles*, V, 114.

CORALLINE. *Ruppia*. Genre des plantes naïades. *Hist. des Plantes*, III, 232.

CORAYA. (le). Espèce de fourmilier, XLIX, 373.

CORBEAU (le). Le corvus des anciens, et différens noms qu'on lui a donnés, XLIV, 11. — Ses habitudes et sa voracité, 14. — Il n'est point d'animal qui mérite mieux que lui la dénomination d'omnivore, 15. Il a été respecté dans certains pays et proscrit dans d'autres, 16. — Par-tout il a été regardé comme un oiseau sinistre, 18. — Son prétendu don de prophétie, 20. — Sa voix et son cri, 21. — On lui coupe le filet, et on lui apprend à parler, 22 (note). Il s'apprivoise aisément, et apprend à régler et à employer sa voracité au service de l'homme; exemples, 23. — Son odorat et son industrie pour boire, 25. — Différences entre les corbeaux sauvages et ceux privés, 26. — Vrais corbeaux de montagnes, 27. — Leurs habitudes, 28. — Leurs amours, 29. — Leur accouplement, 30. — Distinction de la femelle et du mâle, 31. — Sa ponte, 32. — Education des petits,

tits, et soin du mâle pour pourvoir à leur subsistance, 34. — Il veille moins à leur défense, 35. — Détails à ce sujet, par M. Hebert, 36. — Durée de la vie du corbeau, 40. — Sa couleur, 41. — Description des organes de la digestion, 42. — Détails sur son estomac, par Spallanzani, 43. — Comment on attrape les corbeaux, 45. — Leur vol et combats qu'ils se livrent, 46, 47. — Ils sont répandus presque par-tout, 49. — Leur plumage, 51. — Manière de changer leur couleur noire en un beau blanc, 52 (note). — Détails à ce sujet, 53, 54. — Variété dans la grandeur du corbeau, 55. — Le corbeau à bec croisé, par Sonnini; singularité de son bec, 57. — Le grand corbeau d'Afrique, par le même; sa description, par le Vaillant, 59. — Ses habitudes, 60. — Le corbeau cornu, 61. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au corbeau, celui des Indes de Bon-tius, 62. — Raisons pour qu'il ne soit pas un calao, contre l'avis de Brisson, 63. — Le corbeau du désert, décrit par Shaw, 64. — Autres espèces décrites par Koemfer, 65. — Sur l'oiseau appelé par Tournefort, roi des corbeaux, 66. — Le corbeau des terres Australes, par Sonnini, 67. — Le corbivau, par le même, 69.

CORBINE (la) ou corneille noire, XLIV, 72. — Ses habitations dans les grandes forêts, et sa nourriture, 73. — Ses habitudes, 74. — Son nid et ses œufs, 76. — Soins que la femelle prend de ses petits, 77. — Rapports de la corbine avec le corbeau, 78. — Sa description, 79. — Comment on l'attrape, 80. — Autre manière de faire la chasse aux corbines, décrite par Chomel, 82 (note). Corbines blanches et rayées de noir et de blanc, 84. — Ce qu'en disent différents voyageurs, 85. — Lieux où on trouve beaucoup de corbines, 86. *Voy. CORNEILLE.*

CORBIVAU (le) Oiseau d'Afrique qui a beaucoup de ressemblance avec le corbeau, XLIV, 69. — Sa voracité, 71.

CORBULES (les). Genre 113 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 199. — 2 espèces, 201.

Tab. TOME I.

R

CORBIJEAU (le). Oiseau, le même que le courlis, LXIV, 108.

CORCHORUS. Voy. **CORÈTE**.

CORDIA. Voy. **SEBESTIER**.

CORDON BLEU (le). Oiseau du Brésil, de l'espèce des cotingas, XLIX, 208.

CORDON JAUNE (le). 14^e espèce du genre des poissons appelés *mules*. *Histoire des Poissons*, IX, 67 et 94.

CORDON OMBILICAL. Sa description, XVIII, 177.

CORDON OMBILICAL (le), considéré comme partie du péricarpe dans les plantes. *Hist. des Plantes*, II, 229.

CORDONNIER. Nom donné assez improprement à l'oiseau appelé *goëland brun*, LX, 232 (note).

CORDYLES (les). Reptiles du genre des stellions. *Hist. des Reptiles*, IV, 8. — Leur description, 11. — Vertus médicales attribuées à quelques-unes de leurs parties, 14.

CORÉ. Insecte du genre des nus; ex. *Lygæus tragus*. *Hist. des Insectes*, III, 244. — Genre 263 d'insectes, XII, 200 — 17 espèces, 201.

CORÉGONES (les). Genre 176 de poissons; 1^{re} espèce, le corégone lavaret. *Hist. des Poissons*, XII, 220, 227. — Celui pidschian, 220, 236. — Celui schokur, 221, 236. — Celui nez, 221, 238. — Celui large, 221, 239. — Le thymalle, 222, 240. — Le vimbe, 222, 243. — Le voyageur, 222, 243. — Le muller, 223, 243. — L'autumnal, 223, 244. — Le corégone albe. — Celui peled, 223, 248. — Celui marène, 248. — Le marenule, 224, 250. — Le wartmann, 224, 251. — L'oxirhinque, 225, 252. — Le leucichthe, 225, 253. — L'ombre, *idem*. — Le rouge, 226, 254. — Le clupéoïde, 226, 256.

COREOPES (les). Genre 179 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 190. — Espèces remarquables, la coreope à feuilles menues, celle à trois ailes, 191. — Celle odorante, et 25 espèces connues, 192.

G É N É R A L E.

259

CORÈTE, *corchorus*. Genre 5 des plantes tiliacées, ou tilleuls. *Hist. des Plantes*, XVIII, 166. — 9 espèces, 167.

CORETHRES (les). Genre 466 d'insectes de la famille des tipulaires. *Hist. des Insectes*, XIV, 288.

CORISE, *corixa*. Espèce d'insecte; ex. *sigara striata*. *Hist. des Insectes*, III, 255. — Espèce de punaise d'eau, XII, 277. — Genre 284; sa description; 287. — 4 espèces, 289.

CORISIES (les) Famille 44^e d'insectes, 1^{ere} section, composée des scutellères et des pantatomes. *Hist. des Insectes*, XII, 174.

CORLIEU (le), ou petit courlis; 2^{me} espèce, LVIII, 221.

CORNUTIA. Voyez **AGNANTES** (les).

CORMIER. Voyez **SORBIER**.

CORI (le). Animal quadrupède des Indes Espagnoles, XXVI, 167 (note). — C'est le même que Molina a décrit sous le nom de *cuy*, 168.

CORIACÈS. Insectes du genre des papillons. *Hist. des Insectes*; III, 465; V, 337. — 98^e famille des insectes, XIV, 397. — Ils vivent sur des quadrupèdes, 398. — Genre 553, les hippobosques, *idem.* et 401. — Détails sur cet insecte, 399. — Genre 554, l'ornithomie, 402. — Genre 555, les mélophages, *idem.* Genre 556, les nycteribies, 403.

CORIANDRE. Genre 13 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 271. — 2 espèces et leurs propriétés, 272.

CORINE. 3^e espèce de gazelle; sa description XXX, 266.

CORIS (le) de Montpellier. Genre 7 des plantes dites lysimachies. *Histoire des Plantes*, XIV, 365. — Une espèce connue, 366.

CORIS (les). Genre 67 des poissons osseux : leurs caractères distinctifs; deux espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 103. — 1^{ere} espèce, le coris aigrette; sa description, 104. — Le coris anguleux, 2^e espèce, traits par lesquels il diffère du précédent, 107.

R 2

CORISPERMES (les). Genre 26 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 72. — une espèce de France, et quatre espèces connues, 73.

CORMORAN (le). D'où cet oiseau tire ce nom, LX, 48. — Sa description, 50, 56, 59. — Ses quatre doigts, 57. — Son adresse à pêcher, et sa voracité, 52, 72. — Comment on a mis à profit, à la Chine, son talent pour la pêche, 53. — Lieux où il se trouve, 55, 61. — Ses voyages, 58. — Cormorans de Kamtschatka, ou Ouriles, 58, 59. — Ceux du Groenland, 60 (note). — Détails particuliers tirés d'un ouvrage hollandais, 62 (note). — Le petit cormoran, ou le nigaud, 65. — Lieux qu'il habite, 66. — Ile Schag ou des nigauds, 67. — Comment on les chasse, 68. — Indication de leurs différentes espèces, 70 (note). — Celui appelé geai à pieds palmés, 73. — Singularités qu'offre son organisation intérieure, 74. — Le cormoran pygmée, par Sonnini, 77. — Le tingmik, par le même, 79.

CORMORANS. (les) Nom qu'on a donné à ceux qui, après la pêche de la baleine, ont pour fonction, lorsqu'on la dépèce, d'éloigner du cadavre les oiseaux d'eau, et de fournir aux travailleurs les instrumens dont ils ont besoin. *Hist. des Cétacés*, 170.

CORNEILLE (la) noire. XLIV, 72. *Voy. CORBINE*, — Les corneilles des Maldives, 85. — La corneille à rabat, par Sonnini, 89. — Le freux, ou la frayonne, 91. — Fonction de son bec, 92. — La corneille mentelée, 100. — Ses habitudes, 102, 107. — Sa nourriture, 103. — Son nid, 105 (note). — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux corneilles; celle du Sénégal, 110. — Addition à l'article de cette corneille, par Sonnini, 112. — Ses habitudes, et ce qu'en dit le Vaillant, 113. — Variété de cette espèce, 115. — La corneille du Cap de Bonne-Espérance, par Sonnini, 116. — La corneille de la Jamaïque, 118. — La corneille à duvet blanc, par Sonnini, 120. — La corneille de la nouvelle Calédonie, par le même, 122. — Les choucas. Leur comparaison avec les corneilles, 123. *Voyez CHOUCAS*.

CORNE DE CERF. *Hist. des Plantes*, XIV, 34.

CORNÉE (la). Membrane de l'œil. Celle des insectes. *Hist. des Insectes*, I, 238.

CORNÉENNE (la). Espèce de pierre, XVI, 307.

CORNES (les). Corne particulière à l'insecte appelé chenille du fenouil. *Hist. des Insectes*, I, 255, 256. — Méprise au sujet des cornes du bœuf, relevée par Forster, XXIII, 30. — Cornes et défenses des autres animaux, comparées au bois du cerf, XXIV, 102. — Variétés de leurs formes dans les animaux, XXIX, 90. — Remarques sur le même sujet, 231.

CORNES D'AMMON. Ce que c'est, et comment on les distingue. *Hist. des Mollusques*, IV, 324. — Elles sont plus communes que les nautilus, 329.

CORNET. C'est, suivant les Bayonnais, le calmar commun. Les matelots français l'appellent le plus petit et le plus grand animal de la mer. *Hist. des Mollusques*, II, 16. — Ce qu'en disent les marins, 278.

CORNETS ou entonnoirs pour ceux qui ont l'oreille dure, XX, 27.

CORNICHON. *Hist. des Plantes*, XIV, 269.

CORNIOLES. *Hist. des Plantes*, XIV, 169.

CORNOUILLERS (les). Genre 11 des chèvrefeuilles. *Hist. des Plantes*, XIV, 167. — Espèces remarquables: le cornouiller sauvage, ou des bois, ou mâle, 168. — Celui sanguin, 170. — 13 espèces connues, 171.

CORNU (le). 8^e espèce du genre des poissons appelés chétodons. *Hist. des Poissons*, XI, 105, 131. — Poisson du genre des macroramphoses, XII, 95, 96.

CORNUET. *Hist. des Plantes*, XIII, 180.

CORNUS. Voy. CORNOUILLER.

CORNUTIA. Voy. AGNANTES (les).

CORO (le). 2^e genre des poissons appelés sciènes. *Hist. des Poissons*, X, 332, 338.

COROLLE (la). Ce que c'est dans les plantes. *Hist. des Plantes*, I, 43. — Son organisation dans les fleurs,

II, 16. — Ses couleurs et ses formes, 17. — Si on peut la regarder comme un prolongement du liber, 18. — Suc qui distille la corolle, ou le nectar des fleurs, 20. — Comment de Jussieu définit la corolle, 23, 27. — Rapports entre les étamines et la corolle, 32. — Attache de la corolle et celle monopétale, 161. — La corolle monopétale régulière, 162. — Celle irrégulière, 164. — Corolle polypétale, 166.

CORONULE (la). Genre 177 des mollusques dits *acéphales*. *Hist. des Mollusques*, VI, 475.

CORONILLE. Genre 76 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 365. — 4 espèces, 366. — Leurs propriétés, 367.

CORPON (le) ou **Corpou**, chambre de la mort. C'est ainsi qu'on appelle la dernière chambre formée par la madrague, espèce de filet dont on se sert pour la pêche du thon. *Hist. des Poissons*, VIII, 60.

CORPS de baleine. Dangers de leur usage chez les enfans, XVIII, 272.

CORPS en général. Leur attrition paroît être le principe de toute chaleur, IV, 216. — Expériences sur les progrès de leur chaleur, 377. — Ce n'est pas proportionnellement à leur densité qu'ils reçoivent et perdent plus ou moins vite la chaleur, 409. — Fondemens de la théorie de Buffon à ce sujet, 410.

CORPS glanduleux. Pourquoi ils sont considérés comme cause de la stérilité dans certains cas, XXVIII, 372. — *Voy. OVAIRE*.

CORPS HUMAIN. Son existence est douteuse pour quiconque raisonne sans préjugés, XVIII, 238, 241. — Son accroissement successif depuis la naissance, 293. — Exemple d'un accroissement très-prompt, 303. *Voyez ACCROISSEMENT*. Grandeur du corps, 303. — Correspondance qu'ont certaines parties du corps avec d'autres, 341. — Corps de l'homme et de la femme bien faits, 384. — Proportions de leurs parties, 485. — Sa division suivant sa hauteur, 427. — Dépérissement du corps, XIX, 1. — Les premières nuances de ce dépérissement se font apercevoir avant quarante ans par

degrés jusqu'à la mort, 3. — L'altération des os est la première cause de ce dépérissement, 3, 10, *idem*. — parties solides du corps, 28. — L'altération des parties fluides est la suite de celle des solides, 29.

CORRIGIOLA. Genre 9 des plantes dites portulacées. *Hist. des Plantes*, XVI, 373.

CORRINDON. Espèce de pierre, XVI, 283.

CORRUPTION. Êtres qu'elle engendre, XVIII, 24, 39.

CORSELET. Nom qu'on a donné à la seconde partie du corps des insectes à étuis. *Histoire des Insectes*, II, 61, 148. — Sa forme ou figure, sa substance, sa surface et ses proportions, 151.

CORTUSES (les). Genre 8 des plantes dites lysimachies. *Hist. des Plantes*, XIV, 389. — Première espèce de France, *idem*. — Deux espèces connues, 390.

CORYCIENS (les). Genre 6 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 193.

CORYDALE. Insecte du genre des mégaloptères. *Ex. Hemerobius cornutus*. *Hist. des Insectes*, III, 290. — Genre 316 d'insectes de la famille des mégaloptères, XIII, 44.

CORYDORAS (les). Genre 172 des poissons; celui Geoffroy. *Hist. des Poissons*, XII, 106, 107.

CORYMBE. Ce que c'est qu'une fleur en corymbe. *Hist. des Plantes*, 200.

CORYMBIFÈRES (les). 3^e espèce de plantes dites les composées, de la 4^e classe des plantes dycotylédones. Leurs espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 319. — Suite des corymbifères, ou de la 3^e division des plantes composées. § III. Réceptacle nu. Graines nues, ou sans aigrette; fleurs radiées. Genre 118, les ostéospermes, XIII, 5. — Genre 119, les soucis, 18. — Genre 120, les madis, *idem*. — Genre 121, les chrysanthèmes, 19. — Genre 122, les pyrèthres, 28. — Genre 123, les matricaires, 35. — Genre 124, les boltones, 38. — Genre 125, la dénékie du Cap de Bonne-Espérance, 39. — Genre 126, les paquerettes, 40. — Genre 127, la cénie turbinée, 43. — Genre 128, les lidbeckes, 44. — § IV, réceptacle nu, graines sans aigrettes, ou munes d'un re-

bord membraneux ; fleurs flosculeuses. Genre 129, les cotules, 46. — Genre 130, les adénostemmes, 49. — Genre 131, les struchium, 50. — Genre 132, les sparganophores, 51. — Genre 138, les gymnostiles, 52. — Genre 134, les grangées, 54. — Genre 135, les éthulies, 55. — Genre 136, les carpésies, 56. — Genre 137, l'hyppia frutescent, 57. — Genre 138, les tanaïssies, 59. — Genre 139, les balsamites, 63. — Genre 140, la pentzie à feuilles en forme d'éventail, 65. — Genre 141, les armoises ou absinthies, 66. — Genre 142, la calomerie amaranthoïde, 94. — Genre 143, la piquerie trinerve, 96. — § V, réceptacle muni de paillettes, graines nues ou non aigrettées. Fleurs souvent radiées, rarement flosculeuses. Genre 144, les tarconnautes, 97. — Genre 145, les calées, 99. — Genre 146, le rhanterium odorant, 101. — Genre 147, les relhanies, 102. — Genre 148, les athanasies, 104. — Genre 149, les personnies, 108. — Genre 150, la diotis candide, 109. — Genre 151, les micropes, 110. — Genre 152, les santolines, 112. — Genre 153, les anacycles, 115. — Genre 154, les camomiles, 117. — Genre 155, les achillées ou mille-feuilles, 131. — Genre 156, les ériocéphales, 147. — Genre 157, les buphthalmes, 148. — Genre 158, les dahliés, 154. — Genre 159, les osmites, 156. — Genre 160, la peirousie, 157. — Genre 161, les encelies, 158. — Genre 162, les césulies, 159. — Genre 163, le sclerocarpe d'Afrique, 160. — Genre 164, l'onxie camphrée, 161. — Genre 165, les milleries, 163. — Genre 166, les siegesbeckies, 165. — Genre 167, la phaëtuse, 166. — Genre 168, les polymnies, 168. — Genre 169, le tétragonothéca à fleurs d'hélianthe, 170. — Genre 170, la baltimore droite, 171. — Genre 171, les écliptes, 172. — § VI. Réceptacle garni de paillettes, graines surmontées de dents ou de paillettes, fleurs radiées, dont la plupart flosculeuses. Genre 172, les galinsogas, 174. — Genre 173, les spilantes, 175. — Genre 174, la sanvitalie, 178. — Genre 175, les bidens, 179. — Genre 176, les verbesines, 184. — Genre 177, la willdenowre glanduleuse, 187. — Genre 178, les

cosmos, 180. — genre 179, les coreopes, 190. — genre 180, la ximénésie, 195. — genre 181, les zinnia, 196. — genre 182, les hétérospermes, 198. — genre 183, les baillères, 200. — genre 184, les silphions, 201. — genre 185, la crisogone de Virginie, 203. — genre 186, les mélampodes, 204. — genre 187, les hélianthes, 205. — genre 188, les hélénies, 215. — genre 189, les rudbeques, 217. — genre 190, la tithone à fleurs de tagets, 220. — genre 191, la galar-dienne, 221. — genre 192, l'alcine perfoliée, 223. — genre 193, la wédelie frutescente, 224. — genre 194, les édères, 225. — genre 195, les rorhies ou berckeya, 227. — § VII. Réceptacle garni de paillettes ou de soies, graines couronnées d'une aigrette, plumeuses ou velues, ou formées par des arêtes; fleurs le plus souvent radiées. genre 196, les arctotides, 231. — genre 197, l'arctothèque rampante, 240. — genre 198, les mussinies, 241. — genre 199, le tridax couché, 243. — genre 200, les amelles, 244. — genre 201, la starkée à fleurs en ombelle, 245. — genre 202, la balbisie, 246. — genre 203, la rosenie glanduleuse, 247. — genre 204, la pascalie à feuilles glauques, 248. — genre 205, la pardisie, 249. — genre 206, la craspédie, 250. — § VIII. Corymbifères anormales; anthères rapprochées, mais non réunies. genre 207, les ives, 251. — genre 208, la clibade de Surinam, 252. — genre 209, les parthenies, 254. — genre 210, l'éleuthéranthère ovale, 256. — § IX. genres regardés comme appartenant aux corymbifères, mais qui appartiennent à d'autres familles, 257. — genre 211, les ambrosies, 258. — genre 212, les lampourdes, 261. Voy. les additions, p. 397.

CORYMBIOLES (les). genre 67 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 190. — Quatre espèces connues, 191.

CORYNOCARPUS. genre 7 des plantes dites vinettiers. *Hist. des Plantes*, XVII, 393.

CORYPHA (les). genre 12 des palmiers, celui du Malabar. *Hist. des Plantes*, VIII, 70. — Sa description, 71. — Le corypha parasol, 72. — 2 espèces connues, 73.

CORYPHÈNES (les). Genre 80 des poissons dits osseux. Leurs caractères distinctifs. Premier sous-genre, six espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 201. — Second sous-genre, deux espèces, 203. — Troisième sous-genre, trois espèces, 204. — Quatrième et cinquième sous-genre, cinq espèces, 205. — Magnifique parure des coryphènes, 207. — La dorade d'Amérique, le coryphène hippurus, *idem*. — Sa synonymie, *idem*. — D'où vient la dénomination de coryphène, 209. — Le coryphène doradon, 2^e espèce, 215. — La dorade de la mer du Sud, le coryphène chrysurus, 3^e espèce, 218. — La petite dorade, le coryphène scomberoïde, 4^e espèce, 226. — Le coryphène ondé, 5^e espèce, 231. — Le coryphène pompile, 6^e espèce, 233. — Le rasoir bleu, le coryphène bleu, 7^e espèce, 236. — Le paon de mer, le coryphène plumier, 8^e espèce, 238. — Le rason, le coryphène rasoir, 9^e espèce, 241. — Le coryphène perroquet, 10^e espèce, 244. — Sa description, 245. — Le coryphène camus, 11^e espèce, 246. — Le coryphène rayé, 12^e espèce, 247. — Le coryphène chinois, 13^e espèce, 249. — Le coryphène pointu, 14^e espèce, 251. — Le coryphène verd, et celui casqué, 15^e et 16^e espèces, 252. — Comment on les distingue des autres coryphènes, 253.

CORYPHÉNOÏDES (les). Genre 82 des poissons dits osseux ; leurs caractères distinctifs ; celui hottynien. *Hist. des Poissons*, VIII, 262, 263.

CORYSTE. Insecte particulier. Ex. *Albunea dentata*. *Hist. des Insectes*, III, 27. — 15^e genre des crabes ; sa description, VI, 121. — Le coryste denté, 122.

COS. Nom donné par les anciens à toutes les pierres propres à aiguiser le fer, XIII, 262 ; XIV, 275.

COSCOROBA (le). Nom d'une oie du Chili, par Sonnini, LXI, 244.

COSMIBUENES (les). Genre 46 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 29. — Deux espèces connues, 30.

COSMOS (les). Genre 178 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 188. — Trois espèces connues, 189.

Cossac (le). Animal, le même que l'isatis, XXXIII, 198.

Cossignia. Genre 12 des plantes savonniers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 307.

Cosson. Insecte du genre des fractaires; ex. *cossonus linearis*. *Histoire des Insectes*, III, 199. — Genre 188 d'insectes, XI, 103. — Celui linéaire, 105. — Celui chlorope, 106.

Cossus. Insecte dont les Romains mangeoient la larve. *Histoire des Insectes*, I, 358. — Genre 429 d'insectes de la famille des bombycines; celui gâte-bois, XIV, 174.

Cossyphe, *cossepheurs*. Insectes particuliers; ex. *Cossyphus depressus*. *Hist. des Insectes*, III, 164, 165; V, 239. — Genre 153 des insectes; 1^{ere} espèce de la 21^e famille, les *cossepheurs*, X, 324.

Costotol (le). Oiseau de l'Amérique méridionale, XLV, 131.

Cotus (les). Genre 6 des plantes dites balisiers. *Hist. des Plantes*, IX, 287. — 5 espèces connues; 288.

Cotelets (les). Genre 14 des plantes dites gatiliers. *Hist. des Plantes*, XV, 221. — 11 espèces connues, 222.

Cotingas (les). Beauté du plumage de ces oiseaux du nouveau continent, XLIX, 293. — Leurs habitudes, 294. — Raisons pour lesquelles il en arrive d'Amérique plusieurs imparfaits, 295 (note). — Leur différente grandeur, 296. — Le cordon bleu, espèce de cotinga du Brésil, 298. — Le quereiva, 301. — La tersine, 304. — Le cotinga à plumes soyeuses, 306. — Le pacapac, ou pompadour, 308. — Ses variétés, 311. — L'ouette, ou cotinga rouge de Cayenne, 314. — Le guira panga, ou cotinga blanc, 317. — Organisation particulière de la caroncule qu'il a sur le bec, 318. — L'averano, 321. — Le guirarou, 324. — Variété de cet oiseau ou cotinga gris, 327. — Le cotinga cuivré de Surinam, par Sonniui, 329. — Le cotinga huppé, 331. — Le cotinga jaune, 332.

COTON ou **COTONNIER**, *gossypium*. Genre 16 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 197. — 6 espèces et leurs usages, 198.

COTTES (les). Genre des poissons dits osseux. Leurs caractères distinctifs, 1er sous-genre. *Hist. des Poissons*, VIII, 278. — 2^e sous-genre, 279. — Le grognant, le cotte grognant, 1^{re} espèce, 281. — Habitudes des cottes, 282. — Le scorpion de mer, le cotte scorpion, 2^e espèce, 287. — Le cotte quatre cornes, troisième espèce, 295. — Sa description, 296. — Le cotte raboteux, quatrième espèce, 299. — Sa description, 300. — Le cotte austral, 5^e espèce, 301. — Le cotte insidiateur, 6^e espèce, 302. — Le cotte madagasse, 7^e espèce; sa description, 304. — Le cotte noir, 8^e espèce, 306. — Le cotte chabot, 9^e espèce, 308.

COTTE ARMÉ (le). Poisson de la classe des aspidophores. Sa synonymie. *Hist. des Poissons*, VIII, 266. — Sa description, 268.

COTULES (les). Genre 129 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 46. — 18 espèces connues, 47.

COTYLÉDONS (les) ou feuilles séminales de la plante. *Hist. des Plantes*, I, 48. — Discussion sur les cotylédons, 122. — Comment ils contribuent à la germination, 134. — Sur les cotylédons des fougères, 135. — Leur situation, leur division, II, 118. *Voyez* COTÉLET.

COTYLET. Genre 3 des plantes dites joubarbes. *Hist. des Plantes*, XVI, 354. — 11 espèces, 355. — Leurs propriétés, 356.

COTYLÉPHORE (le). 9^e espèce du genre des poissons appelés *silures*. *Hist. des Poissons*, XII, 7 et 28. — En quoi il diffère de celui appelé *asprède*, 29. — Lieux qu'il habite, 30.

COU (le). Sa description, XVIII, 421.

COUA (le). Espèce de coucou de Madagascar, LIV, 20.

COUAGA (le) 15^e espèce du genre des poissons appelés *chetodons*. *Hist. des Poissons*, XI, 107, 137.

COUAGGA. *Voy.* KWAGGA.

COUPLANDIA. Genre 29 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII. 280.

Coucou (le). Sa synonymie, LIII, 350 — Sa ponte, 351, 352. — Préjugés et fables à son sujet, depuis deux mille ans, 354 (note). — Fait particulier rapporté par M. Klein, 358. — Sa salive, 360. — Sa prétendue métamorphose en épervier : anecdote à ce sujet, 361. — Il n'est pas oiseau de proie, 362. — Ses habitudes, 363. — Le coucou n'est point ingrat, malgré le proverbe des Allemands, *ingrat comme un coucou*, et la harangue de Mélancton, contre l'ingratitude de cet oiseau ; preuve à ce sujet, 364. — Sur son habitude de pondre dans le nid d'autrui, 365. — Sur sa ponte d'un seul œuf et sa mue, 366. — S'il passe l'hiver dans des trous, 367. — Autres oiseaux qui ne font pas de nid, 371. — Sur la nourrice du coucou, 364, 372. — Discours de M. Lottinger, sur le coucou, 373 (note). — Réfutation de l'opinion de Lottinger, qui veut que le coucou seul jouisse, en vertu d'une loi spéciale du Créateur, de la faculté de faire couvrir ses œufs par d'autres oiseaux, 374. — Expériences, à ce sujet, de serins qui ont couvé d'autres œufs que les leurs, 378. — Résultats de ces expériences, 384. — Détails relatifs à l'histoire du coucou, 383 (note). — Oiseaux dans le nid desquels le coucou dépose son œuf, 386. — Remarques à ce sujet de M. Edvard Jenner, 389 (note), 395 (note). — La mère coucou et le père n'abandonnent pas leurs petits, quoique déposés dans un autre nid, 390. — Sur le chant du coucou, 392, 401. — Les mâles sont beaucoup plus nombreux que les femelles, 394. — Remarques de Sonnini sur leurs œufs, 395. — Sur le cri de leurs petits, et leurs narines, 396. — Nourriture du coucou, et singularité que présente le jeune coucou, 398. — S'il est naturellement hydrophobe. Remarque de Sonnini à ce sujet, 400. — Voyages du coucou, 402. — Il est susceptible d'éducation, 405. — Coucous de l'ancien continent, 406. — Leur marche, 407. — Leur plumage, 408. — Poil d'un coucou adulte, et description de plusieurs de ses parties internes, 412. — Sa longueur totale, 416. — Ses variétés, 418. — Celui du

cap de Bonne-Espérance, 420. — Celui du royaume de Loango en Afrique, 421. — Description des coucous étrangers; principaux attributs de celui d'Europe, LIV, 5. — Observations générales sur les variétés des coucous, 6. — Sur la branche des coucous établis dans le nouveau monde, 9. — Oiseaux du vieux continent, qui ont rapport au coucou. Le grand coucou tacheté, 12. — Sa description, 13. — Le coucou huppé noir et blanc, 15. — Le coucou verdâtre de Madagascar, 17. — Autre coucou du même pays, décrit par M. Commerson, 18. — Le coua, 20. — Le houhou d'Egypte, 23. — Description de la femelle, et ses habitudes, 24. — Le coucou verd d'Antigues, 27. — Le toulou de Madagascar, 28. — Observation de Mauduyt sur cet oiseau, 29. — Le rafalbin ou coucou du Sénégal, 30. — Le boutsallick, ou coucou du Bengale, 33. — Le coucou varié de Mindanao, 35. — Le cail ou coucou de Madagascar, 37. — Sa description, 38. — A quoi il doit la vénération dont il jouit dans la presqu'île de l'Inde, *idem.* (note). Celui brun, varié de noir; habitant des îles de la Société, 40. — Le coucou brun piqué de roux, 42. — Le coucou tacheté de la Chine, 45. — Le coucou brun et jaune à ventre rayé, 47. — Le jacobin huppé de Coromandel, 49. — Le petit coucou à tête grise et ventre jaune, 52. — Les coukeels, 53. — Le coucou verd doré et blanc, 57. — Autre espèce décrite par le Vaillant, 58 (note) — Le coucou à longs brins, 60. — Le coucou huppe à collier, 62. — Le san-hia de la Chine, 64. — Le tait-sou, espèce de coucou de Madagascar, 67. — Le coucou indicateur ainsi appelé parce qu'il indique aux chasseurs, en les appelant par son cri, le lieu où il y a une ruche d'abeilles, 69. — Description de la femelle, par M. Sparmann, 71. — Remarque de le Vaillant sur les espèces de cet oiseau, 72. — Le vourou-driou de Madagascar, 74. — Différences du mâle et de la femelle, 75. — Leurs dimensions comparées, 77. — Le coucou à plaque dentelée aux ailes, par Sonnini, 78. — Le criard, par le même, 80. — Le coucou rougeâtre tacheté de bleu et de noir, 81. — Le coucou à tête grise, 83. —

Le petit coucou des Indes, 84. — Le coucou brun rayé à croupion rougeâtre, 85. — Le poopo-arowro, 86. — Le malkoha, 87. (Tous ces coucous, depuis celui de la page 78, sont décrits par Sonnini), 89. — Oiseaux d'Amérique qui ont rapport au coucou; celui dit le vieillard ou l'oiseau de pluie, 89. *Voy.* ce mot. — Letacco, 90. — Le cuira-cantara, 104. — Le quapactol, ou le rieur; pourquoi on l'appelle ainsi, 106. — Le coucou cornu ou l'atingacu du Brésil, 108. — Le coucou brun varié de roux, 110. — L'oiseau des barrières, coucou de Cayenne, 111. — Le cendrillard ainsi appelé à cause de la couleur dominante de son plumage, 113. — Le coucou piaye de Cayenne, 115. — Sa description et ses habitudes, 116. — Le coucou noir de Cayenne, 119. — Le petit coucou noir de Cayenne, 121. — Le coucou pointillé, par Sonnini, 123.

COUCOU (la raie). 8^e espèce. *Voy.* le mot RAIE.

COUCOU. *Hist. des Plantes*, XIV, 383.

COUDEY (le). Oiseau du genre des jacanas dans l'Indostan, LIX, 210.

COUDOUS (le). Sur sa corne, XXXI, 196. — Sa description, 200. *Voy.* CARRA.

COUDRE-MANCIENNE. *Hist. des Plantes*, XIV, 156.

COUDRIERS (les). *Voy.* NOISETIERS.

COUDUM-NAGOU (le). Variété de la vipère appelée *naja*. *Hist. des Reptiles*, VI, 72.

COUEPIA. Genre 46 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 163.

COUGOUACOU (le). C'est le même animal que le cariacou, XXV, 48.

COUGOURDE. *Hist. des Plantes*, XIV, 279.

COUGOURDETTES. *Hist. des Plantes*, XIV, 282.

COUGUAR. Espèce de tigre ou de léopard, XXV, 7. — Sa description, XXVI, 305. — Lieux où on le trouve, 306. — Ses habitudes, 307. — Réduit en captivité, il est presque aussi doux que les autres animaux domestiques, 312. — Addition à son article, par Sonnini, 314. — Si le couguar de la Guiane est le puma du Pérou, 316. — Le couguar noir, 325. — Le couguar de Pensylvanie, 327. — Ses dimensions, 328.

COUGIGNOT (le). Oiseau d'Afrique, le même que le merle verd d'Angola, XLVI, 90 (note).

COU-JAUNE (le). Oiseau de Saint-Domingue, LI, 170. — Son joli ramage, 171. — Son plumage, 172. — Lieux qu'il fréquente, 173. — Son intelligence dans la structure de son nid, 174. — Ponte de la femelle, 176.

COUCUELS (les). Oiseaux des Indes orientales de l'espèce des coucous, LIV, 53. — Leurs dimensions, 56.

COULACISSI (le). 3^e espèce de perruche à queue courte, LXIII, 242.

COULANS (les). Poissons de Cayenne qui se trouvent dans les eaux fréquentées par les gymnotes électriques. *Hist. des Poissons*, V, 379 (note).

COULAVAN (le). Oiseau de la Cochinchine, espèce de loriot, XLV, 245.

COULEQUIN (le). Genre 8 de la famille des orties, arbre de la Jamaïque ; sa description. *Hist. des Plantes*, X, 86. — Espèce connue, 88.

COULEURS (les). Sur celles accidentelles, et sur leur production en général, VI, 5, 14. — Premier moyen de les produire, la réfraction, 6. — Sept dénominations principales : violet, indigo, bleu, verd, jaune orangé et rouge, *id.* — Sur l'image colorée du soleil appelée par Newton le *spectre solaire*, 7. — Ce qu'on entend par couleurs primitives, 8. — L'étendue des sept intervalles de couleurs répond assez à l'étendue proportionnelle des sept tons de la musique, 9. — La réflexion, second moyen que la nature emploie pour produire les couleurs, 10. — Autres couleurs qui dépendent autant de notre organe que de l'action de la lumière, 14. — Les couleurs accidentelles tiennent par plusieurs rapports aux couleurs naturelles ; preuves expérimentales, 15. — Note de Sonnini à ce sujet, *idem.* Autres observations sur le même sujet, 20. — Auteurs à consulter sur les dénominations anciennes des couleurs relativement aux insectes. *Hist. des Insectes*, I, 318. — Sur leurs dénominations latines, 319. — Leurs divisions,

321.

321. — Leurs principales nuances, par Harris, 325. — Leur série naturelle et leur nomenclature, 318, 351. — Des couleurs d'apparence, 339. — Tableaux de ces couleurs, 344. — Couleur des hommes, d'où elle dépend, XX, 238. — Elle est accidentelle, 242. — Elle dépend principalement du climat, 310, 454. — Sur l'opinion que la noirceur des nègres vient de l'ardeur du soleil, 314. — Preuve que la couleur des nègres peut changer du noir au blanc, 372. — Il n'y a pas d'homme blanc devenu noir, 377. — Dans quelle partie de la peau réside la couleur noire des nègres, 443. — La chaleur du climat est la principale cause de cette couleur, 446. — Habitans des trois couleurs dans la terre du Saint-Esprit, XXI, 18. — Les couleurs sont dues à la manière dont les objets reflètent ou réfléchissent la lumière, parce que sans elle elles n'existeroient pas, *Hist. des Mollusques*, III, 263. — Système d'Aristote sur les couleurs, 264. — Système de Descartes et de Newton sur le même sujet, 265, 266. — Comment les couleurs se forment dans l'œil, 272. — C'est une illusion de l'enfance, et une erreur de l'ancienne philosophie d'Aristote, d'attribuer les couleurs à l'objet ou au corps qui frappe nos regards, 274. — Sur les couleurs des poissons *Hist. des Poissons*, I, 146.

COULEUVRE (la). Expérience sur une couleuvre dans le vide. *Hist. des Reptiles*, I, 179. — Couleuvre adorée par les nègres d'Afrique, 287. — Odeur rance et désagréable que la couleuvre répand, comme le serpent. *Hist. des Mollusques*, I, 308 (note). — Récit de Van-Ernest, d'un combat singulier entre une couleuvre et deux petits lézards scinques. *Hist. des Reptiles*, IV, 280. — La couleuvre noire, ou *coluber constrictor*. Elle n'est nullement venimeuse, V, 57 (note). — Naturalistes qui ont confondu les couleuvres avec les vipères, VI, 6. — Comment les couleuvres passent l'hiver, 95. — Genre 12, caractères distinctifs des couleuvres, 229. — Différence de leur démarche avec celle des autres ophiidiens, 230. — En quoi elles diffèrent des vipères, 231. — Leurs couleurs et leurs œufs, 232. — Leurs principales sections ou divisions, 234. — On peut les appri-

Tab. Tome I.

S

voiser , 235. — La couleuvre double - tache , 236. — La couleuvre de Séba , 238. — La couleuvre molure , 239. — La couleuvre domestique , 242. — La couleuvre nymphe , 244. — Deux espèces , 245. — La couleuvre comprimée , 247. — La couleuvre ser-à-cheval , 249. — Autre synonyme , 250. — La couleuvre de Minerve , 251. — La couleuvre catenulaire , 253. — Sa description , 254. — La couleuvre situle , 256. — La couleuvre dhara , 257. — La couleuvre tyrie , 259. — Autre espèce , 260. — La couleuvre à gouttelettes , 261. — La couleuvre rude , 263. — Sa description , 264. — Ses dimensions , 265. — La couleuvre à quatre raies , 266. — La couleuvre molosse , 269. — La couleuvre jaunâtre , 272. — La couleuvre janthine ou à couleurs changeantes , 273. — Ses dimensions , 274. — Variétés , 275. — La couleuvre rousse , 276. — La couleuvre hélène , 277. — Ses couleurs , 278. — Ses habitudes , 279. — La couleuvre réticulaire , 281. — La couleuvre cenco , 283. — La couleuvre rembrunie , 285. — La couleuvre blanchâtre , 288. — Sa description , 290. — La couleuvre verte et jaune , 292. — Sa description , 293. — Preuve qu'on peut l'appivoiser , 294. — La couleuvre oiseleur , 296. — La couleuvre large-tête , 298. — Sa description , 299. — La couleuvre fulvie , 300. — La couleuvre très-verte , 302. — Celle minime , 304. — Sa description , 305. — Celle pétaïre , 307. — Sa description et ses rapports avec celle plutonie , 308. — La couleuvre bleuâtre , 310. — Celle argus , 312. — Celle chaîne ou gétule , 314. — Pourquoi elle est ainsi nommée. et sa description , 315. — Celle panthérine , 318. — Sa description , 319. — Ses dimensions , 321. — Celle triangle , 322. — Celle plutonie , 324. — Sa description , 325. — Ses dimensions , 326. — La couleuvre ibiboboca , 327. — Sa description , 328. — Celle clélie , 330. — La couleuvre pethole , 332. — Sa description , 334. — La couleuvre argentée , 336. — Sa description , 337. — Ses couleurs , 338. — La couleuvre dione , 339. — Celle ovivore , 341. — Celle audacieuse , 345. — Celle peinte , 347. — Celle cendrée , 350. — La couleuvre bleue à deux raies ,

GÉNÉRALE.

275

352. — Autre espèce, 354. — La couleuvre muqueuse, 355. — Une autre couleuvre du Bengale, 356. — La couleuvre grison, 359. — Ses dimensions, 362. — La couleuvre obscure, 363. — Ce qu'en dit Van-Ernest, 364. — La couleuvre padère, 366. — La couleuvre à tête noire, 367. — Celle annelée, 369. — Celle bronzée, 371. — Ses dimensions, 372. — La couleuvre grosse-tête, 374. — Celle rouge-gorge, 376. — Celle triscale, 377. — Autre espèce, 378. — La couleuvre fouet-de-cocher de l'Amérique Septentrionale, 380. — Sa description, 382. — La couleuvre hébé, 385. — Sa description et sa couleur, 386. — La couleuvre brunelle, 388. — Celle à bandes noires, ou celle d'Esculape, 389. — Sa description, 390. — Ses dimensions, 392. — La couleuvre cuirassée, 393. — Celle russélie, 395. — Ses variétés, 397. — La couleuvre pélie, 398. — Celle asiatique, 400. — Celle lien, 402. — Ses habitudes, 403. — Sa description, 404. — La couleuvre noire et blanche, 409. — Celle couresse, 411. — Celle nébuleuse, 413. — Ses dimensions, 415. — Celle iphise, 416. — Ses dimensions, 418. — La couleuvre perlée, 419. — Ses dimensions, 421. — La couleuvre aulique ou laphiati, 422. — La couleuvre agile, 424. — Celle schokari, 426. — Celle à banderoles, 428. — La couleuvre triste, 430. — Celle bordelaise, 432. — Celle sibon, 433. — Celle ceilanique, 437. — Celle hydre, 439. — Celle aurore; sa description *Hist. des Reptiles*, VII, 5. — Celle thalie, 7. — Celle nassique du Bengale, 9. — Deux espèces. Description de la première, 10. — Description de la deuxième espèce, 13. — La couleuvre à huit raies, 17. — La couleuvre lisse, 19. — Sa description, ses habitudes, 20. — La couleuvre corais; sa description, 23. — La couleuvre rayée, 25. — Sa description, 26. — Ses dimensions, 28. — La couleuvre unicolore, 29. — La couleuvre d'Esculape, 30. — Sa description, 31. — Deux espèces, et lieux où on les trouve, 32. — La couleuvre à collier, 34. — Sa description, 36. — Ses couleurs, 37. — Ses variétés, 38. — Celle écarlate, 43. — Sa description, 44. — Celle maligne, 46. — Sa description, 47. —

S 2

Celle blanche, 49. — Sa description et ses dimensions, 50, 51. — La couleuvre dard, 52. — Celle azurée, 54. — Celle galathée, 55. — Celle suisse, 57. — Sa description, 58. — Celle demi-collier, 59. — La couleuvre à trois raies, 61. — La couleuvre boiga, 63. *Voyez ce mot.* — La couleuvre chapelet, 69. — Ses dimensions, 70. — La couleuvre à tête de vipère, 71. — Sa description, 72. — Ses dimensions, 73. — La couleuvre cerclée; sa description, 74. — La couleuvre fil, 77. — Sa description, 78. — Celle blanchâtre, 81. — Celle à zônes, 82. — La couleuvre bluet, 84. — La couleuvre de Panama, 85. — Celle brunâtre, 86. — Celle serpentine, 87. — Ses variétés, 89. — Celle miliaire, 92. — La couleuvre à raies rouges, 93. — Sa description, 94. — La couleuvre chatoyante, 96. — Celle malpole ou le siffleur, 98. — Sa description, 99. — La couleuvre variée, 100. — La couleuvre verte d'été; sa description, 101. — Ses dimensions, et ce qu'en dit Bertram, 103. — La couleuvre saurite, 104. — Sa description, 105. — Celle pythonsse, 107. — Sa description et ses dimensions, 108, 109. — La couleuvre roussâtre ou hotamboye, 110. — La couleuvre sombre à deux raies, 112. — Sa description, 113. — Ses dimensions, 114. — La couleuvre carénée, 115. — La couleuvre saturnine, 117. — Celle rhomboïdale, 119. — Celle cobel, 121. — Sa description, 122. — Ses couleurs, 123. — Ses dimensions, 124. — La couleuvre vipérine, 125. — Ses couleurs, 126. — Autre espèce, 127. — La couleuvre pale, 128. — Celle rubannée, 130. — Sa description, 131. — Celle ardoisée, 132. — Celle crotaline, 134. — Celle typhie, 135. — La couleuvre nævielle, 138. — Celle cenchrus, 139. — Celle treillisée, 140. — La couleuvre maure, 143. — Celle ombrée, 144. — Celle sirtale, 146. — Celle sipedon, 148. — Celle triple-rang, 151. — Celle hétérodon, 153. — Sa description, 154. — Celle latonie, 156. — Ses dimensions, 157. — Celle provençale, 158. — Ses dimensions, 159. — Celle décolorée, 160. — Celle chayque, 161. — Sa description, 162. — Ses variétés, 164. — La couleuvre à deux raies, 165. — Particularités de ce reptile,

166. — La couleuvre cerbère, 167. — Sa description et ses dimensions, 168, 169. — Celle schneidérienne, 170. — Celle régine, 172. — Celle violette, 173. — Celle symétrique, 174. — Celle bramane, 176. — Ses dimensions, 177. — Celle ponctuée, 178. — La couleuvre calmar, 180. — Celle ibibe, 181. — Sa description, 182. — Ses couleuvres, 183. — La couleuvre Vainpump ou fasciée, 184. — La couleuvre drap mortuaire, 187. — La couleuvre porte-croix, figurée par Merrem, 189. — Ses dimensions, 190. — La couleuvre dora, 198. — Celle bali ou plicatile, 193. — Celle mexicaine, 197. — La couleuvre lutrix, 199. — Celle striatulée, 200. — Celle duberrie, 202. — Deux espèces, 203. — La couleuvre sillonnée, 204. — Sa description et ses habitudes, 205. — Celle tétragone, 207. — Celle anguleuse, 209. — Ses dimensions, 211. — Celle camuse, 212. — Celle alidre, 214. — Celle cyanée, ou la verte et bleue, 215. — La couleuvre tachetée, 217. — La couleuvre des dames, 219. — Pourquoi ainsi nommée, 220. — La couleuvre à ventre étroit, 221. — Ses dimensions, 222. — Genre 13, la plature, 223. *Voyez ce mot.* — Additions. — La couleuvre masquée, VIII, 324. — La couleuvre caspienne, 326. — Celle de scopoli, 328. — Tableau méthodique des couleuvres, 395.

COUMAROUNA. Genre 86 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 377.

COUPEUR-D'EAU. Nom donné, par quelques observateurs, à certains oiseaux. LX, 318, 321.

COUPLE (le grand). Instrument dont on se sert pour la pêche du thon. *Hist. des Poissons*, VIII, 55.

COURANS. Leur origine tient aux inégalités du fond de la mer, II, 249. — Idée nette de la production des courans, 250. — Leurs sinuosités, 254. — Principaux courans de l'Océan, 256. — Description du fameux courant de Mosckoe, Mosche ou Male, sur les côtes de Norvège, 258. — Description de celui de Carybde et Scylla, 262. — Causes des différens courans, 265. — Leur largeur est déterminée et ne varie point, 267. — Courans contraires dans l'air, 284.

COURATARI. *Hist. des Plantes*, XIV, 294.

COURBARIL, *hymenæa*. Genre 21 des plantes dites légumineuses. *Histoire des Plantes*, XVII, 271.

COURBES géométriques. Ce que c'est. XXI, 206.

COURBINE (le). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *pogonates*. *Hist. des Poissons*, XII, 77, 78.

— Sa description, 79.

COUPELLATION. Ce que c'est, et en quoi elle consiste, XI, 45.

COUPEROSE, ou vitriol verd, IX, 456.

COURE-VITE (le). Oiseau de la côte de Coromandel, LIX, 66. — Sa description, 67. — Sa variété, par Sonnini, 69.

COUREUR (le). Oiseau nageur, 3^e espèce de ceux à pieds palmés et à hautes jambes, LXI, 15. — Lieux qu'il fréquente, 16. — Autre espèce sous le nom de trochylos, 17.

COURGES (les), *cucurbitaceæ*. 6^e ordre, famille 45 de la 4^e classe des plantes dites dycotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 418. — Genres qui ont des rapports avec la famille des courges, 428. — Famille 45 des plantes, XIV, 245. — § I. Un style, fruit à une loge et à une graine. Genre 1 : la gronovie grimpante, 247. — Genre 2, les sicyos, 248. — § II. Un style, fruit à une loge et à plusieurs graines. Genre 3, les bryones, 250. — Genre 4, les élateries, 255. — Genre 5, le muricier, 256. — § III. Un style, fruit à plusieurs loges et à plusieurs graines. Genre 6, les mélothries, 257. — Genre 7, les angouries, 259. — Genre 8, les momordiques, 260. — Genre 9, le luffa fétide, 266. — Genre 10, les concombres, 267. — Genre 11, les courges proprement dites, 278. — Espèces remarquables, la calabasse ou courge à fleurs blanches, 279. — Le potiron ou poturon, 280. — Le pepon, 281. — La pastèque ou melon d'eau, 285. — Culture, propriétés et usage des courges en général, 287. — Sept espèces connues, 288. — Genre 12, les anguines, 289. — Genre 13, le cératosanthé tubéreux, 290. — § IV. Cucurbitacées douteuses ; fleurs dioïques. Genre 14, les nandirobes fevil-

les, 291. — Genre 15, la zanone de l'Inde, 293. — § V. Genres qui ont des rapports avec la famille des cucurbitacées. Genre 16, la napoléone impériale, 295. — Genre 17, les grenadilles ou passiflores, 297. — Genre 18, les modèques, 309. — Genre 19, les tascornies, 310. — Genre 20, les malesberbes, 311. — Genre 21, le lagénule de Cochinchine, 313. — Genre 22, les papayers, 314.

COURICACA (le). Oiseau de la Guiane, qui a des rapports avec la cicogne, LVI, 385. — Sa description, 387, 388.

COURLINI (le), ou Courlan. Oiseau de Cayenne; sa description, LVII, 326.

COURLIS (les). Différens noms qu'on leur a donnés, LVIII, 207. — Leur description, 210. — Particularités sur leurs parties internes, 213. — Leurs habitudes, 214. — Lieux où on les rencontre, 215 et suivantes. — Variété du courlis, par Sonnini, 220. — Le corlieu ou petit courlis, 2^e espèce, 221. — Le courlis verd, ou courlis d'Italie, 3^e espèce, 226. — Le courlis brun, 4^e espèce, 231. — Le courlis tacheté, 5^e espèce, 232. — Le courlis à tête nue, 6^e espèce, 233. — Le courlis huppé, 7^e espèce. Ces sept espèces de courlis appartiennent toutes à l'ancien continent, ainsi que les suivans, décrits par Sonnini, 236, 237. — Le courlis brillant, 238. — Le junghill, 240. — Le hagedash, 241. — Le courlis africain, 244. — Le plus petit des courlis, 245. — Les courlis du nouveau continent; le courlis rouge, 1^{re} espèce, 246. — Description d'une femelle, par Sonnini, 248 (note.) — Habitudes de ces oiseaux, 250. — Familiarité d'un de ces oiseaux, par M. Delaborde, 251. — Lieux qu'ils habitent dans l'état sauvage, 254. — Le courlis blanc, 2^e espèce, 256. — Le koko, par Sonnini, 258. — Le courlis brun à front rouge, 3^e espèce, 260. — Description de cet oiseau, par Mauduyt, et par Bartram, 261 (note.) — Le courlis des bois, 4^e espèce, 263. — Le gouarona, 5^e espèce, 265. — L'acalot, 6^e espèce, 267. — Le matuitui des rives, 7^e espèce, 270. — Le grand courlis de Cayenne,

8^e espèce, 272. — Autres courlis du nouveau continent, décrits par Sonnini. Le pillu, 273. — Le courlis de Surinam, 275. — Le 1^{er} courlis de la baie d'Hudson, 276. — Le 2^e courlis du même endroit, 278. — Le tevrea, par Sonnini, 280. — Le courlis de terre, ou grand pluvier, LIX, 7. — Ses différences d'avec le pluvier. Voyez PLUVIER, 9.

COURONNE (la) impériale, vulgairement l'impériale, ou l'herbe aux sonnettes. Genre 3 de la famille des Lys. *Hist. des Plantes*, VIII, 272. — Une espèce connue, 274; XIV, 284.

COUROCUCOU (le). Oiseau du Brésil, qui participe de la famille du coucou et de celle des couroucous. LIII, 341.

COUROCOURS (les), ou *couroucous*. Oiseaux du Brésil. Leur description, LIII, 341. — Celui à ventre rouge, 1^{re} espèce, 323. — Sa description, par M. Deshayes, 326. — Celui à ventre jaune, 2^e espèce, 330. — Celui à chaperon violet, 3^e espèce, 335. — Habitudes des couroucous, 337. — Oiseaux qui ne sont pas de cette espèce, 338.

COUROURITA. *Hist. des Plantes*, XIV, 292, 294. — Genre 19 des plantes dites myrtes, XVII, 75.

COURSE. Jusqu'où peut s'étendre celle de l'homme; XVIII, 434. — Celle des chevaux en Angleterre; récit à ce sujet, de M. le comte de Morton, XXII, 178. — Détails sur le même sujet, 179 (note).

COURTAGNON. Montagne à trois lieues de Reims, remarquable par les fossiles des Indes et de l'Océan qu'on y trouve, et par la nombreuse collection qu'en avoit formée une dame propriétaire, et qui a été vendue après sa mort. *Hist. des Mollusques*, IV, 141.

COURTILIÈRES, *grytotalpæ*. Espèce d'insecte. Ex. *Gryllus grytotalpa*. *Hist. des Insectes*, III, 273. — Insectes du genre des grillons et de la famille des orthoptères, XII, 113. — Détails particuliers sur ces insectes, 114, 115. — Genre 255; leur description, 121. — Deux espèces, 122.

COUS (le). 15^e espèce du genre des poissons ap-

pelés pimelodes. *Histoire des Poissons*, XII, 46, 65.

COUSAPIERS (les). Genre 32 de la famille des orties; arbre de la Guiane. *Hist. des Plantes*, X, 165. — 2 espèces connues, 166.

COUSIN (le). *Culex*. Description de cet insecte et des tumeurs qu'il occasionne par sa piqûre. *Hist. des Insectes*, I, 126. — Persécutions qu'il exerce sur le lièvre, 128. — Ce sont toujours les femelles qui piquent, 130. — Le cousin se nourrit en partie des fleurs et des plantes, 141. — C'est un insecte du genre des tipulaires, *culex pipiens*. *Histoire des Insectes*, III, 420. — Genre 459 d'insectes de la famille des tipulaires; comment ils tourmentent, et comment on s'en garantit, XIV, 272. — Filets qui composent leur trompe, avec laquelle ils piquent, 273. — Le meilleur moyen de se guérir de leur piqûre, 274. — Leurs habitudes, *idem*. — Leurs larves et leur génération, 275. — Trois espèces, 284.

COUSSINS. Nom sous lequel Linnæus a désigné les glandes cutanées des reptiles. *Hist. des Reptiles*, I, 79.

COUSSARI (le) violet. Genre 3 des plantes rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 314. — Deux espèces connues, 315.

COUTARÉE (la) élégante. Genre 55 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 48. — Une espèce connue, 49.

COUTEAU (le). 58^e espèce d'un genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 91. — Sa description, 205.

COUTOURBA. Genre 3 des plantes dites gentianées. *Hist. des Plantes*, XVI, 152.

COUTURIER (le) ou le figuier tati, oiseau de la côte du Malabar, LII, 90. — La nature lui a donné un genre d'industrie particulier pour se mettre à l'abri des attaques des serpents et des singes, 91.

COVRA MANILLA (le). Petit serpent très-venimeux de l'Indostan. *Hist. des Reptiles*, VI, 11.

COVOLCOS (le). Caille du Mexique, XLIII, 121.

COYPU (le). Animal amphibie du Chili, espèce de loutre, XXXIII, 330.

CRABE, *cancer*. Insecte du genre des littoraux; ex. *cancer pagurus*. *Hist. des Insectes*, III, 22. — Remarques de Vieillot sur le crabe tortue, espèce de xiphosure de l'Amérique. IV, 86. — Linnée a décrit le crabe salin, 322. — Sur celui crongon, *idem*. Organes de la génération des crabes, V, 53. — Leur marche, 110. — Leur nourriture, 113. — Faits à ce sujet, *idem*. — Exposé de quelques faits curieux sur les crabes : 1^o par Browne, 141. — 2^o par Collinson, 143. — 3^o par Bosc, 144. — Crabe, *cancer*, genre des insectes kleistagnathes, 153. — Description du premier genre, 353. — Crabes européens, crabe ménade, *cancer moenas*; sa description, 363. — Crabe pagure, *cancer pagurus*, 365. — Crabe cendré, *cancer cinereus*, 367. — Crabe hérissé, *cancer hirtellus*, *idem*. — Crabes exotiques, crabe floride, *cancer floridus*, 368. — Crabe onze dents, *cancer undecim dentatus*, *idem*. — Crabe rude, *cancer scaber*, 369. — Crabe de Rumph, *cancer Rumphii*, 370. — Crabe front-épineux, *cancer spinifrons*, *idem*. — Crabe ochtode, *cancer ochtodes*, 371. — Crabe nain, *cancer parvulus*, *idem*. — Crabe soyeux, *cancer setosus*, 372. — Crabe double épine, *cancer bispinosus*, *idem*. — Crabe corallin, *cancer corallinus*, 373. — Crabe taché, *cancer maculatus*, *idem*. — Crabe variolé, *cancer variolosus*, 374. — Crabe gonagre, *cancer gonagra*, *idem*. — Crabe bronzé, *cancer æneus*, 375. — Crabe chauve-souris, *cancer vespertilio*, *idem*. — Crabe noduleux, *cancer nodulosus*, 376. — Crabe oriental, *cancer orientalis*, *idem*. — Crabe porte-cuiller, *cancer dochlearis*, 377. — Crabe agréable, *cancer amoenus*, *idem*. — Crabe teinturier, *cancer tinctor*, *idem*. — Crabe sayence, *cancer faventinus*, 378. — Crabe peintre, *cancer pictor*, *idem*. — Crabe hydrophyle, *cancer hydrophylus*, 379. — Crabe hispide, *cancer hispidus*, *idem*. — Crabe sculpté, *cancer sculptus*, 380. — Crabe perlé, *cancer perlatus*, *idem*. — Crabe miliaire, *cancer miliaris*, 381. — Portune (le), genre 5 des crabes, VI, 5. — Matute, genre 6, 21. — Ocypodes, genre 7, 27. — Les podophtalmes, genre 8, 53.

— Le grapse, genre 9, 56. — Habitudes des crabes peints des Antilles françaises, 59. — Leurs voyages, 61. — Leur changement de peau, 64. — Comment on les apprête pour les manger, 65. — Les porcellanes, genre 10 des crabes, 74. — Les pinnothères, genre 11, 78. — Les maias, genre 12, 87. — Les macropes, genre 13, 108. — Les leucosies, genre 14, 113. — Les corystes, genre 15, 121. — Les dorippes, genre 16, 123. — L'orithye, genre 17, 129. — La ranine, genre 18, 131. — Le pagure, genre 19, 137. — L'albunée, genre 20, 171. — L'hippe, genre 21, 175. — Les scyllares, genre 22, 179. — Les langoustes, genre 23, 183. — La galathée, genre 24, 195. — L'écrevisse, genre 25, 201. — L'alphé, genre 26, 243. — Le penée, genre 27, 246. — Le palémon, genre 28, 251. — Le crangon, genre 29, 263. — Le squille, genre 30, 271. — Le mysis, genre 31, 282. — Le phronime, genre 32, 289. — Le talitre, genre 33, 294. — La crevette, genre 34, 303. — Le chevrolle, genre 35, 323. — Les cyames, genre 36, 328.

CRABIERS (les). Espèces de hérons répandus dans les deux hémisphères; 9 espèces de l'ancien continent, et 13 dans le nouveau, LVII, 211. — Crabiers de l'ancien continent. Le crabier caïot, 1^{re} espèce, 212. — Le crabier roux, 2^e espèce, 214. — Le crabier maron, 3^e espèce, 215. — Le guacco, 4^e espèce, 218. — Le crabier de Mahon, 5^e espèce, 220. — Le crabier de Coromandel, 6^e espèce, 221. — Le crabier blanc et brun, 7^e espèce, 223. — Le crabier noir, 8^e espèce, 224. — Le petit crabier, 9^e espèce, 225. — Le blongios, 10^e espèce, 227. — Le petit blongios de la mer Caspienne, par Virey, 231. — Le crabier canelle, 233. — Le crabier rayé de la Guiane, 234. — Le crabier rouillé, 235. — Crabiers du nouveau continent, par Virey, 237. — Le crabier bleu, 1^{re} espèce, 239. — Le crabier bleu à cou brun, 2^e espèce, 241. — Le crabier gris de fer, 3^e espèce, 242. — Le crabier blanc à bec rouge, 4^e espèce, 245. — Le crabier cendré, 5^e espèce, 247. — Le crabier pourpré, 6^e espèce, 249. — Le cracra, 7^e espèce, 250. — Le cra-

bier chalybé, 8^e espèce, 252. — Le crabier verd; 9^e espèce, 254. — Le crabier verd tacheté, 10^e espèce, 256. — Le zilatat, 11^e espèce, 258. — Le crabier roux à tête et queue vertes, 12^e espèce, 260. — Le crabier pygmée, 261. — Le crabier à collier, 263. — Les trois crabiers du Chili, 264. — Le crabier gris à tête et queue vertes, 13^e espèce, 266. — Le bec ouvert, espèce de héron du genre des crabiers, 267. — Le bec ouvert blanc des Indes, 270. — (Tous ces crabiers depuis celui de la page 23, sont décrits par Virey).

CRABIER (le). Espèce de chien, XXVIII, 81. — Sa description, 82. — Il est fort commun à Cayenne, et est très-agile, 84. — Deux espèces dans les terres de Cayenne, 85. — Le raton-crabier, 86.

CRABRON, *crabronites*. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 340, 342; V, 308. — Famille 74, XIII, 521, 522. — 5 espèces, 523. — Genre 397, les pemphredons; 523.

CRACRA (le). 7^e espèce des hérons crabiers du nouveau continent, LVII, 250. — Sa description, et lieux où on le rencontre, 251.

CRAIE (la). Sa formation, VIII, 170. — Sa substance, 172. — Ses différens noms et ses changemens, 177. — Premières cavernes et grottes bâties dans la craie, 180. — Lieux où elle se forme, 181. — Montagne qui n'est qu'une masse de craie, X, 182. — Décomposition du sel ammoniac par la craie, 199. — De la craie, XVI, 221. — Bassin crayeux du Boulonnais : il se répète en Angleterre. *Hist. des Mollusques*, IV, 182.

CRAIE de Briançon. Pierre qui est un véritable talc, XIII, 219.

CRAIE d'Espagne. Pierre mal nommée, XIII, 219.

CRAMBE. Voy. CHOU-SUAVIN.

CRAMBUS. Espèce de papillon; ex. *Crambus pas-eum*. *Histoire des Insectes*, III, 416. — Genre

431 d'insectes de la famille des rouleuses. *Hist. des Insectes*, XIV, 234. — 3 espèces, 248.

GRAMPE. Nom qu'on a donné dans les Colonies aux accidens épileptiques des perroquets en domesticité, LXIII, 291.

CRANES trouvés dans la terre, III, 98. — Sur différens crânes des singes, et planche à ce sujet, XXXV, 65.

CRANGANOR. *Hist. des Plantes*, XIV, 54.

CRANGON (le). Insecte du genre des homardiens. *Hist. des Insectes*, III, 35. — Genre des insectes exochinates, V, 159 — Genre 29, caractères distinctifs dans leurs pattes, VI, 263 — Leur description, 264. — Observations de Leeuwenhoeck sur ce crabe, 265. — Espèces européennes, le crangon vulgaire et celui boréal, 267. — Espèces exotiques, le crangon bordé, et le crangon monopode, 268.

CRANICHIS (les). Genre 10 des plantes dites orchidées; espèces connues. *Histoire des Plantes*, IX, 206.

CRANIES (les). Genre 120 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 243. — La cranie masque, 245.

CRANIOLAIRE. Genre 12 des plantes dites bignones. *Hist. des Plantes*, XVI, 143.

CRAPAUD (le). *Bufo*. Fait qui prouve l'horreur que quelques personnes ont pour cet animal, et sur le crapaud bossu. *Histoire des Reptiles*, I, 11 (note). — Grosseur extraordinaire de quelques-uns, 66 (note). — Qualité vénimeuse qu'on leur attribue, 148. — Observation à ce sujet, 149. — Le moyen ingénieux que la femelle du crapaud pipa (*buso dorsiger*) emploie pour conserver ses œufs, et pour protéger ses petits, 246. — Les crapauds, genre 3 des reptiles dits batraciens; leur description générale. VIII, 137. — Le crapaud cendré à pustules rouges, 139 — Ses habitudes, 140. — Le crapaud cendré, 141. — Ses variétés, 142. — Le crapaud à ventre jaune, 143. — Celui de Panama, 145. — Le crapaud sonnant, ou pluvial, 146.

— Ses variétés, 148. — Le crapaud de Roesel, 150. — Usage qu'on fait de ses cuisses, 151. — Le crapaud calamite; sa description, 153. — Ses habitudes, 154. — Le crapaud verd, 156. — Le crapaud bossu, 158. — Le crapaud brun, 161. — Celui veilleur, *buso vespertinus*, 163. — Le crapaud coureur, 164. — Celui goitreux, 166. — Celui ventru, 168. — Celui acéphale, 169. — Celui systome, 170. — Celui lisse, 171. — Celui pipa, 172. — Manière qu'il emploie pour préserver et faire croître ses petits, 174. — Le crapaud accoucheur, 176. — Ses habitudes, 177. — Le crapaud perlé, 179. — Ses variétés, 182. — Le crapaud de Surinam, 184. — Celui à taches blanches, 185. — Celui ovale, 187. — Celui rayé, 188. — Celui criard, 190. — Le crapaud rude, 194. — Le crapaud du Bengale, 197. — Le crapaud épineux, 199. — Le crapaud hérissé, 201. — Celui spinipède, 203. — Celui épaule-armée, 205. — Le crapaud demi-lune, 208. — Celui agua, 209. — Celui à pustules bleues, 212. — Celui cornu, 214. — Tableau méthodique des crapauds, 432.

CRAPAUDINE. Ce que c'est. *Hist. des Poissons*, VI, 180.

CRAPAUDINES (les). *Sideritis*. Genre 24 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 325. — 6 espèces de France, 326 — 29 espèces connues, 327.

CRASPEDIE (la). Genre 206 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 250. — Une espèce connue, *idem*.

CRASSULE. Genre 2 des plantes dites joubarbes. *Hist. des Plantes*, XVI, 352. — 7 espèces, 353. — Leurs vertus, 354.

CRATOEGUS. *Voy. ALISIER.*

CRATEVA. Genre 5 des plantes câpriers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 85. — Propriétés, 86.

CRAVANT (le). Oiseau aquatique; sa description, LXI, 249. — On l'a souvent confondu avec la bernache, 252. — Son cri, 253. — Il peut vivre en domes-

ticité, 254. — Observations de M. Baillon sur cet oiseau, 255. — Ses variétés, par Sonnini, 258.

CRAVATE (la) ou le camail. 7^e espèce de la classe des oiseaux appelés *tangaras*, XLVII, 284.

CRAVATE (la) blanche. Espèce de merle de Batavia; sa description, par Sonnini, XLVI, 252.

CRAVATE DORÉE (la). 10^e espèce d'oiseau-mouche, LIII, 181.

CRAVATE (la) frisée. Espèce d'étourneau, XLV, 108. — D'où lui vient ce nom, 109.

CRAVE (le), ou le CORACIAS. Espèce d'oiseau qui approche du corbeau, XLIII, 312. — En quoi il diffère du choucas des Alpes, 313.

CRÉATION DU MONDE. Interprétation, à ce sujet, du texte sacré, III, 195.

CREINS. C'est ainsi qu'on appelle des bancs de pierre qu'on rencontre dans les mines de charbon de terre, IX, 75.

CREMASTOCHEILE (le). Genre 115 d'insectes, 9^e espèce de la 16^e famille; les scarabéides, *Hist. des Insectes*, X, 206.

CRÈME DE TARTRE. Ce que c'est, X, 69.

CREMILLET. *Voy.* SCORPION.

CRENATULES (les). Genre 131 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 308. — Deux espèces, 310.

CRENILABE (le). 3^e espèce du genre des poissons appelés muges. *Hist. des Poissons*, XII, 384, 391.

CRENEA. Genre 7 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*, XVII, 27.

CREPIDES (les). Genre 8 des plantes dites chicoracées. *Hist. des Plantes*, XI, 377. — 14 espèces de France, 378. — 32 espèces connues, 382.

CRÉPIDULES (les). Genre 38 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 234. — Leur description, 235. — Cinq espèces, 238.

CRESSON CARDAMINE. Genre 11 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 47. — 15 espèces,

48. — Leurs espèces et propriétés, 49. — Cresson de fontaine, *sisymbrium*. Genre 10, 46. — Cresson de Para, *spilanthus oleracea*, XIII, 177.

CRETELLES (les), *cynosurus*. Genre 53 des graminées *Hist. des Plantes*, VII, 254. — Espèces remarquables, 255. — 21 espèces de France et 4 espèces connues, 257.

CRESCENTIA. Voyez CALLEBASSIES.

CRESSERELLE (la). Oiseau de proie très-commun en France, et sur-tout en Bourgogne, XXXIX, 211. — Ses habitudes et singularité dans sa digestion, 215. — Sa description, 214. — Comment elle se nourrit, 217. — Lieux où on la trouve, *idem*. — Comment on l'élève, 218. — Ses variétés, 219.

CREVALLE (le). Poisson du genre des centronotes. *Hist. des Poissons*, VIII, 408.

CREVETTES (les). La petite, des ruisseaux, des fontaines, (*gammarus pulex Fali*). Son examen. *Histoire des Insectes*, II, 14. — III, 38, 39. — Genre des insectes exochonates, V, 161. — En quoi ces crustacés, genre 54, diffèrent des talitres, VI, 303. — Leur description, par Desmars, 305. — Détails donnés sur ces crustacés, par de Geer, 510. — Autres détails, 313. — Espèces: la crevette puce, 316. — La crevette canelle, 317. — La crevette ampoulce, celle folâtre, et celle longicorne, 318. — La crevette cornue, celle bossue, celle appât, 319. — La crevette spinicarpe, celle du homard et celle des sables, 320. — La crevette des abîmes, et celle dentée, 321.

CREVETTINES (les). Espèce de crustacés. *Histoire des Insectes*, V, 193. — Leur description, VI, 288.

CRIARD (le). Espèce de coucou, oiseau d'Afrique, par Sonnini, LIV, 80.

CRI-CRI. Voy. GRILLONS.

CRIS (les). Espèce de perroquets, LXIII, 317. — Leurs différences d'avec les autres, 318. — Leurs nids et leur ponte, 320. — De tous les perroquets de l'Amérique, ce sont les plus susceptibles d'éducation, 323. — Sept espèces

espèces de criks, 355. — Le crik à tête et à gorge jaunes, 356. — Détail sur son naturel et ses mœurs, 357. — Le méanier ou le crik poudré, 360. — Ce perroquet est un des plus estimés, 361. — Le crik rouge et bleu, 362. — Le crik à face bleue, 365. — Le crik de Cayenne, 367. — Sa description, 369. — Le crik à tête bleue, 371. — Ses variétés, 373. — Le crik à tête violette, 377. — Moyen qu'emploient les sauvages pour varier le plumage des criks, 379. — Le crik moineau, par Virey, 382. — Le crik robuste, par le même, 384.

CRIN (le). 2^e espèce de la classe des poissons dits trichopodes. Sa description. *Hist. des Poissons*, VII, 143. — Ses couleurs ondées, 145. — Les papegais, 283. — Celui de Paradis, 380. — *Voyez ce mot.*

CRINOLLES (les). Genre 8 de la famille des lig. *Hist. des Plantes*, VIII, 295. — 5 espèces connues, 297.

CRIOCERE. Insecte du genre des chrysomèles proprement dits; *ex. lema merdigera*. *Hist. des Insectes*; III, 222. — Genre 224 d'insectes, XI, 350. — 9 espèces, 351.

CRIOCÉRIDES (les). Insectes de la 1^{re} section des chrysomélines. *Hist. des Insectes*, XI, 324. — Leur description, 325. — Leurs larves, 326. — Les sagres sont une espèce de criocérides. *Voyez ce mot.*

CRICQUET; *acrydium*. Espèce d'insecte, *ex. gryllus elephas*. *Histoire des Insectes*, III, 282. — 3^e division de la 43^e famille d'insectes, les acrydiens, XII, 138. — Ceux de passage, 139. — Leur fécondité, 140. — Faits remarquables à ce sujet, 141. — Les mangeurs de cricquets appelés acridophages, 142. — Cri et ouverture de chaque côté du ventre qu'ont les cricquets, 143. — Leur manière de vivre et d'agir, 144. — Genre 260, 149. — 21 espèces, 250 à 260.

CRISOGONE (la) de Virginie. Genre 185 des plantes composées, *Hist. des Plantes*, XIII, 203. — Une espèce connue, 204.

CRISTAL. Sa comparaison avec le quartz, VII, 396. — Cristaux verts et bleus, XI, 252. — Cristal de roche, XII, 334. — Sa forme primitive, 337. — Sa composition, 339. — Lieux où il se forme, 343. —

Tab. TOME I.

T

Cristaux blancs, 345. — Quille de cristal particulière, 346 (note). — Sa pesanteur spécifique, 349. — Lieux où se trouve le cristal de roche, 353. — Mines de cristal, 356, 351. — Appareil de M. Achard, pour former du cristal, 359. — Diamans de Cornouailles ou d'Alençon, 361. — Enhydres, ce que c'est, 362. — Manière dont les Chinois travaillent le cristal de roche, 365. — L'extrait le plus pur du quartz est le cristal blanc, 369. — Améthyste, espèce de cristal de roche, 371. — Les cristaux topases, 377. — Lieux où on les trouve, 378. Leur pesanteur spécifique, 380.

CRISTALLISATION; Comment elle s'opère, IV, 342. — Cristallisation en rhombes, VIII, 227. — La cristallisation s'opère par le moyen du feu comme par celui de l'eau, IX, 297. — Cristallisation observée dans du verre, 318 (note). — Il en est de son caractère comme de celui de la solubilité, 434. — Sur différentes cristallisations, XII, 311, 315. — Table de leurs formes, 321. — Ce qu'il faut pour que la cristallisation s'opère, XIII, 69. — La cristallisation et ses phénomènes, XVI, 65. — Produits de la cristallisation universelle, et explication à ce sujet de quelques phénomènes, par M. de la Métherie, 69, 71, 85. — La génération spontanée des végétaux et des animaux en est le produit, 80. — Les montagnes primitives en sont aussi le produit, 92.

CRISTALLOGRAPHIE, (nouvelles découvertes en), XVI, 65, 121.

CRITIQUE (Réflexions sur la). *Hist. des Mollusques*, II, 221.

CROCUTA. Espèce d'hyène. Sa description, XXVII, 32.

CROCODILE (le). Mouvement de ses mâchoires, XVIII, 398. — *Hist. des Reptiles*, I, 39, VIII, 298. — Sur l'os de la base de son crâne. *Hist. des Reptiles*, I, 27. — Sa face, 32. — Ses dents, 40. — Leurs différentes grandeurs, 63 (note). — Sa voix, 181. — Soins qu'il a de ses nids, 252. — Il est susceptible d'être apprivoisé, 275. — Idées superstitieuses des Egyptiens sur le crocodile, 293. — *Idem.* des Indiens, I, 295; II, 374. —

GÉNÉRALE.

291

— Description du crocodile, 327, 332. — Sa langue, 333. — Suite de sa description, 334. — Sa queue, 335. — Ses pieds et sa couleur, 336. — Lieux qu'il habite, 337, 338. — Audace des crocodiles; fait à ce sujet, 340. — Combat entre deux crocodiles, 341. — Leur accouplement, 342. — Leur ponte et leurs œufs, 343. — Naissance des petits, 344. — Leur réunion en troupes, 345. — Massacre qu'ils font des poissons, 352. — Durée de leur vie et leurs habitudes, 353. — Sur leur engourdissement, 357. — Quels sont leurs ennemis, 358. — Guerre que leur font les nègres pour se nourrir de leur chair, *idem*. — Manière dont les habitants du Paraguay prennent le crocodile, 360. — Caractères principaux que donne Cuvier à tous les crocodiles, 361. — Il établit deux espèces, le crocodile et le caïman, 363. — Leur nombre est plus considérable qu'il ne l'a cru, 365. — 1^{re} section: crocodiles proprement dits, 366. — Celui du Nil, 367. — Ses caractères distinctifs, 369. — Sa description, 371. — Sa couleur, 373. — Si on peut apprivoiser les crocodiles, 376, 380. — Leur longueur, et celui du Sénégal, 377. — Le crocodile noir, 381. — Le crocodile indien, 382. — Deuxième section: crocodiles gavials, ou à longues mâchoires, 385. — Leurs espèces, 386. — Le crocodile à long bec, ou le petit gavial, 389. — Ses dimensions 392. — Le crocodile à bec étroit, ou le grand gavial, 393. — Ses dimensions, 396. — 3^e section: crocodiles caïmans, 397. — Le crocodile caïman; sa description, 399. — Ses dimensions, 406. — Le crocodile yacaré, 407. — Deux espèces, 411. — Le crocodile de Mississipi, 412. — Sa description, 413. — Le crocodile à large museau, 417. — Ses dimensions, 419. — Genre 2 des sauriens: la dragone, 421. *Voyez* ce mot. — Sur les dents des crocodiles, VIII, 288. — Les crocodiles fossiles, 293. — Additions à l'histoire naturelle des crocodiles; détails donnés par Humboldt sur les crocodiles, 301. — Addition à l'article du crocodile yacaré, 304. — *Voyez* la Table méthodique, 349.

CROISEMENT DE RACE. XXIX, 160 (note). *Voy.* RACES.

CROISSETTE VELUE. *Hist. des Plantes*, XIII, 545.

T 2

CROISEURS (les). Nom que les marins donnent aux hirondelles de mer, lorsqu'elles sont grandes, LX, 81 (note).

CROISSANT (le). 21^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 117, 195. — 7^e espèce du genre des poissons appelés *pomacentres*, XI, 177, 184.

CROISSANT (le). Moineau du Cap de Bonne-Espérance, XLVII, 192.

CROKER (la). 6^e espèce du genre des poissons appelée *sciènes*. *Hist. des Poissons*, X, 334, 343.

CROTAL. Voy. BOQUIRA et Serpent à sonnettes.

CROTALAIRE. Genre 37 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 293.

CROTALES (les). 7^e genre des serpens de la classe des ophidiens. *Hist. des Reptiles*, V, 297. — Leur description, 299. — Dangers de leurs morsures, 301. — Leurs habitudes, 302. — Le crotale durissus, 304. — Sa description, 305. — Celle par Latreille, 307. — Ses variétés, 310. — Le crotale boiquira de l'Amérique méridionale, 311. — Sa description, 312. — Le crotale à queue noire, 316. — Le crotale bruyant, 318. — Le crotale camard, 321. — Le crotale à losanges, 323. — Sa description, 324. — Le crotale miller, 328. — Sa description par Mauduyt, 329. — Autre espèce, et ses habitudes, 332. — Tableau méthodique des crotales, VIII, 386.

CROTONS (les). Genre 24 de la famille des euphorbes ; 50 espèces. *Hist. des Plantes*, X, 6. — Description de leurs fleurs, et comment on les appelle, 7. — Espèces remarquables, celle cascarille, 8. — Ce qu'en dit Lamarck, et utilité de son écorce en médecine, 9. — Le croton balsamifère, *idem*. Le croton porte-laque, celui cathartique, 11. — Ses propriétés médicinales, 12. — Le croton à teinture ou tournesol, vulgairement la maurelle des Languedociens, 13. — Comment on obtient la teinture qu'on en retire dans le commerce, et comment on fait en Languedoc le tournesol en drapeau, 14. — Comment on obtient le tournesol en pain ; procédé de Chaptal, 16. —

52 espèces connues, *idem.* — Voyez les additions, 425.

CRUCIANÈLLES (les) Genre 7 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 341. — 4 espèces de France, 342. — Neuf espèces connues, 343.

CRUCIFÈRES (les), *cruciferae*. 12^e ordre, famille 84 de la 4^e classe des plantes dycotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes* V, 350; XVIII, 22. — § 1. Fruits siliqueux; styles nuls. Genre 1, raifort, 23. — Genre 2, moutarde, 25. — Genre 3, chou, 28. — Genre 4, turquette, 33. — Genre 5, julienne, 34. — Genre 6, héliophila, 36. — Genre 7, giroflée, 37. — Genre 8, vélar, 41. — Genre 9, sisymbrium, 43. — Genre 10, cresson de fontaine, 46. — Genre 11, cresson, cardamine, 47. — Genre 12, dentaire, 50. — Genre 13 ricotia, 51. — § 2. Fruit siliqueux, un style. Genre 14, lunaire, 52. — 15^e biscutella, 53. — 16^e; joncthlaspî, 55. — 17^e, alysson, 56. — 18^e, subulaire, 75. — 19^e, drave, 58. — 20^e, cochléaria, 60. — 21^e, iberis, 62. — 22^e, thlaspi, 64. — 23^e, passerage, 67. — 24^e, jérose, ou rose de Jéricho, 69. — 25^e, vella, et 26^e, caméline, 71. — 27^e, bunias, 74. — 28^e, chou-martin, 75. — 29^e, guède ou pastel, 77.

CRUCITE. Espèce de pierre, XVI, 288.

CRUCITE (la). Genre 21 de la famille des plantes arroches, *Hist. des Plantes*, XI, 64. — Espèce connue, 65.

CRUSTACÉS (les). Dans quelle classe il faut les ranger. *Hist. des Insectes*, I, 43. — Différentes espèces, 45. — Familles naturelles des genres; plan tracé. III, avertissement, pag. viij. — Des veines, des nerfs, et respiration s'opérant par des branchies, 13. — Leur organisation est supérieure à celle des insectes proprement dits, IV, 5. — Leur organisation extérieure, 6. — Si les entomostracés ou insectes à coquille doivent être compris avec les crustacés, 7. — Ce qu'on entend par ce mot, 9. — Définition des crustacés, 10. — Ligne de démarcation qui les sépare des insectes, 11, 12, 18. — Division des crustacés en entomostracés, et en malacostracés. Voyez ces mots. — Caractères extérieurs des

crustacées, suivant M. Lefrancq. V, 12. — Caractères intérieurs, 24. — Ce qu'en dit Cuvier, 28. — Ce qu'il dit des organes de leur mouvement, de leur queue, 87. — Ses muscles, 89. — Leurs pattes, 93. — Muscles des pattes, 96. — Leur système nerveux, 98. — Leur peau et le sens de l'ouïe, 101. — Leurs habitudes, 102. — Ce qu'en dit Aristote, 103. — Leur accouplement et tems de leur fréquentation, 105. — Leur séjour ordinaire, 108. — Lieux où on les trouve plus communément, 114. — Durée de leur vie, 115. — Causes de leur destruction, 116. — Quels sont ceux qu'on mange le plus communément, 118. — Sur leur pêche, 121. — Auteurs qui ont écrit sur ces insectes, 149. — Division des crustacés, d'après Lamarck; système des animaux sans vertèbres: 1^o crustacés pédiocles, 163. — 2^o sessiliocles, 169. — Ce que dit Bosch des premiers et des seconds de ces insectes, 172. — Division des crustacés sessiols, 174. — Exposition sommaire des caractères génériques des crustacés et des insectes. 1^o Des crustacés, 183. — Rapports des familles des crustacés et des insectes, par les professeurs Cuvier et Duméril. *Voyez* CRABES.

CRUSTOLES (les) ou ruellies. Genre 5 des plantes dites acanthes. *Hist. des Plantes*, XV, 102. — Espèces remarquables; la crustole blechne et la crustole bruyante, 103. — Celle tubéreuse, celle odorante, celle balsamique, 104. — 59 espèces connues, 105.

CRYPSES (les). Genre 5 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 107. — Espèces de France et espèces connues, 108.

CRYPTOCÈRES (les). Insectes du genre des fourmis. *Hist. des Insectes*, III, 357. — Genre 368 de la famille des fourmis, XIII, 260.

CRYSOBALANUS. *Voy.* ICAQUE.

CRITHMUM. *Voy.* BACCILLE.

CRYPTOGAMES, plantes. Observations. *Hist. des plantes*, III, 31. — Ordre 1^{er}, leur caractère, 34. — Famille 1^{re}, les champignons; 35. — Famille 2, les algues, 75. — Famille 3, les hépatiques, 113. — Familles 4 et 5, les mousses et les lycopodes, 126. — Fa-

mille 6 et 7, les fougères et les prêles, 166. — Famille 8, les naiades, 223.

CUBLA (le), par Sonnini. Espèce de pie-grièche de la côte orientale du midi de l'Afrique, XXXIX, 346. — Ses habitudes, 347.

CUCUBALE ou CARNILLET. Genre 24 des plantes dites cariophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 140. — 7 espèces et leurs propriétés, 141.

CUCUJE, *cucujipes*. Insectes particuliers. Ex. *Cucujus clavipes*. *Hist. des Insectes*, III, 210. — Famille 31, V, 255. — Genre 211 d'insectes; leur description, XI, 254. — Sept espèces, 255. — Famille 33 des insectes; genre 210, les parandres, 252. — Genre 211, les cucujes, 254. — Genre 212, les uleiotes, deux espèces, 257.

CUCULLÈS (les). Genre 155 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 400. — Deux espèces, 402.

CUCURBITACÈS (les). Voy. COURGES. *Hist. des Plantes*, XIV, 345.

CUCUS (le) ou cusos. Animal des Indes orientales, XXVIII, 51, 54.

CUIL (le). Oiseau de Malabar, de l'espèce des coucous, LIV, 37. — Remarques de Sonnini sur cet oiseau, 38 (note).

CUIR DE MONTAGNE. Espèce de talc; disposition de ses filamens, XIII, 242.

CUJUACU-APARA, et cujuacu-été. Deux espèces de chevreuils du Brésil. Leur description, XXIV, 173.

CUIRA CANTARA (le). Oiseau du Brésil, du genre des coucous, LIV, 104.

CUIRIRI (le), ou le bentaveo. 4^e espèce des tyrans, oiseaux gobe-mouches, L, 236. — Sa description, par Marcgrave, 237.

CUIT (le), ou le rolhier de Mindanao. Espèce d'oiseau, XLIV, 303.

CUIVRE. Manière de le travailler, X, 366. — Du cuivre primitif, XI, 223 — Sa conversion en verd-de-gris ou verdet, 227. — Ses mines. Voy. MINES DE

CUIVRE. Fait qui prouve le passage du cuivre natif aux mines secondaires, 233 (note). — En quoi le cuivre diffère de l'or et de l'argent, 236. — Travail des anciens sur le cuivre, 237. — Sur le cuivre jaune, 239. — Union du cuivre avec l'or, et comment on l'en sépare, 240. — Son alliage avec l'étain, 241. — Son affinité avec le fer, 243, 245. — Sur le cuivre de cémentation, 244. — Moyens d'unir le mercure et le cuivre, et manière dont on l'emploie, 246. — Son alliage avec le zinc, 247. — Ses autres propriétés, 250. — Sa fusion, 249, 251. — Sa dissolution par les acides, 253. — Action du soufre sur le cuivre, 256. — Moyen qu'on emploie pour extraire le cuivre des mines, 253. — Son raffinage, 320. — Sa transmutation en argent, XII, 83. — Concrétions du cuivre, XIV, 154. — Minerais cuivreux, 155. — La malachite est la plus belle de toutes les minéralisations du cuivre, 157. — La pierre arménienne est une concrétion du cuivre, 158. — Comment se présentent ses concrétions les plus riches, 162. — Du cuivre et de ses espèces, XVI, 154.

CUJA (le). Quadrupède du Chili, ressemblant au furet, par Sonnini, XXXIII, 21.

CUJELLIER (le). En quoi cet oiseau diffère de l'alouette commune, L, 296. — Ses rapports avec elle, 300. — Saisons où on le chasse, 302.

CUL BLANC. Oiseau de nos campagnes. Voyez le MOTTEUX.

CUL-D'OR (le). Espèce de merle de l'Afrique, par Sonnini, XLVI, 197.

CUL JAUNE (le petit) de Cayenné. Oiseau de l'espèce des carouges, XLV, 217.

CULM. Nom de la troisième espèce de charbon de terre qui se trouve en Angleterre, dans le Glamorganshire, IX, 123.

CULOTTE. Ce que signifie ce mot en fauconnerie, XXXIX, 149.

CULPEU (le). Quadrupède du Chili, par Sonnini, XXXIII, 200. — Sa ressemblance et ses différences avec notre renard, 202.

CUL-ROUSSET (le). Oiseau du Canada, de l'espèce du bruant, XLIX, 101.

CUMA. Arbre de la Guiane française, dont le suc épais et durci forme, suivant M. Aublet, l'ambre gris, IX, 265.

CUMARCA (le). 3^e espèce des poissons osseux dits stromatées. *Hist. des Poissons*, VI, 206.

CUMBERLAND (le). 30^e espèce du genre des poissons appelés salmons. *Hist. des Poissons*, XII, 118, 206.

CUMIN. Genre 19 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 279.

CUNILA. Voy. CONICLÉS (les).

CUNING (le). 36^e espèce du genre des poissons appelés spars. *Histoire des Poissons*, IX, 386; et X, 90.

CUNNIGHAMIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 57.

CUNONIA. Genre 8 des plantes dites saxifragées. *Hist. des Plantes*, XVI, 349.

CUPANIA. Genre 15 des plantes savonnières. *Histoire des Plantes*, XVIII, 306.

CUPÉS. Insecte du genre des malacodermes; *Cupes capitata*. *Hist. des Insectes*, III, 104. — Genre 38 d'insectes, et 2^e espèce de la famille des malacodermes, IX, 84. — Une espèce, 85.

CURPEA. Genre 11 des plantes dites saffraînées. *Hist. des Plantes*, XVII, 31.

CURIDONES (les). *Cadmanche*. Genre 29 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 43. — Deux espèces de France, 44. — 3 espèces connues, 45.

CURACAO (le). 2^e espèce du genre des poissons appelés chétodons. *Histoire des Poissons*, XI, 105, 126.

CURATELLA. Genre 10 des plantes magnolières. *Hist. des Plantes*, XVIII, 372.

CURCULIÆO (le) orchioïde. Genre 14 des plantes appelées mérendères. *Hist. des Plantes*, VIII, 253. — Une espèce connue, 254.

CURCULIONITES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 195.

CURCUMA (le). Genre 10 des plantes dites balisiers. *Hist. des Plantes*, IX, 204. — Espèces remarquables, le curcuma à racines rondes, celui à racines longues, ou le safran d'Inde, 205. — Espèces connues, 206.

CUREU (le) Espèce d'étourneau, par Sonnini. XLV, 103. — Ses habitudes et sa description, par Molina, 106.

CURIMATE (le). Espèce du genre des poissons appelés characins. *Hist. des Poissons*, XII, 261, 272.

CUSCHISCH (le). Oiseau de la baie d'Hudson, du genre des bruans, XLIX, 143.

CUSCUTE. Genre 9 des plantes dites liserons. *Hist. des Plantes*, XVI, 118. — 2 espèces et leurs qualités, 119.

CUSSITE (la). Espèce de pierre, XVI, 290.

CUSSONIN. Genre 4 des plantes dites aralies. *Hist. des Plantes*, XVI, 252.

CUVIER (la raie). 23^e espèce. Voy. le mot RAIE.

CUY (le). Quadrupède décrit par Molina, et qui est le même que le cori et l'aperea, XXVI, 168.

CYAME. Insecte du genre des crevettes; ex. *oniscus ceti*. *Hist. des Insectes*, III, 39. — Genre 36 des crustacés, que les pêcheurs désignent sous le nom de poux de baleine. VI, 328. — Leur description, 329.

CYANELLES (les). Genre 15 des plantes dites asphodèles. *Hist. des Plantes*, VIII, 358. — 4 espèces connues, *idem*.

CYANOPTÈRES (les). 5^e espèce du genre des poissons dits chéilodiptères. *Histoire des Poissons*, IX, 318, 325.

CYATHUS. Genre 7 des plantes dites algues: 8 espèces. *Hist. des Plantes*, III, 92.

CYCAS (les). Genre 18 des plantes fougères. *Hist. des Plantes*, III, 214. — Genre 2 des plantes palmi-fougères, VII, 395. — Espèces remarquables et espèces connues, 398.

CYCHRE. Insecte du genre des métalliques; ex. *cy-chrus rostratus*. *Histoire des Insectes*, III, 90. — Genre 22 des insectes dits coléoptères, VIII, 287. — Espèce 1^{re}, celui muselier, 288. — 2^e, celui trompe. — 3^e, celui relevé, 289. — 4^e, celui unicolor, 290.

CYCLADE (la). 145^e espèce des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 366. — Leur animal, 367. — 2 espèces, 370.

CYCLAMES (les). Genre 20 des plantes dites lysimachies. *Hist. des Plantes*, XIV, 392. — 2 espèces de France, 393. — 5 espèces connues, 394.

CYCLOPE, *cyclops quadricornis*, insecte particulier. *Hist. des Insectes*, III, 18. — Sa définition, par Muller, IV, 256. — Description de celui quadricorne, 257. — Son mouvement dans l'eau, 259. — Sur les œufs de la femelle, 260. — Lieu que les cyclopes habitent, 262. — 13 espèces, *idem*. — Lieux où se trouve le cyclope quadricorne, 264. — Le cyclope noire, celui bleu, 265. — Le cyclope rougeâtre, celui lacinulé, et celui longicorne, 266. — Celui captif et celui minaticorne, 267. — Celui porte-massue, et celui cronicorne, 268. — Celui courte corne, et celui che-liféré, 269. — Celui brévicorne, 270.

CYCLOPTÈRES (les). Genre 16 des poissons cartilagineux. *Hist. des Poissons*, V, 243. — Le cycloptère lompé, 1^{re} espèce, 247. — Constance supposée de ses amours, et soin de ses petits, 249. — Ses formes et ses habitudes réelles, 251. Le cycloptère épineux, 256. — Le cycloptère menu, 258. — Le cycloptère double-épine, 4^e espèce, 260. — Le cycloptère gélatineux, celui denté et celui ventru, 262. — Description du denté, 265. — Le cycloptère bimaculé; sa description, 268. — Le cycloptère spatule, 269. — Le cycloptère souris, 270. — Le cycloptère barbu, celui liparis et celui rayé, 272.

CYCLOSTOME (le). 8^e espèce du genre des poissons appelés mulles. *Histoire des Poissons*, IX, 65 et 92. — On appelle du même nom la 14^e espèce des poissons dits bodians, X, 304. — Genre 51 des mollusques

diets gastéropodes. V, 295. — Leur description, 296. — 5 espèces, 297.

CYDONIA. Voyez COÏGNASSIER.

CYGNE (le). Sa synonymie, LXI, 55. — La douceur de son naturel, 57. — Les graces de sa figure, et la beauté de sa forme, 58. — Il est non-seulement le premier des navigateurs ailés, mais même le plus beau modèle que la nature ait offert pour l'art de la navigation; sa manière de nager, 61. — Sa jalousie relative à sa blancheur, et anecdote à ce sujet, 62 (note). — Son indépendance, 63. — Il fait l'ornement de toutes les pièces d'eau, 64. — Il nage et vole très-vite, 66. — Sa nourriture, 67. — Sa force, 68. — Durée de sa vie, 70. — Ponte de la femelle, 71. — Soins qu'elle prend de ses petits, 72. — Sa prétendue pudeur, *idem* (note). — Courage du mâle pour la possession de sa bien-aimée, 73 (note). — Ses habitudes de paix, 75. — Education des petits, 76. — Lieux que le cygne habite de préférence, 77. — Ses voyages, 80. — Différences entre le cygne sauvage et le cygne privé, 87. — Bec des uns et des autres, 91. — Chair du cygne, 92. — Organes de sa voix, 93. — Son de sa voix, 95. — Observations de MM. Arnaud et Mongéz, sur les cygnes chanteurs de Chantilly, 96 et 98 (notes). — Chant du cygne à l'agonie, 101. — Le cygne à tête noire, 106. — Singularité de la femelle à l'égard de ses petits, 107. — Le cygne noir de la nouvelle Hollande, 108. — Le cygne cendré du même pays, 110. (Ces trois derniers cygnes sont décrits par Sonnini).

CYCNUS (les) de la Fable, LXI, 74, (note).

CYLAS. Insecte du genre des récticones; ex. *Brenatus bruniteus*. *Hist. des Insectes*, III, 196. — Genre 182 d'insectes, XI, 80. — Celui brun, 81.

CYLLENIE. Espèce de papillon; ex. *Cyllenia maculata*. *Hist. des Insectes*, III, 429. — Genre 482 d'insectes de la famille des bombylières, XIV, 298, 301.

CYMBACHNÉE (la) cilée. Genre 31 des graminées, *Hist. des Plantes*, VII, 210.

CYMBAIRES. Genre 14 des plantes dites personnées, XVI, 15.

CYMBIDIUMS (les). Genre 17 des plantes dites orchidées. *Histoire des Plantes*, IX, 220. — Espèces remarquables, le cymbidion écarlate, 222. — Le cymbidion linéaire, 223. — Le cymbidion nouveau, 224. — Celui à capuchon, 225. — Celui écrit, 226. — Celui nain, 227. — Une espèce de France, 43 espèces connues, 228.

CYMBIUM. Nom sous lequel Gualtieri décrit l'argonaute nautille papiracé. *Hist. des Mollusques*, III, 171. — Sur le petit cymbium publié et gravé par Gualtieri, IV, 60.


CYME (la). Ce que c'est dans la fleur. *Histoire des Plantes*, II, 201.

CYMOTHOA. Insecte du genre des asellottes ; ex. *Cymothoa asilus*. *Hist. des Insectes*, III, 42. — Insecte du genre des polygonates, V, 152 ; VI, 375. — Différence de cet insecte avec les aspheromes, VII, 12. — Réunion en une seule espèce des cymothoa *assimilis* et *serrata*, 16. — 4^e genre des insectes, 18. — Auteurs qui les ont décrits, 19. — Leur description, par Bosc, 20. — Espèces : 1^o le cymothoa imbriqué. — 2^o le cymothoa asile, 23. — 3^o celui ostre. 4^o celui en faulx. — 5^o celui paradoxé, 24.

CYNANCHUM. Genre 14 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 179. — 2 espèces, et leurs propriétés, 180.

CYNAROCÉPHALES (les). Plantes composées. *Hist. des Plantes*, IV, 308. — §. 1. Cynarocéphales vraies, écailles ou folioles de l'involucre épineuses, *idem*. — §. 2. écailles ou involucre sans épines, 313. — §. 3. involucre contenant une ou quelques fleurs agrégées, 316. — 2^e division des plantes composées, d'où leur vient ce nom. XII, 55. — cynarocéphales vraies. Un seul involucre. Genre 32, les onoserides, 56.

CYNIPS, cinipsères. Voy. CINIPS, p. 229.



CYNOCEPHALE (le). Espèce de singe, le même que le pithèque, XXXV, 178. — Histoire du petit cynocéphale, 220. — Le singe noir, espèce de cynocéphale, par Latreille, 270. — C'est le même animal que le singe cochon, ou le *simia porcaria*, 271.

CYNODON (le). 50^e espèce des poissons appelés *sbares*. *Hist. des Poissons*, IX, 392, et X, 106.

CYNOGLOSSE. Genre 25 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 105. — Ses usages, 106.

CYNOMETRA. Genre 20 des plantes dites légumineuses. *Histoire des Plantes*, XVII, 270.

CYRTANTHES (les). Genre 4 de la famille des narcisses. *Hist. des Plantes*, IX, 14. — 3 espèces connues, 15.

CYPHIES (les). Genre 11 des plantes dites campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 220. — 6 espèces connues, *idem*.

CYPRÈS (les). Genre 5 de la famille des plantes dites conifères; 8 espèces *Hist. des Plantes*, X, 192. — Le cyprès commun, 194. — Celui horizontal, 195. — Celui chauve, 196. — Dimensions de ces arbres, 197. — Sur leur bois, 198. — Lieux où l'on trouve les plus beaux, 199. — Le cyprès faux-thuya, 200. — Espèce de France, 8 espèces connues, 201.

CYPRIN doré de la Chine (Remarque sur le). *Hist. des Poissons*, II, 80. — Genre 211 des poissons. Premier sous-genre; 1^{re} espèce, le cyprin carpe, XIII, 76. *Voyez* CARPE. — Le cyprin barbeau, 76. *Voyez* ce dernier mot. — Le cyprin spéculaire, et le cyprin à cuir, 3^e et 4^e espèces, 76, 77, 123. — Le binny, 5^e espèce, 77, 124. *Voy.* ce mot. — Le bulat-mai, 6^e espèce, 77. *Voy.* ce mot. — Le cyprin murse, *idem*. — Le cyprin rouge-brun, 78. — 2^e sous-genre, le cyprin goujon, et le cyprin tranche, *idem*. *Voy.* ces deux noms. — Le capoet. *Voy.* ce mot, 79. — Le tanchor. *Voyez* ce mot, *idem*. — Le voncoudre. *Voy.* ce mot, *idem*. — Le verdâtre, *idem*. et 139. — Le cyprin Anne Caroline 80. — Sa description, 141. — Le cyprin

mordoré, *idem.* — Sa description, 143. — Le cyprin verd-violet, 80. — Sa description, 144. — 3^e sous-genre, le hamburge, 81. *Voy.* ce mot. Le céphale, *idem.*, 148. — Le soyeux, *idem.* — Le zeelt, *idem.*, 149. — 4^e sous-genre, le cyprin doré, 82. — Sa nomenclature, et usages qu'en tirent les Chinois, 151. — Son origine, 154. — Comment on l'élève, 155. — Tens de son frai, 157. — Ses couleurs, *idem.* — Le cyprin argenté, 82, 159. — Le cyprin télescope, *idem.* — Le cyprin gros-yeux, et celui à quatre lobes, 83, 160. — L'orphe. *Voy.* ce mot, 83. — Le cyprin royal, 84, 161. — Le cyprin caucis, le malchus et le jule, 84, 163. — Le gibèle, *idem.* ; le goleian, 85. — Le labeo, le leptocéphale et le chalcioide, *idem.* — Le clupéioide, 86, 165. — Le galien, 86, 170. — Le nilotique, 86, 172. — Le gonoryngue, 86, 173. — Le veron, 87, 174. — L'aphye, 87, 179. — La vaudoise, 87, 180. — Le dobule, *idem.* — Le cyprin rougeâtre, 88, 181. — Le cyprinide, *idem.*, 88, 182. — Le cyprin buggenhagen, 88, 183. — Le rotengle, 88, 184. — Le jesse, 89, 186. — Le nase, 89, 194. — L'aspe, 89, 195. — Le spirilin, 90, 196. — Le bouvière, 90, 197. — Le cyprin américain, 90, 198. — L'able, *idem.* — Le vimbre, 91, 201. — Le brème, *idem.* — Le couteau, 91, 205. — Le farène, 92, 206. — Le cyprin large, 92, 207. — Le sope, 92, 208. — Le chub, 93, 212. — Le catostome, *idem.* — La morelle, *idem.* — Le cyprin frangé, 93, 212. — Le faucille, 94, 213. — Le bossu, *idem.* — Le commersonnien, *idem.* — Le sucet, 95, 213. — Le pigo, 93, 214.

CYPRINOÏDE (le). 7^e espèce du genre des poissons appelés *mormyres*. *Hist. des Poissons*, XIII, 225 et 231.

CYPRIPÈDES (les) ou SABOTS. Genre 26 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 268. — Une espèce de France, 8 espèces connues, 269.

CYPRIS. Insectes particuliers. *Histoire des Insectes*, III, 17. — Leur description, IV, 232. — Leurs pattes et leur queue, 235. — Lieux qu'ils habitent, et comment ils nagent, 237. — Changement de leur

peau, 238. — Il y en a dix espèces, 240. — La cypris découverte, 241. — La cypris ornée, 242. — La cypris lisse, 243. — La cypris fasciée, 244. — La cypris rayée, et celle veuve, 245. — La cypris coquillière, 246. — La cypris velue, celle solitaire et celle épaisse, 247. — La cypris blanche, 248.

CYRILLA. Genre 1 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 228.

CYRILLE (la) élégante. Genre 8 des plantes dites campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 215. — Une espèce connue, 216.

CYRTANDA. Genre 24 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 35.

CYRTHE. Insecte papillon; ex. *Empis acephala*. *Histoire des Insectes*, III, 431. — Genre 483 d'insectes de la famille des vésiculeux, XIV, 313, 314.

CYTHÉRÉES (les). Insecte particulier. *Histoire des Insectes*, III, 17. — Leurs rapports avec les cypris, IV, 249. — Leur description, 250. — La cythérée verte, 252. — La cythérée jaunâtre et celle blonde, 253. — La cythérée bossue et celle voûtée, 254.

CYTHÉRÉES (les). Genre 136 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 536. — Deux espèces, 537.

CYTISE. Genre 36 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 290. — 5 espèces, 291. — Leurs propriétés, 292.

CZIGITHAI (le). Mulet fécond de Tartarie, XXII, 339. — Il a de l'analogie avec le zèbre, XXIX, 367. — Avec l'onagre ou l'âne sauvage de l'Asie, 369. — Idées de M. Forster à ce sujet, 370. — Observations de M. Pallas, 373.

D.

DABOIE (le), ou SERPENT IDOLE. Couleuvre adorée par les nègres d'Afrique. *Hist. des Reptiles*, I, 287.

DACNÈS (les). Noms d'insectes du genre de l'ips; ex. *Engis humeralis*. *Hist. des Insectes*, III, 132. — Genre 88, et 1^{re} espèce de la famille des nitidulaires, X, 13. — 4 espèces, *idem*.

DACTYLIER (les). Genre 51 des plantes dites graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 249. — Espèce remarquable, le dactylier pelotonné, 250. — 10 espèces de France, et 13 connues, 251.

DACTYLOPTÈRES (les). Genre 94 des poissons osseux; leurs caractères distinctifs; dix espèces. *Hist. des Poissons*, VIII, 420. — Le dactyloptère pirapède, 1^{re} espèce, 421. — Le dactyloptère japonais, 2^e espèce, 431.

DAHLIES (les). Genre 158 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 154. — 3 espèces connues, 155.

DAIM (le). Variétés qu'il a subies, XXII, 338. Sa synonymie, XXIV, 134. — Lieux où on le trouve, 135. — Ses variétés, 141. — Dans les parcs les daims forment deux troupes séparées, et souvent ils se battent, 143. — Leurs connoissances, leurs ruses et leurs habitudes, 144. — Durée de leur vie, 146. — Addition à leur article, par Sonnini, 147. — Renfermé, le daim devient méchant et farouche, 150. — Force singulière d'un daim, 151. — Habitudes de deux daims venus d'Hollande, 152. — Irrégularités dans la forme des bois du daim, 153. — Description d'un daim particulier, *idem*.

DAIS (le). Genre 9 de la famille des arbustes thymélées. *Hist. des Plantes*, XI, 184. — Espèce remarquable, le dais à feuilles de fusset, *cotinofolia*, 185. — 5 espèces connues, 186.

DALBERGIA. Genre 79 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 372. — 2 espèces, 373.

Tab. TOME I.

V

DALEA. Genre 43 des plantes légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 303.

DALECHAMPES (les). Genre 38 de la famille des plantes euphorbes; leur description. *Hist. des Plantes*, X, 57. — 11 espèces connues, 58.

DAMAN (le), ou L'AGNEAU D'ISRAËL. 4^e espèce des animaux dits gerboises; ce qu'en dit le docteur Shaw, XXXII, 250. — Remarques à ce sujet, de M. Allamand, 266. — Sa description, par le chevalier Bruce, 281. — Lieux où on le trouve, 283.

DAMASSER. Opération qu'on pratique sur l'acier, X, 416 (note.)

DAMIER (le). 2^e espèce des oiseaux dits petrels, LXII, 264. — Son bec, 265. — Lieux qu'il habite, 266. — Ses habitudes, 271. — Celui antarctique, ou damier brun, 3^e espèce, 275. *Voy. PETRELS* (les).

DAMIERS (les). Espèce de papillon; *Papilio violæ. Histoire des Insectes*, III, 395.

DANAÏDES (les). Genre 45 des plantes dites rubiacées. *Histoire des Plantes*, XIV, 28. — 2 espèces connues, 29.

DANAÏDES AGRÉABLES, *danai festivi*. Espèce de papillons; ex. *Papilio plexipus*, *chrysippus*. *Hist. des Insectes*, III, 389. — Danaïdes blanches, *danai candidi*; ex. *Papilio crisia*, 396. — 3^e tribu de la division des insectes appelés *papillonides*, XIV, genre 426, la danaïde plexipe, 108.

DANBIK (le). Oiseau de l'Abissynie, et espèce de sénégal, XLVII, 353.

DANT ou **LANT**. Quadrupède. Espèce pareille au zébu, XXIX, 215. *Voy. ZÉBU*.

DAOURITE. Espèce de pierre, XVI, 286.

DAPHNÉS (les). Genre 3 de la famille des plantes dites thymelées. *Hist. des Plantes*, XI, 164. — Espèces remarquables, le daphné bois-gentil, 166. — Son usage en médecine, 167. — Le daphné laurier, et celui de Gnide, 168. — Le daphné odorant, 169. — Le daphné des collines, 170. — Le daphné *cneorum*, 171. — 7 espèces de France, 172. — 24 espèces connues, 173.

DAPHNIES (les). Insectes particuliers ; ex. *Daphnia pennata*. *Hist. des Insectes*, III, 17. — Conformité des daphnies avec les lyncées, IV, 211. — Leur description, *idem*. — Leur œil ; ce qu'en dit de Geer, 212. — Leurs pattes, 213. — Particularités sur cet insecte, 215. — Leur mode d'accouplement ; ils sont vivipares, 219. — Leurs habitudes, 220. — Comment ils nagent, 222. — La daphnie puce ; sa description, 223. — Observation de M. Jussieu sur cet insecte, 224. — La daphnie à longue épine, 226. — La daphnie quadrangulaire, 227. — La daphnie camuse et celle bec-droit, 226. — Celle bec-court, 229. — La daphnie pointue et celle cristalline, 230. — La daphnie sétifère, 231.

DAREA. Genre 15 des plantes fougères. *Hist. des Plantes*, III, 213 ; IV, 67.

DARNIS (les). Genre 297 d'insectes de la famille des cicadaïres. *Hist. des Insectes*, XII, 336. — 2 espèces, *idem*.

DASCILLE (le). Insecte du genre des crébrionates ; ex. *Atopa cervina*. *Hist. des Insectes*, III, 97 ; VIII, 384. — Son caractère, 385. — 3 espèces, le dascille cerf, 386. — Celui cendré et celui livide, 387.

DASYPODE (le). Insecte du genre des andrenettes ; ex. *Andrena hirtipes*. *Hist. des Insectes*, III, 375. — Genre 412 d'insectes, XIII, 358.

DASYPOGONS (les). Genre 496 d'insectes de la famille des asiliques. *Hist. des Insectes*, XIV, 307.

DASYTE. Insecte du genre des malacodermes ; ex. *Dasytes niger*. *Hist. des Insectes*, III, 108. — Genre 46 des insectes, 10^e espèce de la famille des malacodermes. IX, 127. — Leur description, 128. — 11 espèces, 129.

DATTIER, ou **MOINEAU DE DATTE**, XLVII, 151.

DATTIERS (les), *phœnix*. Genre 3 des palmiers. *Hist. des Plantes*, VIII, 25. — Celui commun, *phœnix dactylifera*, 26. — Patrie et culture de ce dattier, 27. — Ce que forment, avec cet arbre, les nations de l'Asie et de l'Afrique, 28. — Sa distribution et sa multiplication, 29. — Sa fécondation, 30. — Fait qui prouve que les

fleurs des dattiers mâles conservent très-long-tems leur vertu fécondante, 32. — Description, par Pline, de l'usage de les féconder artificiellement, *idem*. — Ce qu'ont écrit sur le même sujet Théophraste et Pontanus, 33 et 34. — D'où provient cette fécondation, 35. — Opération pratiquée à ce sujet, en Espagne, sur les dattiers mâles, 36. — Récolte des fruits, 37. — Les différentes espèces de dattes, 38. — Usages dont elles sont, 39. — Sur le lait du dattier, 40. — À quoi on emploie son tronc et ses feuilles, 41. — 2 espèces connues, 42.

DATURA. *Voy.* POMME ÉPINEUSE.

- **DAUBENTON** (le). 8^e espèce des poissons caranx, *Hist. des Poissons*, VII, 420, par Lacépède.

DAUCUS. *Voy.* CAROTTE.

DAUMA (le). Espèce de merle de l'Inde, XLVI, 249, par Sonnini.

DAUPHIN, plante. *Voy.* DELPHINIUM.

DAUPHINS (les). 2^e ordre, 9^e genre des cétacées. 1^{re} espèce, le dauphin vulgaire, 2^e espèce, le dauphin marsouin. *Hist. des Cétacées*, pag. 39. — 3^e, le dauphin orgue. — 4^e, le dauphin gladiateur. — 5^e, le dauphin nésarnack, 40. — 6^e, le dauphin diodon. — 7^e, le dauphin ventru. — 8^e, le dauphin ferés. — 9^e, le dauphin de *Duhamel*, 41. — 10^e, le dauphin de *Péron*. — 11^e le dauphin de Commerson, 42. — Synonymie de la première espèce ou du dauphin vulgaire, 356. — Mers où on le trouve, 357. — Combien le dauphin a prêté à l'imagination et à la fable, 359. — Formes générales et proportions du dauphin vulgaire, 360. — Disposition des mâchoires et des dents, 361. — Sa langue, ses évents, 362. — Le canal auditif, 363. — Finesse de son ouïe, 364. — Sa voix, 365. — Sa charpente osseuse, 366. — Ses vertèbres, 367. — Ses parties internes, 370. — Ses bras, 371. — Leurs muscles, 372. — Son toucher, 374. — Son cerveau, 375. — Son odorat, 376. — Sa natation, 378. — Sa nageoire dorsale, 379. — Fréquence et rapidité de ses évolutions, 380. — Ce qui lui arrive lorsqu'il se précipite sur le rivage, par quelque cause que ce soit, 381. — Sa longueur, sa verge,

gestation de la femelle, 382. — Soins du père et de la mère pour les petits, 383. — Comment ils nagent ensemble, 384. — Preuves de leur familiarité avec l'homme, *idem*. — Leur plus grande familiarité avec les enfans, 387. — Leur nourriture, 388. — Mers où on les rencontre plus souvent, 389. — Comment on les poursuit, 390. — Leurs variétés, 391. — Du dauphin des poètes ou de celui d'imagination, 392. — Mythologie des anciens grecs à l'égard du dauphin, 394. — Sur l'apollon delphique ou delphinien, *idem*. — Origine des différens attributs qu'on a supposés aux dauphins, 395. — Ils ont été représentés sous différens signes, 398. — Le marsouin, 2^e espèce. *Voy. ce mot*. — L'orque, 3^e espèce, *Voyez ce mot* — Le dauphin gladiateur, 4^e espèce, 418. — Sa force, 420. — Ses combats, 421. — Sa description et mers qu'il fréquente, 422. — Le nezarnack, 5^e espèce. *Voy. ce mot*. — Le diodon, 6^e espèce, *idem*. — Le dauphin ventru, 7^e espèce; sa description, 428. — Le dauphin de Duhamel; sa description, 433. — Le dauphin de Péron; sa description, 435. — Celui de Commerson, 437.

DAUPHINULES (les). Genre 50 des mollusques dits gastéropodes. *Histoire des Mollusques*, V, 290. — Pourquoi ils sont ainsi nommés, *idem*. — 7 espèces, 291.

DEBOUQUEMENT, ou passage célèbre par plus d'un naufrage dans les Antilles, entre Antigues et Montserrat; débris qu'on y trouve. *Hist. des Mollusques*, I, 303.

DECACANTHE (le). 28^e espèce du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 176 et 222. — On appelle aussi de ce nom la 2^e espèce du genre des poissons appelés *bodians*, 303.

DECADACTYLE (le). 5^e espèce du genre des poissons appelés *potynèmes*. *Hist. des Poissons*, XII, 413, 422.

DECAPODES (les). Insectes particuliers, 20^e espèce de crustacées. *Hist. des Insectes*, V, 187. — Ordre premier, 346.

DECOMBRES (les). Plantes qui y naissent. *Hist. des Plantes*, I, 347.

DECUMARIA. Genre 10 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, XVII, 66.

DÉFENSES. Celles d'éléphant, IV, 51 et 65.

DÉFINITIONS. Leurs défauts, IX, 454.

DÉFLAGRATION VITALE: d'où elle dépend, XXXVII, 132.

DÉGÉNÉRATION. Si elle peut produire une espèce d'animal, 204. — Dégénération des animaux, XXII, 315. — Ses causes, 323.

DEGU (le) Espèce de loir ou de rat de Chili, par Sonnini, XXXII, 213.

DEGUILLÉ. 84^e genre des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 375.

DELIMA. Genre 34 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 139.

DELITER. C'est une opération qui regarde les vers à soie, et qui consiste à les ôter de dessus la litière formée par les débris des feuilles de mûrier, et par leurs excréments. *Hist. des Insectes*, XIV, 166.

DELPHINAPTÈRES (les). 2^e ordre, genre 8 des cé-tacées. *Hist. de ces Poissons*, pag. 38. — 1^{ere} espèce, le delphinaptère beluga, 39. — 2^e espèce, le sénédette, *idem*. Voy. ces mots.

DELPHINIUM ou **DAUPHIN**. Genre 16 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 341. — 8 espèces, 342. — Variétés et propriétés, 343.

DÉLUGE. Sa cause, I, 245. — Toute la terre n'a pas été dissoute dans l'eau au tems du déluge, 255. — Té-moignages au sujet des déluges, III, 141. — Voyez **INONDATION**.

DÉMENCE. C'est une passion sans intervalle, et son état est pour l'ame un état de mort, XXI, 291.

DEMI-FINS (les). Classe d'oiseaux intermédiaires entre ceux à bec fort et ceux à bec fin, LII, 118. — Oiseaux qui ont des becs d'une épaisseur moyenne, 118 (note). — Le demi-fin mangeur de vers; en quoi il diffère de celui du même nom d'un autre climat, 120. — Il se trouve dans la Pensilvanie, 121. — Le demi-

fin noir et bleu, 123. — Le demi-fin noir et roux, 125. — Le bimbélé, ou la fausse linotte de Saint-Domingue, 127. — Sa description, 128. — Le bananiste, 130. — Le demi-fin à huppe et gorge blanches, 133. — L'habit uni, 135.

DEMI-LUNE (le). 64^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 399; X, 119.

DEMOISELLE (la) de Numidie. Erreurs rectifiées au sujet de cet oiseau, XL, 61. — Il a toutes les proportions et la taille de la grue, LVII, 67. — D'où lui vient ce nom, ses gestes et ses mines, 69. — Connoissances des anciens et des modernes sur cet oiseau, 71. Lieux qu'il habite, 72. — Ses parties internes, 73.

DEMOISELLE (la), ou la libellule. Insecte amphibie. Son développement. *Hist. des Insectes*, I, 183. — Comment elle se nourrit, 185. — Son ennemi, 186. — *Voy. LIBELLULE.*

DENDERA (les). 3^e espèce du genre des poissons appelés mormyres. *Hist. des Poissons*, XIII, 224, 230.

DENDRITE. Nom donné aux pierres qui présentent des tiges et des ramifications d'arbrisseaux, XIII, 147. — Leur matière colorante, 150. — Epreuves faites sur deux dendrites, 152.

DENDROBIONS (les). Genre 23 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 261. — Espèce remarquable, le dendrobion à collier, 262. — 26 espèces connues, 263.

DENEKIE (la) du Cap de Bonne-Espérance. Genre 125 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 39. — Espèce connue, 40.

DÉNOMINATION. Observations générales sur ce mot. *Hist. des Insectes*, I, 86.

DENSITÉ. Ce qu'on peut lui attribuer relativement aux progrès de la chaleur dans les minéraux et les métaux, V, 154. — Ses principes réels, 155. — Ordre de densité des dix substances minérales, 159.

DENTAIRE. Genre 12 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 50. — Ses propriétés, 51.

DENTÉ (le). 45^e espèce du genre des poissons ap-

pelés *sparcs*. *Hist. des Poissons*, IX, 390; et X, 99. — Lieux qu'il habite, 100. — 22^e espèce du genre des poissons appelés *pleuronectes*, XI, 280, 344.

DENTELAIRES (les), *plumbago*. Genre 1 des plantes staticées. *Hist. des Plantes*, XIV, 338. — Une espèce de France, et sept espèces connues, 340.

DENTELÉ (le). 30^e espèce de squalé. Sa description, par Lacépède. *Hist. des Poissons*, IV, 121.

DENTELLE (la) rampante. Genre 41 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 14. — Une espèce connue, *idem*.

DENTIDIE (la) de Nankin. Genre 39 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 374.

DENTS. Sur les dents d'éléphant, IV, 60. — Dents d'une grosseur extraordinaire, 99. — Sur les dents d'animaux, XIII, 337, 338; XVIII, 419. — Origine et développement des dents dans l'enfance, 283. — Si elles croissent pendant tout le cours de la vie, 287. — Dent envoyée de la Chine à M. de Buffon, par M. Tessedorf, XXXIII, 75. — Dents du morse, espèce de phoque, XXXIV (note). — Dents des phoques, 182. — Dents des poissons, *Hist. des Poissons*, I, 83; II, 115. — Très-grande dent fossile et pétrifiée du requin, III, 394. — Ses dimensions, 395 (note). — Discussion à ce sujet, 396.

DENTS. Nom donné aux protubérances solides qui composent l'intérieur de la charnière des coquilles bivalves. *Hist. des Mollusques*, VI, 147.

DÉPRÉDATEURS (les). Insectes. Division 1^{re}, tribu 1^{re} de la 2^e section des insectes nommées porte-aiguillons, XIII, 240.

DERBIO (le). Nom donné à un poisson de l'espèce des caranx; sa description. *Hist. des Poissons*, VII, 412.

DERKACZ (le). Oiseau de Pologne, décrit par RZACZYNSKY, LXIV, 113.

DERMESTE (le). Insecte qui, dès qu'il se sent touché, contrefait le mort. *Hist. des Insectes*, I, 278. — Il est du genre des nécrophages, III, 120. — Genre 68 d'insectes, 9^e espèce de la famille 10, les nécrophages, IX, 234. — Sa description, 235. — Ses

voyages, 237. — Ses larves, 238. — Sept espèces, 240.

DESCRIPTIONS. Leur longueur est un moindre défaut que leur trop grande brièveté. *Hist. des Insectes*, 54, 94.

DÉSERTS. Description de ceux de l'Arabie, XXIX, 18.

DESMAN (le). Il ne doit pas être confondu avec l'ondatra ou rat musqué du Canada, XXVII, 74. — Sa description, 91.

DETAR. Genre 9 des plantes dites légumineuses, *Hist. des Plantes*, XVII, 381.

DÉTROIT DE GIBRALTAR, par lequel l'Océan coule dans la Méditerranée avec une grande rapidité, II, 151. — Il a un double courant, 152. — Ce que dit à ce sujet M. Deslandes, 153.

DEUX-PIQUANS (les). 11^e espèce du genre des poissons appelés holacanthés. *Hist. des Poissons*, XI, 204, 215.

DEUX TACHES (le silure). 5^e espèce du genre des poissons appelés silures, *Hist. des Poissons*, XII, 6 et 23.

DÉVELOPPEMENT des parties des êtres organisés, XVII, 58.

DEVIN (le Boa). *Hist. des Reptiles*, V, 174. — Voyez BOAS (les).

DIABLE-ENRHUMÉ (le). Oiseau formant la 1^{re} espèce moyenne des tangaras. Description des couleurs de son plumage, XLVIII, 314, 315. — Particularités sur cet oiseau, 316.

DIABLES (les oiseaux). Leur description, par le P. Labat, LXII, 214.

DIABLE DES BOIS (le). Espèce de lézard, ainsi nommé à Surinam, et décrit par Stedman. *Hist. des Reptiles*, III, 383.

DIABLE-RAIE. (Voyez le mot RAIE).

DIACANTHE (le). 69^e espèce du genre des poissons appelés luans. *Hist. des Poissons*, X, 193, 255. — On appelle du même nom la 25^e espèce des poissons holocentres, 364; et XI, 6. — On donne le même

nom à la 25^e espèce de poissons appelés persèques, XI, 34, 69. — Lieux qu'elle habite, 71.

DIADÈME (le). 30^e espèce du genre des poissons appelés holocentres. *Hist. des Poissons*, X, 365; XI, 7.

DIAGRAMME (le). 14^e espèce du genre des poissons appelés lutjans. *Hist. des Poissons*, X, 171, 211.

DIAMANT (le). Il est formé, comme plusieurs minéraux, dans la terre végétale ou limoneuse. Sa nature, VIII, 461; XIV, 13. — Preuves qu'il est un produit immédiat de terre végétale, VIII, 462. — Diamant de Cornouaille ou d'Alençon, XII, 361. — Rapport du diamant avec les pyrites, XIII, 416. — Phosphorescence du diamant, 453 (note). — Réponse aux objections contre l'opinion que le diamant est produit par la terre végétale, XIV, 14. — C'est une substance combustible, 20. — Expériences qui le prouvent, 23. — Pesanteur spécifique du diamant, 25 (note). — Sa réfraction, 27. — Sa composition, 28. — Ses imperfections, et note de M. Hoppé, 32. — En quoi consiste la belle eau des diamans, 35. — Ce que dit Pline de leur rareté, 36. — Mines de Golconde, de Visapour et de l'Inde, 37, 40, 44. — Leur état dans les rochers où on les trouve, 39. — Détails sur la mine de Couloux 42 (note), 43. — Diamans du Brésil et d'autres endroits, 46. — Leur taille, 48 (note). — Ce qu'on appelle diamans de nature, 50 (note). — Addition à l'article du diamant, par Sonnini, 51. — Sa combustion, devinée par Newton, 53. — Et non par Buffon, 55. — Travaux des chimistes modernes sur le diamant, 56. — Résumé à ce sujet, par Guyton-Morveau, 57. — Sur les mines du Brésil, et leur exploitation, 64. — Quel est le plus gros diamant qu'on connoisse, 66. — Dureté du diamant, XVI, 137. — Expérience de Guyton-Morveau, 139.

DIANE (la) de Linnæus. Espèce de singe, XXXVI, 49, 50, 51.

DIANE (le). 116^e espèce du genre des poissons appelés labres, *Hist. des Poissons*, IX, 153, 295.

DIANELLE (la). Genre 2 de la famille des asperges.

Hist. des Plantes, VIII, 97. — Sa description ; une espèce connue, 98.

DIANÈME (le). Poisson du genre des lonchiures. *Hist. des Poissons*, IX, 102. — Sa description, 103.

DIANTHUS *Voy. CAILLET.*

DIAPÈRES, *diaperiales*. Famille 18 d'insectes. *Ex. Diaperis boleti. Hist. des Insectes*, III, 161, 162. — *Idem*, V, 238. — Genre 145 d'insectes, X, 306. — Sept espèces, 307. — 20^e famille d'insectes : 1^o, les phalères, 300. — 2^o, les diapères, 306. — 3^o, les hypophlées, 309. — 4^o, les élédones, 312. — 5^o, les tétratomes, 314. — 6^o, les léïodes, 315. — 7^o, les agathidies, 319. — 8^o, le cnodalon, 320. — 9^o, l'épitrage, 322.

DIAPHORA (la) de Cochinchine. Genre 70 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 357. — Une espèce connue, 358.

DIAPHRAGME Dans l'homme et dans les animaux, ce muscle paroît être le centre du sentiment, XXIV, 252. — Il est, dans l'animal, ce que le collet est dans la plante, 254.

DIAPRIE. Insecte de la famille des proctotrupiens. *Ex. Ichneumon conicus. Hist. des Insectes*, III, 309 ; XIII, 230. — Trois espèces, 231.

DICHONDRA. Genre 10 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 84.

DICERATES (les). Genre 112 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 195. — Dicerate ariétine, 197.

DICOTYLÉDONES (les). Plantes à deux cotylédons, munies de feuilles et d'organes sexuels très-apparens. Premier ordre : fleurs monoïques ou dioïques, munies d'un périanthe simple ou d'une écaille qui tient lieu de périanthe ; division en conifères, amentacées, euphorbes et orties. *Hist. des Plantes*, IV, 208. *Voy.* ces mots. — Second ordre : fleurs munies d'un périanthe simple, non adhérent, portant les étamines ; division en arroches, oseilles, lauriers, thymelées, protéées et chalesfs. *Voy.* ces mots, 257. — Troisième ordre, *idem*, excepté que les étamines sont attachées à l'ovaire ; divi-

sion en amaranthes et en belles de nuit. *Voyez* ces mots, 286. — Quatrième ordre : fleurs à périanthe simple, adhérent ; étamines attachées sur l'ovaire ; composition, les aristoloches. *Voyez* ce mot, 294. — Cinquième ordre : fleurs à périanthe simple, adhérent, réunies dans un involucre commun, et dites les composées, 296. — Sixième ordre : périanthe double adhérent, étamines attachées sur la corolle ; division en valérianes, garances, chèvrefeuilles, campanules et courges. *Voyez* ces différents mots, 367. — Septième ordre : périanthe double non-adhérent, étamines attachées sous l'ovaire ; division en plantains et staticees. *Voyez* ces mots. *Hist. des Plantes*, V, 5. — Huitième ordre : périanthe double, non-adhérent, étamines attachées à la corolle ; division en primevères, pédiculaires, acanthes, jasminées, verveines, labiées, personnées, morelles, bourraches, liserons, polemoines, bignones, gentianes, apocins, sapotiliers, 9. — Neuvième ordre : périanthe double non-adhérent, corolle monopétale, étamines attachées au calice ; division en plaqueminiers, rosages, bruyères, 146. — Dixième ordre : fleurs à périanthe double, adhérent ; corolle polypétale, étamines attachées sur l'ovaire ; division en aralies, ombellifères, 165. — Onzième ordre : fleurs à périanthe double, adhérent ou non-adhérent à l'ovaire ; corolle polypétale, étamines attachées sur le calice ; division en saxifrages, joubarbes, pourpiers, ficoides, cactiers, melastomés, salicaires, épilobes, myrthes, rosacées, térébinthes, nerpruns, légumineuses, 188. — Douzième ordre : fleurs munies d'un périanthe double non-adhérent ; corolle polypétale, étamines attachées sous l'ovaire ; division en vinettiers, pavots, crucifères, câpriers, rues, caryophyllées, cistes, tilleuls, mauves, géranium et vignes, 340.

DICTAMNE. Genre 7 des plantes rutacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 103. — Deux espèces et leurs propriétés, 104.

DICTYES (les). Genre 536 d'insectes de la famille des muscides. *Histoire des Insectes*, XIV, 384.

DIDELTES (les). Genre 108 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 400. — Deux espèces connues, 401.

DIERVILLE (la). Espèce remarquable de chèvre-feuille. *Hist. des Plantes*, XIV, 133.

DIETE PYTHAGORIQUE. Elle n'a jamais été indiquée par la nature, XXIV, 272.

DIEU. Il est le seul maître de la nature, I, 68. — Invocation sublime de Linnæus à Dieu. *Hist. des Mollusques*, III, 104 (note).

DIGERA (le) des champs. Genre 4 de la famille des amaranthes. *Hist. des Plantes*, XI, 259.

DIGESTION. Travaux de Spallanzani sur la digestion, XLI, 158 (note). — Erreur de Réaumur à ce sujet, 160 (note).

DIGITAIRES (les). Genre 17 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 131. — Espèce remarquable, 132. — Deux espèces de France, 133. — Deux espèces connues, 134.

DIGITALE. Genre 18 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 28. — Huit espèces, 29. — Leurs propriétés, 30. — Genre 4 des plantes dites bignones, 131. — Huit espèces, 132. — Leurs propriétés. Voyez l'erratum qui est à la fin du XVIII^e volume des plantes, 378.

DIGRAMME (le). 109^e espèce des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 150, 293.

DIGUES. Si elles diminuent la multiplication des poissons. *Hist. des Poissons*, II, 53.

DILATRIS (les). Genre 16 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 138. — Trois espèces connues, 139.

DILEPIRES (les). Genre 14 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 127. — Deux espèces connues, 128.

DILLENIA. Genre 9 des plantes magnoliers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 371.

DINDON (le). Sa description, XLI, 223. — Son attitude dans la saison des amours, et à la vue de quelque objet étranger, 230. — Variétés de ses couleurs,

231. — Bouquet de crins qui sort de la partie inférieure de son cou, 232. — Plumes qui forment sa queue, 233. — Différence entre la poule d'Inde et le coq, 234. — Guerre que se font entr'eux les coqs d'Inde, et accouplement des dindons, 236. — Fécondité et ponte de la poule d'Inde, 237. — *Voyez POULE D'INDE*. — Manière d'élever les dindonneaux, 238. — Soins qu'en prend la mère, 241. — Il est rare qu'on les soumette à la castration, 242. — Comment on les conduit, lorsqu'ils sont devenus forts, 244. — Leur voix, leur démarche, leur digestion, 245. — Leurs intestins, leurs parties génitales, 246. — Leurs yeux, 247. — Les dindons sont originaires d'Amérique, 249. — Dindons sauvages, 250 (note). — En quoi ils diffèrent des dindons domestiques, 267. — Pays où on ne trouve point de dindons, 252. — Si on peut dire avec Aldrovande, Gesner, Belon et Ray, que les dindons sont originaires d'Afrique ou des Indes orientales, 255. — Passage d'Elie à ce sujet, 257. — Epoque de leur apparition en France, 262. — S'il est vrai qu'ils soient le produit du mélange du paon et du coq ordinaire, 264. — S'il est vrai que le dindon puisse produire avec le faisan, 265. — Le dindon huppé, 268. — Trait marqué de ressemblance de la peintade avec le dindon, 283. — Sympathie entre les paons et les dindons, XLII, 126. — Comparaison du hocco, espèce de faisan, avec le dindon, 261.

DIOCTRIES (les). Genre 388 d'insectes de la famille des asiliques. *Hist. des Insectes*, XIV, 308.

DIODIES (les). Genre 15 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 366. — 6 espèces connues, 567.

DIONONS (les). Genre 13 des poissons apodes, ou qui n'ont point de nageoires dites ventrales, 6 espèces. *Hist. des Poissons*, V, 174. — 1^o le diodon atingua, 176. — Sa description, 178. — Son gonflement, 182. — Son estomac et sa manière de digérer, 183. — Poisson que contient sa vésicule du fiel, 184. — Le diodon plumier, 2^e espèce, 186. — Le guara ou dindon hola-cauthe, 3^e espèce, 188. — Ses différences avec l'atinga,

189. — Sa pêche, 191. — Celui tacheté, 4^e espèce; sa description, 192. — L'orbe hérissé, ou le diodon orbe, 5^e espèce, 195. — Ses couleurs, 197. — Le diodon mole, 6^e espèce, 201. — Sa description, 202. — 6^e espèce du genre des cétacées appelés *dauphins*; sa description. *Hist. des Cétacées*, 426.

DIONÆA MUSCIPULA. Plante de l'Amérique septentrionale; son irritabilité végétale. *Hist. des Plantes*, I, 265.

DIOPSIS. Insecte du genre des papillons; ex. *Diopsis ichneumona*. *Histoire des Insectes*, III. — Genre 578 d'insectes de la famille des muscides, XIV, 372. — Celui ichneumoné, 376.

DIOPTRIQUE. Jugement sur celle de Descartes, V, 337.

DIOSPIROS. Voy. PASQUEMINIERS.

DIOSMA. Genre 9 des plantes rutacées. *Histoire des Plantes*, XVIII, 108. — 18 espèces, 109. — Leurs propriétés, 110.

DIOTIS (le) candide. Genre 150 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 109. — Une espèce connue, 110.

DIPLOLEPAIRES. Insectes particuliers; ex. *Cinips quercus folii*. *Hist. des Insectes*, III, 306, 307; V, 295. — Famille 62^e des insectes, XIII, 196. — Composée des genres ibalie, 205. — Diplolepe, 206. — Figitte, 209, et eucharis, 210.

DIPLOLEPES (les). Genre 344 d'insectes de la famille des diplolepaires. *Hist. des Insectes*, XIII, 197. — Leur tarière, 198. — Leurs larves, 202. — 10 espèces, 206.

DIPSACÉES OU VALÉRIANES. *Hist. des Plantes*, XIII, 264. Voy. VALÉRIANES.

DIPSACUS. Voy. CARDÈRES (les). *Hist. des Plantes*, XIII, 267.

DIPTÈRES (les), appelés *moustiques* et *maringoins*, dans les Colonies françaises de l'Amérique, sont des insectes très-nuisibles à l'homme. *Hist. des Insectes*, 370. — C'est l'ordre sixième des papillons. III, 418, ordre 7; V, 325. — Pourquoi ainsi nommés, et leur

description, XIV, 259. — Variétés dans leur bouche, 260. — Leur corselet, 261. — Leurs ailes, 262. — Leurs stigmates et leurs pattes, 263. — Leur accouplement, 265. — Leurs larves, 266. — Leurs dernières métamorphoses, 268. — Leur division en deux sections, la première composée de treize familles en cinq divisions, et la deuxième en une seule; les coriacées, 269.

DIPTÉRODONS (les). Genre 112 des poissons. 1^{er} sous-genre, la nageoire de la queue fourchue ou en croissant. — 1^{ère} espèce, le diptérodon plumier. — 2^e espèce, le diptérodon noté. *Hist. des Poissons*, X, 156, 158. — 3^e espèce, le diptérodon hexacanthé, celui apron et celui zingel, 157, 161. — 2^e sous-genre, la nageoire de la queue rectiligne, ou arrondie; 6^e espèce, le diptérodon queue jaune, 157, 162.

DIRCA (le) des marais. 1^{er} genre de la famille des arbustes appelés *thymelées*. *Hist. des Plantes*, XI, 162. — Une espèce connue, 163.

DIRCÉES (les). Espèce d'insectes. *Hist. des Insectes*, X, 336.

DISA (les). 2^e genre de la famille des orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 183. — 28 espèces connues, 185.

DISANDRE (la) couchée. 5^e genre des plantes rhinanthacées; une espèce connue. *Hist. des Plantes*, XV, 46.

DISETTE. Elle produit la stérilité, XIX, 325.

DISPERIS (les). Genre 5 de la famille des orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 191. — 4 espèces connues, 192.

DISQUE (le) Nom donné à une partie de la fleur sur laquelle sont placées les pétales, les étamines et l'ovaire. *Hist. des Plantes*, II, 42. — Le disque considéré comme faisant partie du calice; 160.

DIUCAT (le), par Sonnini. Oiseau de l'espèce du tartin, XLVIII, 218.

DIURIS (les). Genre 12 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 208.

DIURNES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 387; V, 320.

DJEDABA

DJEDABA (le). Nom d'un poisson de l'espèce des caranx. *Hist. des Poissons*, VII, 415.

DOBULE (le). 44^e espèce du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 87. — Sa description, 180.

DOMERIA Genre 32 des plantes malvacées ou maures. *Hist. des Plantes*, XVIII, 211.

DONATIA. Genre 5 des plantes caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 116.

DODMAC (le). 16^e espèce du genre des poissons appelés pimelodes. *Hist. des Poissons*, XII, 47, 66.

DODART. Genre 12 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 12. — 2 espèces, 13.

DODECAS. Genre 2 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, XVII, 58.

DODONAEA. Genre 32 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 207. — 2 espèces, 208.

DOGGER-BANK. Nom d'un banc, de cinquante lieues de long; où se fait principalement la pêche de la morue. *Hist. des Poissons*, VII, 9.

DOIGT de nègre (le). 12^e espèce du genre des poissons appelées pimelodes. *Hist. des poissons*, XII, 46, 62.

DOLABELLE (la). Genre 29 des mollusques. *Hist. des Mollusques*, V, 184.

DOLICHOPE. Insecte papillon; ex. *Musca unguata*. *Hist. des Insectes*, III, 439. — Genre 4 de la famille des rhagionides, XIV, 328, 333.

DOLIQUE. Genre 49 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 319. — 3 espèces, et leurs propriétés, 320.

DOLIUM. Voy. **TONNE**.

DOLOMIEU (le). Poisson du genre des microptères. *Hist. des Poissons*, X, 353.

DOMINO. (le). Oiseau gros-bec des îles Moluques. *Hist. des Oiseaux*, XLVII, 51.

DONACES (les). Genre 143 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 357. — 2 espèces, 361.

DONACIE. Insecte du genre des chrysomèles pro-
Tab. TOME I. X

prement dits; ex. *Donatia dentipes*. *Hist. des Insectes*, III, 221. — Genre 222 d'insectes, 12 espèces, XI, 344.

DONZELLE (la). Espèce de poisson qui a des écailles particulières. *Hist. des Poissons*, II, 207.

DORA. Nom sur lequel les Indiens du Bengale désignent une espèce de couleuvre. *Histoire des Reptiles*, VII, 191. — Ses dimensions, 192.

DORADE. Poisson de la Chine. Détails sur la destruction de celle qu'entretenoit M. Varenne de Feuille. *Hist. des Poissons*, II, 321 (note). — Voy. le mot **HIPPURUS**. Celle de la mer du Sud. — Voy. **CHRYSTURUS**. — La petite dorade. Voyez **SCOMBÉROIDE**. — 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *sparcs*, IX, 372. — Sa nomenclature, 416. — Sa description, 418. — Lieux qu'elle habite, 419. — Conjectures sur ses dépouilles, 421. — Sa grandeur et ses parties intérieures, 425. — Sa nourriture, 426. — Son habitation, 427. — Lieux où on le pêche, 429. — Ses habitudes, 430. — Bonté de sa chair, 431. — Ses qualités médicales, 432.

DORADON (le). 2^e espèce des poissons appelés *coryphènes*. *Hist. des Poissons*, VIII, 215. — En quoi il diffère de l'hippurus, 216.

DORAS (le). Genre 163 des poissons. 1^{re} espèce, celui carené. *Hist. des Poissons*, XII, 73, 74. — 2^e espèce, le doras coté, 73, 75.

DORINE. Genre 5 des plantes dites saxifrages. *Hist. des Plantes*, XVI, 345. — 2 espèces, et comment on les emploie, 346.

DORIPPE, *doripa*. Insecte du genre des corysités *Dorippe quadridens*. *Hist. des Insectes*, III, 28. — Genre des insectes kleistagnathes, V, 155. — Sa description, VI, 123. — Ce qui résulte de l'organisation des dorippes, 124. — Espèces européennes, le dorippe à quatre dents, 125. — Le dorippe astucieux, 126. — Le dorippe rusé, 127. — Le dorippe mascaronne, 128.

DORIS (les). Genre 21 des mollusques gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 130. — En quoi consiste

leur caractère distinctif, 131. — Leurs parties internes, 132 — Leurs branchies, 134. — Leurs mœurs, 135. 11 espèces, 136.

DORONIES (les). Genre 114 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 410. — 2 espèces de France, 411. — 6 espèces connues, 412.

DORSTENIÉS (les). Genre 3 de la famille des orties, herbes vivaces de l'Amérique méridionale. *Hist. des Plantes*, X, 79 — Celle à feuilles de berce, 80. — 8 espèces connues, 81

DORURE. Ses différentes espèces, XI, 74. — Manière de dorer avec l'or, 76.

DORYLE. Insecte du genre des mutillaires; ex. *Dorylus helvolus*. *Hist. des Insectes*, III, 352. — Genre 360 d'insectes de la famille des fourmis, XIII, 260.

DOS (le) de l'homme; sa description, XVIII, 424.

DOUBLE AIGUILLON (le). Poisson, 4^e espèce des balistes. Sa nomenclature. *Hist. des Poissons*, IV, 240. — Sa description, 241.

DOUBLE-BOSSÉ (la lophie). Poisson. *Histoire des Poissons*, IV, 192. Voyez **LOPHIE**.

DOUC (le) Le dernier des animaux appelés singes, babouins et guenons, sans être précisément d'aucun de ces trois genres, XXXVI, 65. — Sa description, 66. — Ses caractères particuliers et distinctifs, 67 et 69. — Sa description particulière, par Daubenton, 70. — Pierres dans sa vésicule du fiel, qui ont les mêmes propriétés que le bezoard le plus précieux, 270.

DOULEUR. D'où proviennent les douleurs dans l'accouchement, XVIII, 173, 220 — La douleur n'a pas lieu à l'instant de la mort, XIX, 31, 34. — A-t-elle lieu dans une mort violente, lors, par exemple, que la tête est emportée par un boulet de canon, 35? — Manière dont les nègres de Congo guérissent la douleur, XX, 271. — Effets de la douleur et du plaisir, XXI, 285.

DOUM (le). Arbre que produit l'Égypte, et dont le fruit sert à la nourriture des habitants. *Hist. des Plantes*, VIII, 86.

DRACOCÉPHALES (les). Genre 47 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 394. — 2 espèces de France. Pourquoi il y en a une appelée *cataleptique*, 395. — 20 espèces connues, 396.

DRACONTES (les). Genre 6 des plantes dites aroïdes. *Hist. des Plantes*, VII, 433. — 5 espèces remarquables, 434. — 7 espèces connues, 436.

DRAGONS (les). Eux seuls, entre tous les reptiles, ont la faculté de voler. *Histoire des Reptiles*, I, 269. — Genre 7 des reptiles dits sauriens, III, 290. — Ils habitent sur-tout Java et Sumatra, 291. — Ce qu'en ont dit divers auteurs, 292. — Détails fabuleux sur les dragons, 296. — Le dragon rayé, 298. — Le dragon verd, 301. — Autres espèces de dragons décrites par divers auteurs, 303. — Le dragon brun, 307. — Tableau alphabétique de leur nomenclature, VIII, 361.

DRAGON-MARIN (le). *Voy. LA VIVE*.

DRAGONE (la). Genre 2 du crocodile. *Hist. des Reptiles*, II, 421. — La dragone de la Guiane, 423. — Ses mœurs, 427. — Ses dimensions, 429. — Sa nomenclature méthodique, VIII, 351.

DRAGONIERS (les). Genre 1 de la 1^{re} section des asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 90. — Leur description, 91. — Espèces remarquables, le dragonier à feuilles d'yucca, vulgairement le sang-dragon. Sa description, 92. — Suc qu'il produit, 93. — Le dragonier à feuilles renversées, 94. — Celui de la Chine, *idem*. — 15 espèces connues, 95.

DRAGONNEAU (le). Poisson osseux du genre des callionymes, 2^e espèce. *Hist. des Poissons*, VI, 223. En quoi il diffère de la lyre, 1^{re} espèce de poisson du même genre, 224. — Il est regardé comme la femelle de la lyre, 225.

DRAINE (la). 2^e espèce de grive, XLV, 300. — Tens où elle arrive en Bourgogne, 302. — Ce qu'elle devient ensuite, 303. — Sa ponte, 304. — Douceur de ses mœurs contredite par Levaillant, 305. — Sa description, 307 (note). — Variété de la draine, 309.

DRAVE. Genre 19 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, 58. — 6 espèces, 59.

DREGE (la). Espèce de filet avec lequel on pêche le merlan. *Hist. des Poissons*, VII, 71.

DREIGE (la). Espèce de trémail qui sert à prendre les petits squales. *Hist. des Poissons*, IV, 153.

DREPANIA (le) barbu. Genre 9 des plantes dites chicoracées. *Hist. des Plantes*, XI, 387. — Une espèce France et une espèce connue, 388.

DRILLES (les). Genre 40 d'insectes, et 4^e espèce de la famille des malacodermes. *Hist. des Insectes*, IX, 91. — Une espèce, 92.

DRIMIA (les). Genre 10 des plantes dites asphodèles. *Hist. des Plantes*, VIII, 346. — 5 espèces connues, 347.

DROMADAIRE (le). Quadrupède inconnu aux Indes occidentales, XXV, 2. — Dromadaire et chameau ne désignent pas deux espèces différentes, mais seulement des races distinctes, XXIX, 5. — Différences du dromadaire et du chameau, 6, 54. — Lieux où se rencontre le dromadaire, 11, 56. — Sa vitesse, 21, 22, 57 (note). — Ce que dit Sonnini du dromadaire, dans son *Voyage d'Egypte*, 64.

DROMIE, *dromia*. Insecte du genre des littoraux; ex. *Dromia rumphii*. *Hist. des Insectes*, III, 22. — Genre des insectes kleistagnathes, V, 155. — Sa description, 382. — Espèce européenne, celui tête de mort; sa description, 384. — Espèces exotiques. *Dromie* artificieuse; sa description, 385. — *Dromie* de Rumphius, 386. — Passage curieux de Nicholson, relatif à ce crustacé, ou faux Bernard l'hermite, VI, 332.

DROMEO (le) mal-à-propos placé, par les nomenclateurs, dans la classe des oiseaux gobe-mouches; sa description, L, 251.

DRONTE (le). Oiseau des îles de France et de Bourbon, XL, 337. — Il paroît fait exprès pour donner l'idée du plus lourd des êtres organisés, 338. — Il pa-

roit accablé du propre poids de son corps, 339. — Sur ses plumes, 340. — Comparaison du dronte avec le solitaire et l'oiseau de Nazare, 354. — Leurs différences, 356.

DROSERA. Voyez **ROSSOLIS**.

DROSCERA ROTUNDIFOLIA, ou joli rossolis à feuilles rondes, plante qui croît aux environs de Paris. Son irritabilité végétale, 266.

DRUPE (le). Espèce de noix. *Hist. des Plantes*, II, 212.

DRYANDRA (le) à feuilles en cœur. genre 19 des plantes dites euphorbes. *Hist. des Plantes*, IX, 402. — Une espèce connue, 404.

DRYAS. Voy. **CHENETTE**.

DRYINES (les). Genre 352 d'insectes de la famille des proctotrupiens. *Hist. des Insectes*, XIII, 228.

DRYMIS. Genre 2 des plantes magnoliers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 364.

DRYOPS. Insecte du genre des nécrophages. Exemp. *Driops auriculatus*. *Hist. des Insectes*, III, 119. — Genre 65 d'insectes. 6^e espèce de la 10^e famille, les nécrophages, IX, 223. — Trois espèces, 225.

DRYPIS. Genre 28 des plantes caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 147.

DRYPTE. Insecte du genre des longipalpes. Exemp. *Drypta emarginata*. *Hist. des Insectes*, III, 87. — Genre 17 des insectes; leur description, VIII, 263. — Deux espèces 1^o l'échancrée, 2^o la cylindricolle, 264.

DSHERENT. Nom sous lequel Gmelin désigne une espèce de chevreuil dont il donne la description, XXX, 270 (note).

DUBBAL. Nom qu'on donne en Barbarie, à l'hyène. Sa description, XXVII, 10.

DUBERRIE. Espèce de couleuvre de Ceylan. *Hist. des Reptiles*, VII, 202.

DUK (le), ou grand duc, ou l'aigle de la nuit, XL, 34. — Ses différences d'avec l'aigle, 35. — Comment on les distingue, 36. — Ce que dit Frisch de ses diffé-

rens cris, 37. — Ses habitudes, 39. — Ses variétés, 42. — Le duc de Virginie, par M. Edwards, 47 (note). — Deux autres variétés décrites par Mauduyt et Levaillant, 50 (note). — Le hibou ou moyen duc, 52. — Le scops ou petit duc, 68. — Le duc à courtes oreilles, 77. — Sa description, 78. — Le zorca, 80. — Le duc cabure ou caboure des Indiens du Brésil, 124. — Sa description, 125. — Faculté qu'il a de redresser les plumes de sa tête, 126 (note). — Le duc gentil de Sibérie, 147. — Sa description, par Pallas, 148. — Le duc tacheté, 152. — Le grand duc de Ceylan, 156. — Sa description, 157. — Le duc de la côte de Coromandel, 158. — Le duc de la Chine, 160. — Le duc Mexicain, 162. — Sa description, 163.

DUC (le). 7^e espèce du genre des poissons appelés holacanthes. *Hist. des Poissons*, XI, 203, 214.

DUCTILITÉ. Propriété des minéraux et des métaux, V, 157.

DUGON (le). Animal de la mer de l'Afrique et des Indes orientales, de la nature du morse, XXXIV, 184. — Sa description, 185. — Autre, par M. Barchewits, 187 (note).

DUHAMELIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 104.

DUITS. Nom qu'on a donné aux pêcheries de la lamproie. *Hist. des Poissons*, III, 37.

DURANTES (les). Genre 15 des plantes dites gati-liers. *Hist. des Plantes*, XV, 223. — 3 espèces connues, 224.

DUR-BEC (le). Oiseau du Canada, espèce de grosbec, XLVII, 20. — Lieux où il se plaît, 21 (note). — Sa description, 22.

DURIO. Genre 7 des plantes câpriens. *Histoire des Plantes*, XVIII, 87.

DUROIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 37.

DYPIRE. Espèce de pierre, XVI, 286.

DYSENTERIE. Maladie à laquelle sont sujettes les abeilles. *Hist. des Insectes*, XIV, 34.

DYSODA. *Hist. des Plantes*, XIV, 123.

DYTIQUE. Insectes et genre 2 des hydrocanthères.

Histoire des Insectes, III, 75. — Leur description, VIII, 155. — Leurs larves, 157. — Espèces, 1^o le dytique large, 160. — 2^o celui marginé, 161. — 3^o celui jaune, 4^o celui pointillé, 162. — 5^o celui de Roesel, 163. — 6^o celui silloné, et 7^o celui cendré, 164. — 8^o celui strié. — 9^o celui transversal, 165. — 10^o celui de Hybner, 11^o celui des marais, et 12^o celui à antennes en masse, 166. — 13^o celui vitré, et 14^o celui bronzé, 167. — 15^o celui chalconate, 16^o celui bipustulé, 17^o celui noté, et 18^o celui aspergé, 168. — 19^o celui baponctué. — 20^o celui maculé. — 21^o celui ondulé, 169. — 22^o celui interrompu, 170. — 23^o celui didyme, 24. — celui agile, 171. — 25^o l'hyelin. — 26^o le brunâtre, 172. — 27^o le crassicorne. — 28^o le linéé, 173. — 29^o le granulaire. — 30^o le trifide. — 31^o le flavipède, 174. — 32^o celui à côte élevée. — 33^o le dorsal, 175. — 34^o l'élégant. — 35^o le picipède, 176. — 36^o celui à six pustules. — 37^o le confluent, 177. — 38^o celui à collier. — 39^o l'ové, 178. — 40^o l'ovale. — 41^o celui à deux carènes. — 42^o celui de Hermann, 179 et 180.

E.

EAUX en général. Les eaux du ciel, les fleuves, les rivières et les torrens sont ce qui produit les plus grands changemens sur la surface de la terre, I, 149. — Sources d'eau, 151. — D'où elles viennent, 152. — Eaux souterraines qui n'ont point d'issue apparente, 158. — Nouvelles observations sur la théorie des eaux courantes, II, 78, 84. — Quelle est la quantité d'eau que l'évaporation enlève de la surface de la mer, 91. — Points de partage, sur la surface de la terre, pour la distribution des eaux, 94. — 3^e époque de la formation de la terre, lorsque les eaux ont couvert nos continents, III, 277. — Leur état dans les commencemens de leur séjour sur le globe, 279. — Prodigeux effets de la séparation de l'air et de l'eau, 280. — Effets qu'elle a produits par sa seule qualité, 282. — La structure et la

forme actuelle de la terre sont dues aux eaux, 287. — Durée du tems pendant lequel les eaux ont couvert nos continens, 305. — Tems où les eaux, après être arrivées des régions polaires, ont gagné celles de l'équateur, 320. — 4^e époque de la nature, lorsque les eaux se sont retirées, et que les volcans ont commencé à agir, 326. — Tems qu'il a fallu aux eaux pour ouvrir et creuser les bancs de pierres calcaires, et circonstances qui y ont concouru, 362. — Ce sont les eaux qui, dirigées des poles de l'équateur, du sud au nord, ont aiguisé toutes les pointes des continens, 404. — Elles ont couvert toute l'Europe, jusqu'à quinze cents toises au-dessus du niveau de la mer, IV, 92. — De l'air, de l'aimant et de la terre, 290. — Comparaison de l'air avec l'eau, 314. — Expériences à ce sujet, 318. — L'eau est pour l'air ce que celui-ci est pour le feu; toutes les transformations de la nature dépendent de l'eau, 321. — Travail des animaux à coquille sur la substance de l'eau, 324. — Transformation de l'eau en pierre par le filtre végétal, 330. — Comment l'eau réside dans le sel, 334. — Manière dont il faut entendre que l'eau dissout le sel, 340. — La nature fait, par le moyen de l'eau, tout ce que nous faisons par celui du feu, 341. Effets de l'eau sur toutes les substances intérieures de la terre, concurremment avec la chaleur qu'elle renferme, 342. — L'eau a plus influé que le feu sur les grands bouleversemens arrivés dans le globe, IX, 306. — Pétrifications par l'eau, XIII, 346. — Action des eaux pour la formation du globe terrestre, XVI, 79. — Eaux premières, source de nos mers, 84. — Eaux de la terre, 134. — Formation des eaux, d'où elle dépend. *Hist. des Mollusques*, I, 65, 66. — D'où est venue la dénomination graduelle des eaux, 69. — Leur action sur le globe terrestre, 77. — Leur irruption subite a formé des mers au milieu des continens, 320. — L'eau seule peut engendrer des poissons. *Histoire des Poissons*, I, 173. — Sa décomposition dans l'organe respiratoire des poissons, 184, 187, 189 (note).

EAU D'ARCUEIL. Sa pétrification, VIII, 298.

EAU DE LA MER. D'où vient sa salure, II, 95, 98,

100; et X, 98. — Plus l'on descend dans la mer, plus l'eau est froide, II, 97. — Elle contient beaucoup de bitume, 99. — Sa température est à peu près égale à celle de l'intérieur de la terre à la même profondeur. Observations de M. de Mairan à ce sujet, III, 172; et IV, 45. — La lumière du soleil ne pénètre tout au plus qu'à six cents pieds de profondeur dans l'eau de mer. Observation de M. Bouguer à ce sujet. La chaleur du soleil ne pénètre peut-être pas à plus de cent cinquante pieds de profondeur, dans l'eau de la mer, 172; et IV, 48. — Ce qu'a observé Humboldt dans l'eau de la mer. *Hist. des Poissons*, I, 381 (note).

EAU DE LUCE. Alkali volatil uni à l'huile de suc-cin : c'est un des meilleurs remèdes contre la morsure des vipères et des serpens. *Hist. des Reptiles*, V, 73. — *Voy. ALKALI VOLATIL.*

EAU PLUVIALE. Son origine, I, 149. — Ses effets sur les pierres, VIII, 259, 271.

EAU RÉGALE. Vrai dissolvant de l'or, XI, 48. — Son effet sur l'étain, 372.

Eaux et Forêts. Règlement à ce sujet, donné en 1707, par le duc de Lorraine. *Hist. des Poissons*, II, 219.

EBURNE (l') Genre 89 des gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 30. — 4 espèces, 31.

ÉCAILLES (les). Ce que c'est dans les plantes. *Histoire des Plantes*, I, 221. — Leur nature, II, 122. — Celles des poissons. *Histoire des Poissons*, I, 80. — Leur forme, 81. — Leurs effets par rapport aux couleurs des poissons, 148. — Explication à ce sujet, 153. — Leurs différens noms à raison de leurs formes, de leur superficie, de leur disposition et de leurs dimensions. II, 134. — Observations de M. Broussonnet sur les écailles de plusieurs espèces de poissons qu'on croit communément dépourvus de ces parties, 195. — Variété des écailles dans les poissons, et leur insertion, *idem.* — Quels sont les poissons dont les écailles sont à découvert, et seulement retenues par des vaisseaux, 196. — Quels sont ceux, dont les écailles sont en partie recouvertes par la peau, 197.

— Espèces sur lesquelles on n'a pas observé les écailles, 1^o la flamme, 198. — 2^o les mastacembelus, 199. — 3^o le remora. — 4^o l'ammodyte, 200. — 5^o l'anguille, 202. — 6^o les murènes des mers des Indes, 206. — Autres espèces de poissons qui ont des écailles, 207. — Description de celles des poissons bourses (tétræodon) 211. — Usage des écailles dans les poissons, *idem*. — Sur celles de certaines coquilles bivalves. *Hist. des Mollusques*, VI, 149.

ECAILLEUX (l'). 32^e espèce de squalé. Sa nomenclature et sa description. *Histoire des Poissons*, IV, 126.

ECALLONIA (l'). *Histoire des Plantes*, XIV, 186.

ECHALOTTE (l'). Espèce d'ail. *Hist. des Plantes*, VIII, 389.

ECCHARPE (l') Poisson du genre des balistes. Sa description. *Hist. des Poissons*, IV, 236. — Ses formes particulières, 258.

ECHASSE (l'). Oiseau qui est, parmi ceux de son espèce, ce que la gerboise est dans le quadrupède, LIX, 39 — Longueur de ses jambes, 41. — Ses ailes et son vol, 42. — Ses habitudes, 43. — Lieux qu'il habite, 44. — L'échasse de Cayenne, par Sonnini, 47.

ECHELLE D'ARITHMÉTIQUE, XXI, 184. — Celle à préférer, et moyen d'y ramener tous les calculs, 194.

ECHENEIS (l'). Nom sous lequel Oppien désigne la lamproie. *Hist. des Poissons*, III, 14 — Genre 78 des poissons dits osseux. Leurs caractères distinctifs. Trois espèces. VIII, 166. — Le remora, 1^{ere} espèce, 167. — Le remora naucrate, 2^e espèce, 182. — Le remora rayé, 3^e espèce, 194. Voyez REMORA.

ECHIDNE (l'). 2^e espèce du genre des poissons appelés murénophis. *Hist. des Poissons*, XIII, 234. — Sa description, 256.

ECHINOIRE (l') capitée. Genre 46 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 257.

ECHINOMIES (les). Genre 529 d'insectes de la famille des muscides. *Hist. des Insectes*, XIV, 377.

ECHINOPES (les). Genre 59 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 180. — 2 espèces de France, et 6 espèces connues, 181.

ECHINOPHORA. Genre 46 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 342. — 2 espèces et leurs propriétés, 343.

ECHIQUEUR (l'). 67^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 134 et 240.

ECHIQUEUR (l') Espèce de filet qui sert à la pêche dans les rivières. *Hist. des Poissons*, XIII, 353. — Comment on s'en sert, 354. — Celui appelé caleu, 355. — Celui appelé venturon, *idem*.

ECHITES. Genre 8 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 172.

ECHINÉE (l'). Genre 9 des plantes dites asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 116.

ECHIU ou la VIPERINE. *Voy. ce mot*.

ECITON (l'). Genre 366 d'insectes de la famille des fourmis. *Hist. des Insectes*, XIII, 258.

ECLIPSES. Formule qu'emploient les Brames pour les calculer, IV, 12. — Ils n'en sont pas les inventeurs, 13. — Manière dont les Chinois les calculent, 15.

ECLIPTES (les). Genre 171 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 172. — 7 espèces connues, 173.

ECLIPTIQUE (l'). Si le changement de son obliquité a pu changer la température dans les différentes parties du globe, III, 185.

ECORCE d'orme pyramidal. Ses vertus. *Hist. des Plantes*, X, 266.

ECORCE péruvienne. *Hist. des Plantes*, XIV, 19.

ECORCEMENT des bois sur pied ; moyen facile d'augmenter la solidité, la force et la durée du bois, VI, 276, 381. — Réflexions sur la défense faite à ce sujet, 277 et 297. — Pourquoi il faut choisir, pour cette opération, le tems de la plus haute sève, 300. — L'écorcement des pins, des sapins, etc., rend ces arbres plus forts, plus durs et plus solides que les autres, 435.

ÉCORCHEUR (l'). Espèce de pie-grièche, **XXXIX**, 293. Voy. l'article des pies-grièches. — Note de Buffon sur l'écorcheur des Philippines, 342.

ÉCREVISSES (les). *Astacus*. Insecte du genre des homardiens. **Ex.** *Astacus fluviatilis*. *Histoire des Insectes*, III, 32. — Ce sont de véritables insectes, V, 8 (note). — Leurs parties sexuelles, 56. — Leur anatomie, donnée par Willis, 71. — Celle donnée par Roesel et Bosc, 78. — Observations de Portius sur le même sujet, 82. — Système nerveux de ces insectes, 98. — Yeux d'écrevisse, 120. — Comment l'écrevisse se dépouille de sa peau, 133, 229. — Elle renouvelle son estomac, avant de changer de peau, 137. — Ecrevisse, *astacus*. Genre des insectes exochnates, 159. — Genre 25 des crabes, VI, 201. — Ses caractères et description qu'en fait de Geer, 202. — Suite de cette description, 207. — Leurs dents, 211. — Leurs pattes, 212. — Particularités à ce sujet, 215. — Leur queue, 216. — Leurs nageoires, 220. — Comment elles respirent, 223. — Comment on les conserve, 225. — Leur organisation intérieure, 226. — Leur fécondité et leurs œufs, 228. — Leur changement de peau, leur nourriture, et lieux où elles se plaisent, 229. — Extrait des connaissances des anciens sur ces insectes, 230. — Espèces, — 1^o l'écrevisse homard, 233. — 2^o l'écrevisse de rivière, 235. — Utilité médicinale qu'on tire des écrevisses, 236. — Pêche de l'écrevisse de rivière, 237. — Manière dont les Tatars les prennent en hiver, 239. — 3^o l'écrevisse de Burton, 250. — 4^o l'écrevisse du Cap, *idem*. — 5^o l'écrevisse norvégienne, celle raboteuse, celle fauve, 241. — 6^o l'écrevisse bleuâtre, et celle brillante, 242.

ÉCUELLE D'EAU, *hydrocotyle*. Genre 49 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 347. — Ses propriétés, 348.

ÉCUREUIL (l'). Joli petit animal qui n'est qu'à demi sauvage, **XXV**, 163. — Ses habitudes, 166. — Détails curieux sur cet animal, par M. Daines Barrington, 169. — Ses espèces et variétés, 170. — Il est très-abondant en Sibérie. Celui noir, 174. — Autre espèce dé-

crite par M. de la Borde, 175. — Sur ceux de Pensylvanie, *idem* (note). — L'écureuil de Madagascar. Sa description, 178. — Celui de la côte de Malabar, 180. — Écureuils volans des Hurons du Canada, XXVII, 151 (note), 160 (note). — La polatouche, espèce d'écureuil, 157, 168. — Le petit-gris, espèce d'écureuil, 177 (note). — Changement de couleur de l'écureuil, 179. — C'est l'animal le plus sujet aux variétés, 182. — Écureuils à raies, 193. — Comment l'écureuil contribue à la dissémination des graines. *Hist. des Plantes*, II, 84. — L'écureuil gingi, XXXII, 238.

ECUSSON. Partie de la poitrine des insectes à étuis. *Hist. des Insectes*, II, 64, 157.

EDÈRES (les). Genre 194 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 225. — 5 espèces connues, 226.

EDUCATION. Deux espèces bien distinctes, celle commune à l'homme et aux animaux, et celle qui n'appartient qu'à l'homme, XXXV, 45.

EFFETS. Raisons d'un effet particulier, XVII, 42. — Effets naturels, et manière de les considérer, XXI, 104.

EFFRAYE (l'), ou la FRESAIRE. Espèce de chouette dite des clochers, XL, 94. — Sa description, 95 (note). — En quoi on la distingue des autres chouettes, 97. — Comment on la prend, 98. — Ses habitudes, 100. — Lieux où elle se trouve, 102.

EGÉRIES (les). Genre 134 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 324. — Leur animal, 325. — L'égérie radiée, 327.

EGICÈRES (les). Genre 13 des chevreseuilles. *Hist. des Plantes*, XIV, 177. — 2 espèces connues, 178.

EGILOPES (les). Genre 42 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 228. — 2 espèces remarquables, 229. — 4 espèces de France, 230. — 2 espèces connues, 231.

EGINETS (les). Genre 22 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 379. — 2 espèces connues, 380.

EGIPHILLES (les). Genre 4 des plantes dites gatiliers.

Hist. des Plantes, XV, 202. — 9 especes connues, 203.

EGLANTIER (la raie). 26^e espece. *Voyez le mot RAIE.*

EGLEFIN (l'). Sa pêche. *Hist. des Poissons*, VII, 65 — Comment on l'apprete, *idem*.

EGAGROPHILES (les). Ce que c'est, XXIII, 45. — Leurs différences avec les bezoards, XXX, 325. — Animal porte-musctué par une égagropile, XXXI, 211.

EGYPTE (l'). Elle est une des contrées où le culte des animaux s'est établi, et conservé le plus anciennement, LVIII, 176. — Dans ce pays l'art de multiplier les poissons étoit un des principaux objets de la sollicitude du gouvernement, et des soins de chaque famille. *Hist. des Poissons*, II, 60.

EGYPTIENS. Leurs usages et coutumes, XX, 209. — Note de M. Bruce sur les Egyptiens, 213. — Leur attache superstitieuse pour les chats, XXIV, 36.

EHREHARTIES (les). Genre 61 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 352. — 5 especes connues, 353.

EHRETTIA. *Voyez CABRILLET.*

EIDER. C'est l'oiseau qui donne ce duvet si chaud et si léger, appelé *eider-don* ou *duvet d'eider*, et par corruption, *aigle-don*, LXI, 274, 277. — Sa synonymie, *idem*. — Sa description, 277. — Sa ponte, 279. Ses nids en Norvège et en Irlande, 281. — Note sur cet oiseau, par M. Brunnich, 283. — Ses voyages, 287.

EKEBERGIA. Genre 12 des plantes azedaracks. *Hist. des Plantes*, XVIII, 246.

ELAIS ou **L'AVOIRA**. Genre 8 des palmiers originaires de la Guinée. *Hist. des Plantes*, VIII, 59. — Sa description, 60. — Huile et beurre qu'on retire de ses fruits, 61. — Une espece connue, 62.

ELAN (le). Variétés qu'il a subies, XXII, 342. — Sa synonymie, XXX, 92. — Il existoit autrefois dans les forêts des Gaules et de la Germanie, 102. — Régions qu'il habite maintenant, 104. — Sa comparaison avec les cerfs, 112. On peut l'appivoiser, 114. — *Bruit que font les cornes des ses pieds*, 126, 130.

Son ennemi le carcajou, 128. — L'élan est ruminant, 133. — Particularités sur l'élan, 137. — Comment on le chasse, 142, 144. — Il n'est pas sujet à l'épilepsie. Préjugé sur la guérison de cette maladie par la corne de ses pieds, 143. — Description d'un élan particulier, vu à la foire en 1784, 145. — Ses dimensions, 148. — Grandeur de l'élan, 151. — Description d'une femelle de Chantilly, 153. — Addition à l'article de l'élan, par M. Allamand, 161. — Note sur quelques particularités de l'élan, 197. — Trait de son attachement, 199.

ELAPHRE, *elaphriens*. Insectes particuliers; ex: *Elaphrus aquaticus*. *Hist. des Insectes*, III, 81, 82. — Genre 8 des insectes de l'ordre premier des coléoptères. Leur description, VIII, 213, 214. — 7 espèces, 1^o l'elaphre riverain, 216. — 2^o celui des marais. — 3^o celui caraboïde, 217. — 4^o celui littoral. — 5^o celui aquatique, 218. — 6^o celui demi-punctué. — 7^o celui flavipede, 219.

ELATÉ (l'). Genre 4 de palmiers. Ses caractères. *Hist. des Plantes*, VIII, 42. — Une espèce connue, 43.

ELATERIÉS (les). Genre 4 des plantes appelées courges. *Hist. des Plantes*, XIV, 255. — Deux espèces connues, *idem*.

ELATERIUM. *Hist. des Plantes*, XIV, 263.

ELATINE. Genre 14 des plantes caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 125. — Deux espèces, 124.

ELATOSTÈMES (les). Genre 14 de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 109. — Deux espèces connues, 110.

ELCAJA. Genre 10 des plantes azedaracks. *Hist. des Plantes*, XVIII, 245.

ÉLECTRICITÉ. Elle joue un grand rôle dans les tremblemens de terre et les éruptions des volcans, III, 332. — Electricité des pierres appelées tourmalines, XIII, 54. — Son origine, XIV, 299. — Effets du fluide électrique, 300. — Electricité souterraine; ses effets, 319. — Forces électriques et magnétiques comparées, 338. — Sur les poissons électriques, 347. — Application de l'électricité à l'art de guérir, et ses cures, 352. — Si les

deux

deux forces magnétique et électrique peuvent être identiques, 375. — Résultat de leur comparaison, 376. — Leur rapport immédiat, 380. — Influence électrique de la sèche et autres animaux. *Hist. des Mollusques*, I, 194 et 195 (note).

ELEDONE. Insecte du genre des diapériales Ex. *Botitophagus agricola*. *Hist. des Insectes*, III, 161. — Genre 147 des insectes, 4^e espèce de la 20^e famille; les diapériales, *idem*, X, 312. — Cinq espèces, *idem*.

ELÉMENTS (des), IV, 187. — La chaleur intérieure de la terre doit entrer comme élément dans la combinaison de tous les autres éléments, 231. — Ses effets sur eux, 233. — Des éléments, de l'air, de l'eau et de la terre, 290. — Ce qui est résultat du mélange des éléments, XVI, 66.

ÉLÉPHANT. Il a habité autrefois les terres du Nord, III, 179. — Explication de ce fait, 182. — Sa marche progressive du nord au midi, 378. — Temps que les éléphants ont séjourné dans les climats du nord, 382. — Les os et les défenses des anciens éléphants étoient au moins aussi grands et aussi gros que ceux des éléphants actuels, III, 187; IV, 51. — Description, par M. Daubenton, d'une dent d'éléphant, 52. — Le seul état de captivité peut réduire les éléphants au quart et au tiers de leur grandeur, 53. — Lettre de M. Collinson sur la découverte de squelettes et de défenses d'éléphant en Canada, 55, 56, 63. — Extrait, à ce sujet, du voyage de M. Croghan, 57. — L'espèce d'éléphant est la seule sur laquelle l'état de servitude ou de domesticité n'a jamais influé, parce que dans cet état il refuse de produire, etc., XXII, 343. — Les éléphants appartiennent à l'ancien continent, et ne se trouvent pas dans le nouveau, XXV, 1. — Synonymie et description de l'éléphant, XXVIII, 89. — Ses qualités éminentes au-dessus de celles du chien, du singe et du castor, 93, 2752. — Sa force, 95. — Vénération des anciens pour cet animal, 97. — Des Indiens, 98. — Si l'éléphant blanc forme une espèce particulière, 100 (note), 163 et suiv. — L'éléphant considéré dans l'état sauvage, 101. — Danger qu'on court en l'attaquant, 103. — Sa nourriture, 106,

Tab. TOME I.

Y

155, 158. — Son accouplement, 109, 183, 278. — Il ne produit jamais dans l'état de domesticité, 112. — Manière de le dompter et de le prendre, 113, 191. — Chair particulière et mort d'un éléphant, 123 (note), 276. — Ce qu'il devient une fois qu'il est dompté, 127. — Combien alors il est utile à l'homme, 130. — Sa grande intelligence, 132, 213. — Sa multiplication, et les pays qu'il habite, 134, 144. — Son emploi à la guerre, 137. — Comment on le monte, 139. — Différences entre les éléphants d'Asie et ceux d'Afrique; ils sont plus nombreux en Asie qu'en Afrique, 150, 266. — Leurs forces, 154. — Leur prix et leur valeur, 157. — Services que rendent les éléphants domestiques, 159. — Durée de la vie des éléphants, 160. — Leur couleur, 163, 272. — Leurs yeux, 167. — L'ouïe, 168. — L'odorat, 169. — Le toucher, 170, 173. — La trompe, 170, 175, 245, 272. — Leur mémoire, 175. — Le cerveau de l'éléphant, 174, 271. — Ses pieds, 175. — Résultat de la singulière conformation de ses parties, 176. — Comment les petits têtent, 179, 208. — Marche de l'éléphant dans l'état de liberté, 193. — Sa voix, 195. — Sa peau, 197. — L'eau lui est très-nécessaire, 199. — Conformation singulière de ses pieds et de ses jambes, 200. — Ses oreilles, 202. — Sa queue, 203. — Sa grandeur et son accroissement, 204, 280. — Il nage bien, 209. — Ses organes digestifs, 210. — Particularités sur un éléphant de Versailles, 217. — Autres détails sur l'éléphant, 218. — Eléphant de grandeur prodigieuse, 226. — Particularités de ses défenses, 227. — Ancienne existence des éléphants dans les zones froide et tempérée, 232. — Dent molaire et plusieurs os d'un squelette d'éléphant, 236. — Description d'un éléphant vu à la foire Saint-Germain en 1773, 242. — La femelle, 245. — Addition à l'article de l'éléphant, par Sounnini, 247. — Observations sur les deux éléphants du jardin des Plantes, et comment on les a amenés de Loo à Paris, 248. — Leurs habitudes, 250. — Leur joie à l'instant où ils se trouvèrent réunis dans leurs loges, 254. — Leur intelligence, 255, 275. — Leurs amours, 257. — Sur les défenses de l'éléphant, et sur

la production de l'ivoire, 260. — Ses parties intérieures, 261. — Seconde addition à l'article de l'éléphant, par Virey, 263. — Deux espèces vivantes bien distinctes, 264. — Le tems du rut pour l'éléphant, 277. — Si l'éléphant, dit Linnæus, avoit la force proportionnelle du hanneton, il briserait les plus gros chênes comme de foibles roseaux, déracinerait les rochers les plus énormes et renverserait les montagnes, XXXVII, 134. — Différences entre les éléphants d'Asie, d'Afrique et de l'Europe boréale. *Hist. des Poiss.*, I, 385. — Comparaison de l'éléphant avec le narval vulgaire, ou éléphant de mer, *Hist. des Cétacées*, 227, 245. — Pourquoi celui mort dans la ménagerie du muséum d'histoire naturelle de Paris, n'avoit qu'une défense.

ELPHANTIASIS ou LÈPRE SÈCHE. Maladie très-ordinaire à l'éléphant, et manière de l'en préserver, XXVIII, 198.

ELEPHANTOPES (les). Genre 69 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 192. — Six espèces connues, 193.

ELEUTHERANTHERE (l') ovale. Genre 210 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 256. — Une espèce connue, *idem*.

ELICHRYSES (les). Genre 83 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 236. — L'élichryse éclatant, 237. — L'élichryse à grandes bractées, 238. — Une espèce de France et 24 espèces connues, 239.

ELLEBORE. Genre 12 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 335. — Cinq espèces, 336. — Leur culture et leurs propriétés, 337. *Voy. VERATRES* (les).

ELLIZIA. Genre 9 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 83.

ELMIS. Insecte du genre des nécrophages. *Ex. Elmis Maugeitii*. *Hist. des Insectes*, III, 119. — Genre 66 des insectes, 7^e espèce de la famille 10, les nécrophages, IX, 227.

ELODE. Insecte du genre des cébrionates. *Ex. Cyphon pallidus*. *Histoire des Insectes*, III, 98. — Insectes du genre des coléoptères, VIII, 388. — Espèces; 1^o, la pâle, 2^o, la livide, 389. — 3^o, la grise,

40, la pubescente; 50, la bordée, 390. — 60, la queue noire; 70, l'hémisphérique; 80, l'orbiculaire, 391. — 90, la compressicorne; 100, la fasciée; 110, la testacée; 120, la déprimée, 392.

ELÆOCARPUS. Genre 16 des plantes dites guttiers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 279.

ELORES (les). Genre 179 des poissons; l'élope saure. *Hist. des Poissons*, XII, 277, 278.

ELOPHORE. Insecte du genre des hérophiles; ex. *elophorus aquaticus*. *Hist. des Insectes*, III, 137. — Genre 97 des insectes, 3^e espèce de la 13^e famille, les sphéridiotes, X, 72. — 3 espèces, 75.

ELOQUENCE. Peinture de la véritable, XXI, 403.

ELSHOLTZIES (les). Genre 2 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 319. — Deux espèces connues, *idem*.

ELYMES (les). Genre 55 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 264. — Une espèce remarquable et 2 espèces de France, 265. — 11 espèces connues, 266.

ETYTRAIRES (les). Genre 7 des plantes dites acanthes. *Hist. des Plantes*, XV, 137. — Cinq espèces connues, 138.

ELYTRES, nom qu'on a donné, ainsi que celui d'é-tuis, aux ailes de certains insectes. *Hist. des Insectes*, I, 244 (note). — Ce que c'est que les demi-élytres, 245 (note).

EMARGINULES (les). Genre 37 des mollusques dits gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, V, 231. — Quatre espèces, 232.

EMÉRISSE (l') à cinq couleurs. Oiseau de l'espèce des bruants, XLIX, 94. — Sa description, 95.

EMBOTHRUM (les). Genre 6 de la famille des plantes dites protéées, XI, 211. — onze espèces connues, 212.

EMBONPOINT. Exemples d'hommes d'une grosseur extraordinaire, XVIII, 441.

EMBRYON DE L'HOMME. Voyez Fœtus.

EMBRYON (l') dans les plantes. Ce que c'est, *Hist. des Plantes*, I, 47. — On aperçoit les grands tubes dans l'embryon, 63. — Il n'a que peu ou point de petits

tubes, 71. — On n'y aperçoit point de lacunes, 74. — Ce qu'il est dans son origine, 91. — Ce qu'il devient, 93. — Premières et secondes feuilles qu'il jette, 229. — L'embryon suivi dans sa croissance, II, 66. — Sa division, sa situation et sa forme, 116.

EMERAUDE, XII, 430. — Usages et propriétés que lui attribuoient les anciens, 434, 435. — Fausses émeraudes, 440. — D'où vient la couleur de l'émeraude, 451. — Sur celle du Brésil, 453. — L'émeraude, XVI, 244.

EMERAUDE (l') AMÉTHISTE. 13^e espèce de l'oiseau-mouche, LIII, 188. — Le saphir-émeraude, 12^e espèce, 186. — Le rubis-émeraude, 17^e espèce, 197.

EMERAUDINE (l'). Espèce de pierre, XVI, 289.

ÉMERIL (l'). Expériences comparatives du progrès de la chaleur de ce métal avec d'autres métaux, V, 23, 28. — 2 espèces d'émeril, XIV, 113. — Sa dureté, 114. — Emeril pulvérisé, 115. — Lieux où on le trouve, 116. — Autres détails, 117.

ÉMERILLON (l'). Oiseau de proie, XXXIX, 225. — Sa description, 226. — En quoi on le distingue du hobreau, 227. — Singularité par rapport à sa grandeur, 228. — Autre espèce décrite par M. Frisch, 229. — Ses différences avec la première espèce, 230. — Ce qu'en dit Daudin, *idem* (note). — L'émerillon malfini, 245. Voy. cet article. — L'émerillon de Saint-Domingue, 253. — L'émerillon varié de la Caroline, trouvé par Bosc-d'Antic, 255. — Sa description, 256. — Le tiny, 258. — L'émerillon du Bengale, 259. — Sa description, 261. — L'émerillon de Sibérie, découvert et décrit par Pallas, 263.

ÉMÉTIQUE (la cephelide). *Histoire des Plantes*, XIV, 112. — 15 espèces connues, 114.

EMIONITE. Genre des fougères, et ses espèces. *Hist. des Plantes*, III, 187. — 4 espèces, 210; IV, 67.

EMISOLE (l'). 12^e espèce des squales. Sa nomenclature. *Histoire des Poissons*, IV, 48. — Ses dents, 49. — Ses rapports de conformation avec le squal milandre, 50. — Anatomie de son fœtus, donné par Ste-non, 51 (note).

EMOI (l'), 1^{re} espèce du genre des poissons appelés polynèmes. *Hist. des Poissons*, XII, 412, 415. — Lieux où on le pêche, 416. — Sa description, 418.

EMPEREUR (l'). 6^e espèce du genre des poissons appelés holacanthés. *Histoire des Poissons*, XI, 202, 213.

EMPETRUM. Voy. CAMARINE.

EMPIDES (les). 89^e famille d'insectes. Leur description. *Hist. des Insectes*, XIV, 310. — Genre 490, les platyptères, 311. — Genre 491, les empis, 312. — Genre 492, les siques, *idem*.

EMPIIS. Insecte papillon. *Hist. des Insectes*, III, 435. — Genre 491 des insectes de la famille des empides, XIV, 312.

EMPLEVRUM. Genre 10 des plantes rutacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 111.

ENCELIES (les). Genre 161 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 158. — 2 espèces connues, 159.

ENCOUBERT (l'), ou le tatou à six bandes, XXVII, 283. — Sa description, par M. de Sève, 287.

ENCRE DE LA CHINE. Si c'est du poulpe granuleux et de celui musqué que les Chinois tirent leur encre. *Hist. des Mollusques*, III, 34, 35, 95.

ENCRE DE LA SÈCHE. Ce que c'est, et à quoi elle sert à la Sèche. *Hist. des Mollusques*, I, 241. — Usage qu'en faisoient les Romains, et qu'en font les Chinois, 242.

ENCRE de sympathie, fournie par le cobalt, XII, 242 (note).

ENDIVE (l'), ou la chicorée de jardin. *Hist. des Plantes*, XII, 50.

ENDOMIQUES (les). Insectes de la 38^e famille; les tridigités. *Histoire des Insectes*, XII, 48. — Genre 247, p. 76. — 5 espèces, 77.

ENFANCE. Considérations sur l'enfant qui vient de naître, XVIII, 255. Voy. ENFANS.

ENFANS. Si ceux qui naissent à huit mois peuvent vivre, XVIII, 202. — Si les femelles naissent plus

ard que les mâles, 207. — Etat de l'enfant qui vient de naître ; sa respiration ; expériences sur des petits chiens, 256. — Ses sens externes, 263. — Sa grandeur, 264. — Lavage de son corps, 266. — A quel temps il faut commencer à le faire teter, 270. — Section du filet, *idem.* — Inutilité et danger du maillot, 271, 274. — Soins des enfans nouveaux nés dans différens pays, 276. — Négligence des nourrices, 277. — Quand et comment on doit les bercer, 278. — Moyen à employer pour que leurs yeux acquièrent une égale force, 279. — Leur allaitement, 280. — Leur nourriture par le lait des animaux, 281, 282. — Origine et développement des dents, 285. — Leurs cheveux, 288. — Hernies à la suite des cris trop forts, 289. — Maladies des enfans, *idem.* — Etat de leur poulx, 290. — Leur mortalité, 291. — Très-grande mortalité des enfans à Londres, XVIII, 292. — Leur accroissement. Table à ce sujet, 295. — Enfans devenus tous grands en très-peu de tems, 303. — Danger de leur nombreux rassemblement dans un même lieu, 307. — Développement chez eux de la parole, 308. — Table de la probabilité de la vie pour un enfant nouveau né, XIX, 100. — Vérités à tirer de cette table, 108. — Table pour un enfant d'un an, 113. — Résultats de cette table, 121. — Table pour un enfant de deux ans, 123. — Table de probabilité de la durée de la vie pour un enfant de trois ans, 127. — Les tables se succèdent ainsi par année jusques et compris celle de quatorze ans. — Mois dans lequel il naît le plus d'enfans, 330. — Examen des yeux de l'enfant nouveau né, et leur développement, 407.

ENFANS TROUVÉS. Leur nombre, par chaque année, depuis 1745 jusques et compris 1766, a été de quarante-vingt-dix-neuf mille deux cent dix, XIX, 334.

ENGOULEVENT. (l'). Oiseau dont le nom est difficile à déterminer ; sa synonymie, LIV, 294. — D'où lui viennent ses différens noms, 298. — Pourquoi on lui a conservé celui d'engoulevent, 299. — Sa nourriture, 300. — Lieux où il est répandu, 301. — Lieux où il fait son nid, 303. — Ses œufs, 304. — Son vol

singulier, 305. — Son cri, 306. — Sa manière de percher, et son plumage, 307. — Attributs qui le caractérisent, 308. — Oiseaux étrangers qui ont rapport à cet oiseau, 311. — Le principal attribut de l'engoulevent est d'avoir les organes de la vue trop sensibles pour soutenir la clarté du jour; ce qui en résulte, 315. — Autre effet résultant de cette incommodité, 317. — L'engoulevent de la Caroline, 322. — Ses habitudes naturelles, et sa longueur totale, 324. — Le whip-poor-will de Virginie, 325. — Le guira-querea, deux espèces décrites par Sloane et Marcgrave, 329. — L'ibijau, 333. — Ses variétés. Le petit engoulevent tacheté de Cayenne, 1^{re} variété, 335. — Le grand ibijau, 336. — Le grand engoulevent de Cayenne, 338. — L'engoulevent à lunettes, ou le haleur, 340. — Sa description, 342. — L'engoulevent varié de Cayenne, 343. — Sa description, 344. — L'engoulevent acutipenne de la Guiane, 346. — L'engoulevent gris, 348. — Le monvroyau de la Guiane, ainsi nommé à cause de son cri, 349. — L'engoulevent roux de Cayenne, 351. — L'engoulevent à cou blanc, 353. — L'engoulevent musicien, par le Vaillant, 355. — L'engoulevent de Bombay, 357. — L'engoulevent cendré rayé de noir, 359. — L'engoulevent à crête, décrit par le capitaine Phillipp, 360. (Ces engoulevents, depuis celui de la page 353, sont décrits par Sonnini). — Différences et traits de ressemblance entre les engoulevents et les hirondelles, 364.

ENGOURDISSEMENT léthargique des animaux. Erreur rectifiée de Buffon à ce sujet. *Hist. des Reptiles*, I, 201. — Ses effets chez quelques animaux. *Histoire des Poissons*, II, 27.

ENHYDRES (les). Genre 14 des reptiles ophidiens. Leur description générale. *Hist. des Reptiles*, VII, 232. — L'enhydre dorsale, 235. — Tableau méthodique des enhydres, VIII, 418.

ENHYDRES. Espèce de cristaux, XII, 362.

ENNEACANTHE (l'). 46^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 126 et

209. — On appelle aussi de ce nom la deuxième espèce des poissons dits scarés, 341 et 353.

ENNEADACTYLE (l'). 2^e espèce du genre des poissons appelés pomacentres. *Hist. des Poissons*, XI, 176, 180.

ENOUREA. Genre 14 des plantes dites savonniers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 308.

ENOPLIE, *enoplium*. Insecte du genre des clairones; ex. *Tillus serrati-cornis*. *Hist. des Insectes*, III, 111. — 50^e genre d'insectes, 2^e espèce de la famille des clairones, IX, 146. — 2 espèces, *idem*.

ENOPLOSE. Poisson du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 151. — Genre 135 des poissons, celui appelé *white*, XI, 218, 219.

ENTEILLE (l'). Espèce de singe, décrit par Dufresne, zoologiste, XXXVI, 85. — Sa description, 91.

ENTOMOLOGIE, ou discours sur les insectes. *Voyez* INSECTES. — Exposition des systèmes entomologiques. *Hist. des Insectes*, II, 293.

ENTOMOSTRACÉS. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 13. — S'ils doivent être compris avec les crustacés. IV, 7. — Leur description, 9. — Ils forment la première classe des crustacés, et comment on les distingue de ceux-ci, 14. — Considération sur leur forme générale, 15. — Leurs organes extérieurs, 16. — Leurs yeux, 19. — Leurs organes nutritifs, 20. — L'eau est leur habitation, 23. — Ils sont transparens, et on aperçoit, à travers leur coquille, les œufs de la femelle, 23, 36. — Leur manière de s'accoupler, 24. — Leur nature carnassière, 26. — Ce que dit Geoffroy de ces insectes, 32. — Espèces qu'a décrites Muller, 55. — Méthode de Linnæus, 60. — De Fabricius, *idem*. — De Cuvier, 62. — De Lamarck, 64. — Nouvelle division de ces insectes, *idem*. — Sur ceux operculés, 66. — Les xiphosures, 67. — Quelques espèces moins connues, 322. — Celle céphalote, 323. — 2 espèces appartenant au genre des lyncées, 325. — Sous-classe première de crustacés, V, 184, 185.

EPACHRIS. Genre 9 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 240. — 3 espèces, 241.

EPÉE (l'). 2^e espèce de xiphias, poisson de la classe des osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 166. — Ses différences très-grandes avec l'espardon, 167.

ÉPEICHE (l'). Oiseau de la 3^e espèce des pics d'Europe. Le pic varié, 1^{re} espèce, LV, 338. — Sa description, 340. — Ses variétés, 341. — Ses habitudes, 345. — Le petit épeiche, 2^e espèce, 346. — Ses habitudes, 348. — Oiseaux de l'ancien continent qui ont rapport à l'épeiche. Celui de Nubie ondé et tacheté, 1^{re} espèce, 351. — Le grand pic varié de l'île de Lucou, 2^e espèce, 353. — Le petit épeiche brun des Moluques, 3^e espèce, 355. — Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport à l'épeiche. L'épeiche du Canada, 1^{re} espèce, 357. — L'épeiche du Mexique, 2^e espèce, 360. — L'épeiche ou pic varié de la Jamaïque, 3^e espèce, 362. — L'épeiche ou pic rayé de la Louisiane, 4^e espèce, 365. — L'épeiche ou pic varié de la Encenada, 5^e espèce, 367. — L'épeiche ou pic chevelu de Virginie, 6^e espèce, 368. — L'épeiche ou petit pic varié de Virginie, 7^e espèce, 370. — L'épeiche ou pic varié de la Caroline, 8^e espèce, 372. — L'épeiche ou pic varié ondé, 9^e espèce, 375. *Voyez* PICS (les).

ÉPEOLE. Insecte du genre des apiaires; ex. *Nomada variegata*. *Hist. des Insectes*, III, 375. — Genre 416 des insectes de la famille des apiaires, XIII, 277. — 2 espèces, XIV, 49.

ÉPERLAN (l'). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés osmeres. *Hist. des Poissons*, XII, 207, 210. — Odeur qu'il répand, 211. — Particularités sur ce poisson, 212. — Espèce particulière, 215.

ÉPERON (l'). Poisson du genre des centronotes. *Hist. des Poissons*, VIII, 411, 50^e espèce du genre des poissons appelés holocentres, X, 374; et XI, 22.

ÉPERONNIER (l'). Espèce de paon ou de faisan. Variétés à ce sujet des auteurs, XLII, 234. — Sa description. Le trait le plus singulier est celui du triple ergot au pied gauche, 238. — Celui de Sonnerat, 240 (note).

EPERUA. Genre 12 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 264.

ÉPERVIER (l') réduit à une seule espèce, XXXIX, 5. — Différences fondées sur les couleurs, 9. — Comment on le distingue des autres oiseaux de proie, 10 (note). — Sa description, 11 (note). — Manière dont on le prend, décrite par Belon, 12 (note). — Ses voyages, et lieux où on le trouve, 14 (note). — L'épervier à collier, par Sonnini, 26. — Sa description, par Sonnerat, sous le nom de faucon à collier, 28. — L'épervier brun, de Ceylan, 30. — L'épervier à longue queue, de Sibérie, 32. — Le gabar, 35. — Le minulle, 38. — Le tachiro, 42. — L'épervier de Madagascar; sa description, 46. — L'épervier à gros bec, de Cayenne, 48. — Sa description, par Sonnini, 49 (note). — L'épervier des terres de la Guiane française, 2 espèces, 52. — Le grand épervier de Cayenne, 55. — L'épervier à ventre roux de Cayenne, 57. — Sa description, 58. — L'épervier cendré de Cayenne; sa description, 59. — Le petit épervier de Cayenne; sa description, 61. — L'épervier rayé; sa description, par M. Miller, 63. — Le petit malfini, 67. — (Tous ces éperviers, depuis celui de la page 26, sont décrits par Sonnini). — L'épervier de pigeons, décrit par Catesby, ou l'oiseau de la Caroline, 65. — Prétendue métamorphose du coucou en épervier, et anecdote à ce sujet, LIII, 361. — Combat d'un jeune coq avec un épervier, *idem*.

ÉPERVIER (l'). Espèce de filet pour la pêche; sa description. *Hist. des Poissons*, XII, 297 (note). — Espèce de filet dont on se sert pour la pêche dans les rivières. Sa description, XIII, 349. — Comment on s'en sert, 350. — Comment on le jette, 352.

ÉPERVIÈRES (les). *Hieracium*. Genre 7 des plantes dites chicoracées. *Hist. des Plantes*, XI, 354. — 39 espèces de France, 355. — 74 espèces connues, 367.

EPHEDRA (les). Genre 1 des plantes dites conifères. *Hist. des Plantes*, X, 171. — Une espèce de France et 3 espèces connues, 172.

ÉPHÉMÈRES (les). Espèce d'insectes. Leur accou-

plement. *Histoire des Insectes*, II, 258. — Ils sont du genre des papilionoées. *Ephemera vulgata*, III, 297. — Genre 324 d'insectes, 2^e espèce des tryganides; d'où leur vient leur nom, XIII, 74 et 82 — Leurs larves, *idem*. — Observations sur ces insectes, 79. — Leurs habitudes, 80. — Leur nourriture, 84. — Leur description, 93. — Dix-neuf espèces, 94.

EPHÉMÈRES (les). Genre 5 de la famille des plantes commelines. *Hist. des Plantes*, VIII, 189. — Espèces remarquables, l'éphémère de Virginie, 190. — Celle baccifère, 191. — 17 espèces connues, 192.

EPHINÉPHELE (l'). 12^e espèce du genre des poissons appelés holocentres. *Hist. des Poissons*, X, 359, 397.

EPHIPPIES (les). Genre 510 d'insectes de la famille des stratonèdes. *Histoire des Insectes*, XIV, 341.

EPI (l'). *spica*, considéré dans les fleurs. *Hist. des Plantes*, II, 197. — L'axe de l'épi, 198.

EPIAIRES (les). *Stachys*. genre 31 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 350. — 10 espèces de France, 351. — 28 espèces connues, 354.

EPI D'EAU ou POTAMOGETON. Genre 8 des plantes naiades. *Hist. des Plantes*, III, 230. — 11 espèces, 231. — Propriétés, 232.

EPIBATERIUM. Genre 4 des plantes ménispermes. *Hist. des Plantes*, XVIII, 315.

EPIDENDRONS. Voyez ANGRÈES.

EPIDERME (l') des plantes. *Hist. des Plantes*, I, 84. — Sa comparaison avec celui des animaux, 85. — Pourquoi il est facile de le détacher, au printemps, des jeunes branches, 87. — Des causes secondaires modifient sa nature, et il devient un organe dont les fonctions sont très-distinctes et très-importantes, 89. — Sur l'épiderme, 371, 372. — Ce qu'on doit penser de l'épiderme, II, 403.

EPIGEA. Genre 8 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 239.

EPILEPSIE. Préjugé sur la guérison de l'épilepsie avec la corne des pieds de l'élan, XXX, 143. — Maladie à laquelle les serins et plusieurs autres animaux

sont très-sujets, XLVII, 254. — Les chardonnerets y sont sujets; quelle en est la cause, XLVIII, 155. — Les perroquets y sont plus sujets, et particulièrement l'espèce qu'on appelle *ara*, LXIII, 290.

EPILOBES (les), *onagræ*. Onzième ordre, famille 76 de la 4^e classe des plantes dites dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 222. — Genres voisins de la famille des myrtes, mais ayant leurs étamines en nombre déterminé. Un style, un fruit, une baie, 229. — Autre description, XVII, 35. — § 1. Styles répétés. — Genre 1, *mocanera*. — Genre 2, *vahlia*, 36. — Genre 3, *cercodea*, 37. — § 2. Deux styles, fruits capsulaires, étamines égales en nombre aux pétales. Genre 4, *montinia*, 37. — Genre 5, *serpicula*; et genre 6, *circée*, 38. — Genre 7, *ludwigia*, 40. — § 3. Un seul style, fruits capsulaires, étamines en nombre double des pétales. — Genre 8, *Jussieu*, 40. — Genre 9, *herbe aux ânes*, ou *onagre*, *ænothera*, 41. — Genre 10, *épilobe*, 44. — 7 espèces, et leurs propriétés, 45. — Genre 11, *gaura*, 47. — Genre 12, *cacoucia*, *idem*. — Genre 13, *combretum*, 48. — Genre 14, *guier*, *idem*. — Genre 15, *fuchsia*, 49. — Genre 16, *mouriria*, 50. — Genre 17, *ophira*, *idem*. — Genre 18, *bœckea*, 51. — Genre 19, *memecylon*, *idem*. — Genre 20, *jambolifera*, 52. — Genre 21, *escallonia*, *idem*. — Genre 22, *sirium*, 53. — Genre 23, *santal*, *idem*. — § 4. Genres rapprochés des précédens. — Genre 24, *menzelia*, 54. — Genre 25, *loosa*, 55.

EPIMEDIUM. Genre des plantes dites vinettiers. *Hist. des Plantes*, XVII, 390.

EPINARDS (les). Genre 16 de la famille des plantes dites arroches. *Histoire des Plantes*, XI, 39. — L'épinard cultivé, 40. — Une espèce de France, et 2 espèces connues, 41.

EPINE (l') de l'homme; description des os qui la composent, XXI, 70.

EPINES (les) des plantes; ce que c'est. *Hist. des Plantes*, I, 296. — Leurs dispositions, 297. — Leur

formation, 298. — Si ce sont des branches ou des rameaux avortés, 299. — Résultats de la formation des épines et leurs usages, 301. — Leurs divisions, II, 251.

EPINETTE. Boisson que l'on fait avec la sapinette du Canada. Manière dont on y procède. *Histoire des Plantes*, X, 239.

EPINE-VINETTE. *Berberis*. Genre 1^{er} des plantes dites vinettiers. *Hist. des Plantes*, XVII, 386. — 4 espèces, 387. — Leurs propriétés, 388.

EPINOCHÉ (l'). Poisson du genre des gasterostées. Sa description. *Hist. des Poissons*, VIII, 378. — Ses habitudes, 382. — L'épinochette, 386.

EPIPACTIS (les). Genre 12 des plantes dites orchidées. *Hist. des Plantes*, IX, 212. — 7 espèces de France, 213. — 13 espèces connues, 215.

EPIPONE (l'). Insecte du genre des guépières; ex. *Vespa nidulans*. *Hist. des Insectes*, III, 364. — Genre 402 des insectes de la famille des guépières. XIII, 330. — Leur industrie dans la construction de leurs cellules, 331. — Genre 402. 349.

EPIPPHIE. Insecte particulier. *Hist. des Insectes*, III, 448.

EPITRAGE. Insecte du genre des coryphées; ex. *helops variegatus*. *Hist. des Insectes*, III, 165. — Genre 152 d'insectes, 9^e espèce de la 20^e famille, les diapiérides, X, 322.

EPIZOOTIE. Maladie qui a eu lieu en 1737, et qui a été décrite par M. Chaignebrun, dans les environs de la forêt de Crecy. *Hist. des Poissons*, II, 38.

ÉPONGE, spongia. Plante marine. *Hist. des Plantes*, III, 252. — 16 espèces, 253.

ÉPOQUES de la nature, III, 153, avant-propos. — Six époques à distinguer dans la plus grande profondeur des tems, 193. — Sous ce titre d'époques de nature sont comprises plusieurs matières particulières, qui seront relatées dans cette table suivant leur ordre alphabétique. *Voy. NATURE, TERRE.*

EPOUVENTAIL (le), ou la guifette noire, 17^e espèce

d'hirondelle de mer, LX, 104. — D'où lui vient ce nom, 105.

EPURGE (l'euphorbe). Plante de la famille des euphorbes. *Hist. des Plantes*, X, 16, pl. XII.

EQUISETUM. Voyez PRÊLE.

ÉRABLES (les), *acera*. Famille 98 des plantes. *Hist. des Plantes*, VI, 35. — § 1. Fruit à plusieurs loges, et leurs différens noms, 36. — § 2. Fruit à plusieurs capsules, 37. — § 3. Genres qui ont des rapports avec les érables, 38. — Description, XVIII, 291. — Genre 1, maronnier d'Inde, *hippocastanum*, 292. — Genre 2, érable; *acer*, 294. — Trois espèces, 295. — Propriétés, 296. — Genre 3, *hippocratea*, 297. — Genre 4, *tryallis*, 298.

ÉRANTHÈMES (les). Genre 24 des plantes dites gatiliers. *Hist. des Plantes*, XV, 243. — Cinq espèces connues, 244.

ERGOTS ou éperons. Caractère singulier dans les ailes de certains oiseaux, que la nature a peu répété; LXI, 195 (note).

ERGOT (l'). Maladie du blé. XVIII, 25. — Sa décomposition, 32.

ÉRIANTHES. Genre 3 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 104. — 2 espèces connues, 105.

ERICÆ. Voy. BRUYÈRES.

ÉRINE. Genre 1 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 2.

ÉRIOCÉPHALES (les). Genre 156 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 147. — Trois espèces connues, 148.

ÉRIOPHORES (les). Genre 6 des plantes dites souchets. *Hist. des Plantes*, VII, 47. — Une espèce remarquable, et 4 espèces de France, 48. — 6 espèces connues, 49.

ÉRIOSPERMUM (les). Genre 19 des plantes dites asphodèles. *Hist. des Plantes*, VIII, 380 — 3 espèces connues, *idem*.

ÉRIOX. 4^e espèce du genre des poissons appelés *salmones*. *Hist. des Poissons*, XII, III. 156.

ÉRISTALES (les). Genre 526 de la famille des syr-

phies. *Hist. des Insectes*, XIV, 363. — Six espèces, 364.

ERITHALES (les). Genre 71 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 92. — Deux espèces connues, 93.

ERNODÉES (les). Genre 13 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 362. — Deux espèces connues, *idem*.

ERODIE. Insecte du genre des pimeliaires. Ex. *Erodus gibbus*. *Histoire des Insectes*, III, 166. — Genre 124 d'insectes, 2^e espèce de la famille 18, les pimeliaires, X, 263.

ERODONES (les). Genre 163 des mollusques dits acéphales. *Histoire des Mollusques*, VI, 430. — Deux espèces, 431.

EROTYLE, EROTYLÈNES. Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, III, 233, 234; V, 254. — Genre 242 d'insectes de la famille 34 (les) érotylènes; les crotyles, XII, 36. — Celui géant; celui bossu, et celui surinamois, 37. — Genre 241, les languries, 35.

ERPÉTOLOGIE, ou discours sur les reptiles. *Voyez* REPTILES.

ERPÉTONS (les). Genre 16 des reptiles appelés ophiidiens; leur description. *Hist. des Reptiles*, VII, 243. — L'erpéton tentaculé, 246. — Sa description, 247. — Ses dimensions, 250. — Tableau méthodique des erpétons, VIII, 418.

ERVUM. *Voy.* LENTILLE.

ERYNGIUM. *Voy.* PANICAUT.

ERYSIMUM. *Voy.* VELAR.

ERYTHROPTÈRE (l'). 18^e espèce du genre des poissons appelés pimelodes. *Hist. des Poissons*, XII, 47, 67.

ERYTHROXILUM. Genre 5 des plantes dites malpighies. *Hist. des Plantes*, XVIII, 289. — Deux espèces, 290.

ERYTHRINA. Genre 51 des plantes dites légumineuses, *Hist. des Plantes*, XVII, 324. — Cinq espèces, et leurs propriétés, 325.

ERYX (les). Genre 17 des reptiles dits ophiidiens; leur description.

description. *Hist. des Reptiles*, VII, 251. — Leurs habitudes, 253. — L'éryx céaste, 254. — Sa description, 255. — L'éryx javelot, 257. — Sa description, 258. — L'éryx gronovien, 260. — L'éryx couleuvrin, 261. — L'éryx roux, 263. — Sa description, 264. — L'éryx turc, 267. — Sa description, 268. — L'éryx miliaire, 270. — L'éryx pintade, 272. — Ses variétés, 273. — L'éryx à points noirs, 275. — Autre espèce, 277. — L'éryx bramane, 279. — L'éryx de Clèves, 281. — Tableau méthodique des éryx, VIII, 419.

ESCALLONIA. Genre 21 des plantes dites épilobes. *Hist. des Plantes*, XVII, 52.

ESCARBOT. *Hister*. Insecte du genre des nécrophages. Ex. *Hister unicolor*. *Hist. des Insectes*, III, 117.

— Genre 58 d'insectes; 1^{re} espèce de la famille 1^{re}, les nécrophages, IX, 191. — 20 espèces, 193.

ESCARBOUCLE (l'). Genre 14 des oiseaux-mouches, LIII, 190. — Remarque de Sonnini sur cet oiseau, 191.

ESCARBOUCLE, appelé *carbunculus* par les anciens, est le véritable grenat des modernes, XIII, 35.

ESCARGOTS. Voy. HÉLICES (les).

ESCHARE. Plante marine. *Hist. des Plantes*, III, 254. — Trois espèces, *idem*.

ESCLAVE (l'). Oiseau formant la 13^e espèce des tangaras, XLVIII, 301. — Ses rapports et ses différences avec la grive, 302. — Lieux où on le rencontre, 303.

ESCLAVES (les). Leur commerce, XX, 226.

ESCOBEDIE (l') du Pérou. Genre 10 des plantes dites rhinanthacées. *Hist. des Plantes*, XV, 58. — Une espèce connue, 59.

ESOCES (les). Genre 182 des poissons, 1^{er} sous-genre. La nageoire de la queue fourchue, ou échan-crée en croissant. Le brochet, 1^{re} espèce. *Hist. des Poissons*, XII, 284. — L'américain, 285, 301. — Le belone, 285, 302. — L'argenté, 285, 307. — Le gam-baru, 285, 307. — L'espadon, 286, 310. — La tête nue, 286, 312. — Le chirocentre, *idem*. — 2^e sous-genre.

Tab. TOME I.

Z

La nageoire de la queue rectiligne ou arrondie et sans échancrure. L'ésoce verd, 287, 313

ESPACE. Ce que c'est. *Hist. des Poissons*, I, 361.

ESPADON (l'). 1^{re} espèce des xiphias, poissons de la classe des osseux. *Hist. des Poissons*, VI, 155. — Ses habitudes douces, 157. — Sa description, 159. — Son habitation, 161. — Sa grandeur et sa force, 162. — Manière dont on le pêche dans le détroit de Messine, 164. — Insectes aquatiques qui le tourmentent, 165. — 6^e espèce du genre des poissons appelés *ésoces*, XII, 286, 307 et suiv.

ESPAGNOLS. Leur taille, leur figure, XX, 235.

ESPÈCES dans les animaux, XXII, 280. — Idée nette de ce que l'on appelle espèce, 287. — Cette dénomination ne doit s'étendre qu'aux animaux et aux végétaux, et non aux minéraux, XXIII, 289. — Ce qu'il faut entendre par espèces nobles dans la nature, XXVI, 182. — Observations relatives au mot espèce dans les animaux, LX, 37. — Discours sur la durée des espèces, par M. Lacépède, premier volume de l'histoire des poissons, 361, 366. — Distinction de leur durée avec celle des individus qu'elles renferment, 367, 368. — Qu'est-ce qu'une espèce, 369. — Différences entre elle et l'individu, 370. — Sur les deux manières dont une espèce peut s'éteindre, 374. — Causes principales, au nombre de trois, qui peuvent faire disparaître une espèce par une longue suite de nuances insensibles et d'altérations successives. 375. — Echelle composée de douze degrés principaux par lesquels l'espèce atteint la fin de sa durée, 376. — Époques où se manifestent ces changemens, 378. — Effets de l'art pour altérer une espèce et en abrégier la durée, 379. — Effets de la nature dans l'altération et la durée de l'espèce, *idem*. — Détails sur les douze modifications par lesquelles une espèce peut passer de dégradation en dégradation jusqu'à la perte totale de son existence, 393. — Le requin et le squalo roussette offrent un exemple frappant de la cinquième modification qu'une espèce peut subir, c'est-à-dire, de la diminution de grandeur qu'elle peut éprouver, 394. — Deux

considérations, à ce sujet, assez importantes, 395. — La 12^e modification, où la détermination des endroits dans lesquels habitoit anciennement une espèce, est plus facile que celle des autres modifications, 397. — Ce qui en résulte, 398. — Exemples tirés 1^o du mont volcanique de Bolca, près Véronne en Italie, 399. — 2^o, de la carrière d'Eningen, près du lac de Constance, 402. — Nous ne connoissons pas assez la surface du globe, ni les mers qui l'environnent, pour prononcer formellement qu'une espèce a terminé sa durée, 405. — Détermination des époques pendant lesquelles subsistoient une ou plusieurs des modifications dont il a été question plus haut, 408. — Travail de la nature créatrice des espèces. *Histoire des Poissons*, II, 82. — Considération de la nature vivante, comme se balançant entre les deux grandes limites que lui opposeroient à une extrémité un petit nombre d'espèces primitives, et à l'autre extrémité, l'infinité de toutes les espèces qu'on peut imaginer. 83.

ESPERANCE (l'étalage de l'). est le leurre de tous les pipeurs d'argent, XXI, 150.

ESPION (l'). Espèce de merle de roche d'Afrique, XLVI, 187. — Ses ruses et ses habitudes, 188. — Son plumage, et lieux où on le trouve, 190.

ESPRIT. En quoi consiste la différence des esprits, XXI, 298. — Plus on a d'esprit et plus on existe, 300.

ESQUIMAUX. Quels peuples on comprend sous ce nom, XX, 419.

ESSENCE ORIENTALE. Liqueur que l'on fait avec les écailles du poisson cyprin appelé *l'able*, et dont on fait de belles perles. *Hist. des Poissons*, XIII, 199.

ESTOMAC. Description de celui de l'homme, XXI, 93. — L'homme et certains animaux, qui n'ont qu'un estomac, ne peuvent vivre de végétaux seuls, XXIII, 7. — Objection à ce sujet, 8. — L'écrevisse renouvelle son estomac, avant de changer de peau. *Hist. des Insectes*, V, 137.

ESTRAGON (l'armoise). *Hist. des Plantes*, XIII, 78.

ESTURGEON. 1^{re} espèce des poissons acipenssères. Sa nomenclature, *Hist. des Poiss.*, IV, 331. — Sa description, 335. — Ses parties internes, 339 (note). — Sur l'ouïe de ce poisson, *idem.* — Sa couleur et sa grandeur, 340. — Son poids et mers qu'il habite, 341. — Ses habitudes, 342. — Sur celui pris en 1800 à Neuilly-sur-Seine, 343 (note). — Fleuves où il est plus nombreux, 344 (note). — Sa nourriture, 347. — Excellence de sa chair, et comment on l'apprête, 349. — Pourquoi on peut le garder hors de l'eau pendant plusieurs jours, sans qu'il périsse, 350. — Sur le bouillon d'esturgeon, 351 (note). — Comment les pêcheurs l'appréteant, après l'avoir tiré sur le rivage, 365. — La colle de poisson est pour la Russie le produit le plus considérable de la pêche de l'esturgeon, 368 (note). — L'esturgeon étoilé, 3^e espèce d'acipensère, 383. — Sa description, 384. — Description des différentes manières dont on fait la pêche des esturgeons: 1^o, sur le Danube, 385. — 2^o, dans les fleuves de la Russie et de la Sibérie, 387. — 3^o, pêche de l'esturgeon étoilé, 396. — 4^o, celle de la kama, 402. — Extraits sur quelques autres pêches, 404. — Pêche au filet usitée par les pêcheurs d'Astracan, 408. — Tableau des produits que la pêche des esturgeons donne aux Russes d'Astracan, 412. — 1^o, pêche de l'ichthyocolle, 413. — 2^o, pêche du sterlet, 415. — 3^o, pêche de l'esturgeon étoilé, 416. — Pêcherie de Sallian en Perse, 417.

ETAIN. Expériences sur les progrès de la chaleur dans ce métal, V, 13, 14. — Autres expériences sur l'étain, 17. — Sur l'étain vierge, par Sonnini, XI, 327 (note). — Ses mines, 329. — Moyen de le séparer de l'argent, 331. — Ses mines artificielles, 336. — Ses propriétés, 338. — Son usage est très-ancien, 342. — Lieux où il se trouve, 345. — Expérience sur l'étain, par MM. Bayen et Charlard, 354. — Son alliage, 366, 378. — Sa dissolution par les acides, 370. — Ses rapports avec le zinc, XII, 146. — Ses concrétions, XIV, 163. — Sur l'étain natif, 164 (note). — De l'étain, et de ses différentes espèces, XVI, 170.

ETAIN DE GLACE. Voyez BISMUTH, et d'où lui vient ce nom, XII, 125.

ETAMAGE. Observations sur l'étamage, XI, 375. — Etamage avec le bismuth, XII, 125 (note). — Avec le zinc, 148.

ETAMINE (l'), ou l'organe mâle des végétaux. *Hist. des Plantes*, I, 41. — Observations relatives à la métamorphose des étamines en pétales, II, 31. — Rapport entre les étamines et la corolle, 32. — Nombre des étamines, 169. — Leur grandeur relative, 170. — Leur situation, 171. — Leurs connexions ou réunions, 172.

ÉTANG. Description, par M. Varenne de Fenille, de la mortalité qui régna en 1788 et 1789, parmi les poissons, dans les grands et nombreux étangs des environs de Bourg. *Hist. des Poissons*, II, 36. — Procédé pour féconder les poissons dans les étangs, dont le fond est vaseux, 48. — Observations sur les étangs, 296. — Discours prononcés, écrits répandus pour provoquer leur anéantissement, 297. — Sur ceux marécageux, *id.* — Avantages que procurent ceux qui ne le sont pas, 298. — Effets du froid sur les poissons renfermés dans ces étangs, et moyen de les préserver de la mortalité qui souvent a été occasionnée parmi eux; extrait d'un mémoire de M. Varenne de Fenille, 300. — Détails sur la gelée, en 1788, des étangs de Bresse, 301. — Opinion de M. Cretté à ce sujet, 303. — Trois classes principales d'étangs, 305. — Observations sur la mortalité produite par la gelée dans ces étangs, 306. — Sur la précaution de faire des trous dans la glace pour donner de l'air au poisson, 307, 333. — Faits particuliers qui confirment les faits généraux relatifs à la mortalité, 309. — Lettre de Dom Armely sur cette mortalité, 311. — Conclusions à tirer des faits rapportés, 316. — C'est uniquement à la qualité de l'air, que le poisson a été forcé de respirer, qu'il faut attribuer la mortalité qu'il a éprouvée, *idem.* — Expériences confirmatives de cette cause, 322. — Conclusions tirées de ces expériences, 330. — Préservatif contre la mortalité du poisson dans les étangs pendant les grands hivers, 333.

— Distinction entre les étangs situés sur une argile blanche, et ceux placés sur la vase, 336. — Particularités sur les étangs, 340. — Méthode de pêcher un étang sous la glace, 342.

ÉTÉ. Réfutation de l'explication donnée par M. de Mairan, sur l'égalité des étés, et la grande inégalité des hivers, VII, 312. — Sa véritable cause, 316. — Sur l'été du Groenland, X, 111 (note).

ÉTÉ ou TOU-ÉTÉ (l'). 4^e espèce de tou ou la perriche à queue courte, LXIV, 91.

ETHER. Son affinité avec l'or, XI, 52.

ETHIOPIENS. Erreur sur leur couleur et les traits de leur visage, XX, 243, 246. — Leurs habitudes, 248, 249.

ETHIOPS MINÉRAL (l'). Ce que c'est, XII, 54.

ETHULIÉS (les). Genre 135 des plantes composées, *Hist. des Plantes*, XIII, 55. — Quatre espèces connues, 56.

ETIQUETTES (les). Petits filets dont on se sert pour la pêche dans les rivières. *Hist. des Poissons*, XIII, 358.

ETNA (le mont). Sa description, ses effets et ses changemens, II, 355, 361 et suiv. — Ses éruptions, 378, 383, 386.

ETOILES. Pourquoi on ne voit pas de planètes autour des étoiles fixes, III, 219. — Conjectures sur l'état des étoiles fixes, VII, 291.

ETOILÉ (l'). 13^e espèce des squales, indiquée par Rondelet. *Hist. des Poissons*, IV, 52. — Taches de sa peau, 53.

ETOILÉ (l'). Le baliste étoilé, 2^e espèce, décrite par Commerson. *Histoire des Poissons*, IV, 233. — Sa description, 234.

ETOILÉ (l'). 1^{re} espèce d'oiseau butor du nouveau continent, LVII, 298.

ETOURNEAU (l'), XLV, 35. — Ses rapports avec les merles, et ses voyages, 37. — Singulier procès à son sujet, 38. — Sa manière de voler, ses avantages et ses inconvéniens, 40. — Ses amours, 43. — Ponte de la femelle, 44. — Ses plumes et leur couleur, 45. — Sa

nourriture, 47. — Comment on le chasse, 51. — Lieux où on le trouve, 54. — Ses variétés, 56. — L'étourneau blanc d'Aldrovande, 57. — L'étourneau noir et blanc, 58. — L'étourneau gris-cendré, 59. — Oiseaux étrangers qui ont rapport à l'étourneau, 60. — Celui du Cap de Bonne-Espérance, ou l'étourneau-pie, *idem*. — L'étourneau de la Louisiane, ou le stourne, 63. — Le fer-à-cheval, 68. — Le tolcana, espèce d'étourneau, 71. — Son bec, 72, 73 (note.) — Le cacastol, 75. — Le pimalot, 77. — L'étourneau des terres Magellaniques, ou le blanche-raie, 78. — Le hablizt, 80. — L'étourneau de la Daourie, par Sonnini, 82. — Ses habitudes, 83. — L'étourneau olivâtre, découvert par Osbeck, par le même, 85. — L'étourneau verd, par le même, 86. — L'étourneau à plumes soyeuses, par le même, 88. — L'étourneau éclatant, par le même, 90. — Le choucadon, par le même, 92. — Le Geoffroy, par le même; en quoi il diffère de la pie-grièche, 95. — Couleurs de son plumage, décrites par le Vaillant, 96. — L'athis, par Sonnini, 98. — Le loyca, par le même, 100. — Le eureau, par le même, 103. — Ses habitudes, 104. — Le barite, oiseau des Antilles, par le même; caractère singulier qui le distingue, 106. — La cravate frisée, 108. — D'où lui vient ce nom, 109. — Les troupiales ont beaucoup de rapports avec les étourneaux d'Europe, 111. — L'étourneau des colombiers, espèce de merle, XLVI, 111.

ÊTRES ORGANISÉS. Génération spontanée des êtres organisés, XVI, 80. — Êtres organisées, grands et petits, XVII, 35. — Il y a des êtres organisés qui ne sont pas compris dans la division de la nature en animaux, végétaux et minéraux, 371. — Êtres intermédiaires. Genre 1, les œufs, 372. — Genre 2, les corps organisés trouvés dans la semence, 375. — Considérations générales sur les êtres. *Histoire des Plantes*, I, 5. — Leur division, 8. — Vues générales sur leur reproduction, et organes nécessaires à cette reproduction, II, 5. — Temps de cette reproduction, 10. — Pour contraindre les êtres doués de la vie et du sentiment à se reproduire par les sexes, la nature

n'a pas employé d'autre force que l'attrait du plaisir. 80. — Voyez ANIMAUX, VÉGÉTAUX, etc. — Durée des êtres organisés, *Hist. des Poissons*, I, 363.

ETUI TUBULAIRE. Ce que c'est, et où il est placé dans la plante. *Hist. des Plantes*, I, 186, 378.

ETUIS. Voy. ELYTRES.

EUCÈRES (les). Insectes du genre des apiaires. Ex. *Eucera antennata*. *Hist. des Insectes*, III, 376. — Genre 413 des insectes de la famille des apiaires; leurs antennes, XIII, 373. — Leur description, 374. — Trois espèces, XIV, 43.

EUCHARIS (les). Genre 346 d'insectes, de la famille des diplolépaires. *Hist. des Insectes*, XIII, 205, 210.

EUCLASE (l'). Espèce de pierre, XVI, 285.

EUFRAISES (les). Genre 7 des plantes rhinocantacées. *Hist. des Plantes*, XV, 48. — Sept espèces de France. Pourquoi il y en a une qu'on appelle casse-lunette, 49. — Douze espèces connues, 51.

EUGLOSSÉ. Insecte du genre des apiaires. Ex. *Apis cordata*. *Histoire des Insectes*, III, 385. — Genre 421 d'insectes, de la famille des apiaires, XIII, 391. — Deux espèces, XIV, 62.

EUMÈNE. Insecte du genre des guépières. Ex. *Vespa cyanipennis*. *Hist. des Insectes*, III, 360. — Genre 339 d'insectes de la famille des guépières, XIII, 326, 344. — Deux espèces, 345.

EUMOLPE. Insecte du genre des chrysomèles proprement dites. Ex. *Eumolpus vitis pretiosus*. *Hist. des Insectes*, III, 226. — Insecte du genre des chrysomélines, très-funeste aux vignobles, XI, 331. — Genre 229 d'insectes; six espèces, 373.

EUMORPHES. Genre 246 d'insectes, de la famille des tridigités. *Hist. des Insectes*, III, 237. — Leur description, XII, 75.

EUNUQUES. Nègres et autres, XVIII, 340. — Sur leur voix, 341. Voy. CASTRATION.

EUPATOIRES (les). Genre 73 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 207. — L'eupatoire à feuilles sessiles, et celle à feuilles de fenouil, 209. — L'eupa-

toire d'Avicenne et celui pourpré, 210. — L'eupatoire aya-pana, 211. — 71 espèces connues, 220. — Eupatoire de mesué, XIII, 152. — Eupatoire femelle, 180.

EUPARÈ (l'). Genre 11 des plantes dites lysimachies, *Hist. des Plantes*, XIV, 370.

EUPHORBES (les), *euphorbiæ*. 4^e ordre, famille 29 des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 224. — Famille 29 de la 4^e classe des plantes, IX, 299. — Leurs fleurs, 300. — Leur fruit, 301. — Leurs suc, 302. — § 1. Plusieurs styles, mais en nombre déterminé, souvent trois. — Genre 1, les mercuriales, 303. *Voy. ce mot.* — Genre 2, les euphorbes proprement dits, 309. — Leurs fleurs, 310. — Leur nature, 311. — Espèces remarquables, l'euphorbe des anciens, 312. — L'euphorbe officinal ou des boutiques, 313. — L'euphorbe effilé, 314. — L'euphorbe tithymaloïde ou à feuilles de myrte, 315. — L'euphorbe velu et l'euphorbe cendré, 316. — L'euphorbe à longs pédoncules, et celui portulacoïde, 317. — L'euphorbe des vignes et celui épurge ou catapuce ordinaire, 318. — Ses qualités, 319. — L'euphorbe réveil matin ou tithymale des vignes, 320. — L'euphorbe génistoïde, 321. — L'euphorbe cyparisse, ou la petite eusule, 322. — 28 espèces de France, 323. — 123 espèces connues, 331. — Genre 3, les argithamnes, 345. — 2 espèces connues, 346. — Genre 4, les ciccas, 347. — Genre 5, les phyllanthes, 348. — Genre 6, les xylophylls, 357. — 7 espèces connues, 358. — Genre 7, la kirganellie, 359. — Genre 8, les kigellaires, 360. — Genre 9, les clutelles, 361. — Genre 10, les andrachnées, 363. — Genre 11, les aginéis, 366. — Genre 12, les buis, 367. — Genre 13, le sécurinèga, 371. — Genre 14, les adellies, 372. — Genre 15, la mallotte, 373. — Genre 16, les mabiers, 374. — Genre 17, les ricins, 376. — Genre 18, les médicinaires, 383. — Genre 19, le dryandra à feuilles en cœur, 402. — Genre 20, l'alevrite, 404. — Genre 21, les tridesmes, 406. — Genre 22, le phyllaurea panaché, 408. — Genre 23, le triphaca d'Afrique, X, 5. — Genre 24, les crotons, 6. — Genre

25, les ricinelles, 22. — Genre 26, le caturé à épi ; par Linnæus, 28. — Genre 27, l'agalloche, 30. — § 2. Un seul style. — Genre 28, les tragies, 33. — Genre 29, les stillingies, 35. — Genre 30, les glutiers, 37. — Genre 31, le loureires, 42. — Genre 32, le mancenilier, 43. — Genre 33, le mapronier de la Guiane, 47. — Genre 34, le sechium, 48. — Genre 35, le sablier, 49. — Genre 36, les omphaliens, 52. — Genre 37, la plucknetie, 55. — Genre 38, les dalechampes, 57. — Genre 32 bis, le vernicier, 427.

EUPHORIA. Genre 7 des plantes dites savonnières. *Hist. des Plantes*, XVIII, 304.

EUPHRAISES (les). Voyez EUFRAISES.

EUROPE (l'). Quelles sont ses plus hautes montagnes, II, 5. — Description de tous les peuples qui l'habitent et de ceux de l'Asie, XX, depuis la page 64 jusqu'à la page 238.

EURYHANDRA. Genre 1 des plantes magnoliers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 364.

EURYCHORE. Insecte du genre des pimeliaires; ex. *Eurychora ciliata*. *Histoire des Insectes*, III, 169. — Genre 129 des insectes; 7^e espèce de la 18^e famille, les pimeliaires, X, 269.

EUSTÉPHIE (l') écarlate. Genre 3 de la famille des narcisses, établi par Cavanilles. *Hist. des Plantes*, IX, 13. — Une espèce connue, 14.

EVANIALES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 328; V, 300. — Famille 61 des insectes; en quoi ils diffèrent des ichneumonides, XIII, 191. — Leur description, 192. — Genre 341, les scœnes, 194. — Genre 342, les pélecines, 195.

EVANIES (les). *Hist. des Insectes*, III, 330. — Genre 340 des insectes, 2 espèces, XIII, 193.

EVE. (Tableau de sa création), XX, 58.

EVENTS. On a donné ce nom à deux canaux qui partent du fond de la bouche de la baleine; leur usage. *Hist. des Cétacées*, 50.

EVANGEL (l'). Petit oiseau décrit par Lepage-Du-

pratz, et qui est le même que l'organise. 3^e petite espèce des tangaras, XLVIII, 348.

EVIDENCE. Vérités évidentes dans la morale, dans la physique, XXI, 100, 101.

EVOLVULUS. Genre 6 des plantes dites liserons. *Hist. des Plantes*, XVI, 116.

EVONYMUS. Voyez FUSAIN.

EXACUM. Genre 6 des plantes dites gentianes. *Hist. des Plantes*, XVI, 155.

EXCRÉMENS. Pourquoi les végétaux n'ont point d'excrémens solides. *Hist. des Plantes*, I, 20.

EXCROISSANCE, en forme de peau, sur le pubis des femmes égyptiennes et hosténtotes, XX, 281.

EXISTENCE. Les animaux ont la conscience de leur existence actuelle ; mais il n'ont pas celle de leur existence passée, XXI, 296. — Sensation de cette existence chez l'homme, 297.

EXOCETS (les). Genre 199 des poissons. 1^{re} espèce, celui volant. *Hist. des Poissons*, XII, 402, 404. — Celui métorien, 402, 410. — Le sauteur, *idem*. — Le commersonnien, 403, 411.

EXOCHNATES. Classe 10^e des insectes malacostracés. Plusieurs mâchoires couvertes de palpes, hors de la lèvre. *Hist. des Insectes*, V, 157.

EXPANSION (force d'), IV, 194.

EXPÉRIENCES sur les progrès de la chaleur dans les différens corps, IV, 377. — Suite des mêmes expériences dans les différentes substances minérales, V, 3. — Conclusions à tirer de ces expériences, 12. — Table générale des rapports relatifs à ces expériences, 14. — Imperfection de cette table, 150. — Différentes expériences sur la platine. Voy. PLATINE. — Expériences sur la tenacité et sur la décomposition du fer, 222. — Expériences sur les effets de la chaleur obscure, ou celle privée de lumière et de feu, 261. — Expériences sur la lumière et sur la chaleur qu'elle peut produire, 301. — Expériences pour améliorer les canons de la marine, VI, 139. — Expériences de Buffon sur la génération, XVII, 231. — Expé-

rience sur la vésicule séminale d'un homme péri de mort violente, et dont le cadavre étoit encore chaud, 242, 250. — Expériences sur la semence des chiens, 256, 258, 260, 276. — Sur celle des lapins, 263. — Sur celle du béliet, 270. — Sur celle des chiennes, 276. — Sur celle de vache, 286. — Sur celle de lapine, 299. — Expériences sur l'eau des huîtres, 315. — Sur de l'eau où l'on avoit fait bouillir du poivre, 317. — Sur de l'eau où l'on avoit mis infuser de la graine d'oeillet, 319. — Sur les laites des différens poissons, 318. — Comparaison du résultat de ces expériences avec celles de Leeuwenhoëk, 329. — Remarques à ce sujet, 354. — Réflexions sur les expériences précédentes, 361. — L'expérience est un moyen de juger les effets de la nature, XXI, 106.

EXQUIMA (l'). Espèce de singe hurleur, de la famille des sapajous, et de l'espèce très-voisine du coaita, XXXVI, 138. — Ce qu'en dit Marcgrave, 139. — Ce qu'en dit Dampier, 140. — Description de l'exquima, 148.

EXSCUTELLÉS (les). Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 101.

EXTRÉMITÉS DU SQUELETTE. 1^o, les bras. 2^o, les cuisses. Os qui les composent, XXI, 74, 81.

EYLAIS. Insecte du genre des acaridies; ex. *Hydrachne extendens*. *Hist. des Insectes*, III, 63.

F.

FABA. Voyez FÈVE.

FABLES. Elles sont de tous les siècles chez les hommes, LX, 8 (note 1), par Sonnini.

FABRONIENNE (la raie). 27^e espèce. Voyez le mot RAIE.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE. Lettre des députés et syndic de cette faculté, à M. de Buffon, en lui envoyant les articles qu'elle trouvoit répréhensibles dans son ouvrage, XXI, 387. — Exposé de ces articles, 389. — Réponse de M. de Buffon, et explication de chacun

des articles, 394. — Seconde lettre de la Faculté, 399.

FAGARA. genre 28 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 200. — 4 espèces, *idem*.

FAGROEA. genre 28 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 196.

FAGONIA. genre 2 des plantes rutacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 97. — 3 espèces, *idem*.

FAILLE ou VOILE. Ce que les houilleurs du pays de Liège entendent par ces mots, IX, 40. — Leur état dans les mines de charbon de terre, 75.

FAIM. Peuples qui mangent de la terre pure, lorsqu'ils sont pressés par la faim. *Hist. des Reptiles*, II, 356.

FAINES (les). C'est ainsi que l'on appelle le fruit du hêtre. *Hist. des Plantes*, X, 352. — A quoi les faïnes servent, 354. — Leur récolte, 355. — Ce que c'est que la tourte ou tourteau, 357.

FAISAN (le). Si le dindon avec le faisan peut produire un mulot, XLI, 265. — En quoi le tétras ou grand coq de bruyère diffère du faisan, 317. — Origine du faisan, XLII, 155. — En quels lieux se trouvent les plus beaux, 156. — Comment les Turcs de Salonique chassent les faisans sauvages, 160. — Faisans de France, 162. — Lieux où on en trouve, 163 et suiv. — Description du faisan, 166. — Son plumage, 168. — Il se plaît dans les lieux marécageux; manière de l'appivoiser, 171. — Son naturel, 175. — Nid et ponte de la faisanne, 174. — Durée de l'incubation, 179. — Education des jeunes faisans, 176. — Leur nourriture, 177, 180. — Manière de faire cocher les poules par le faisan, 185. — Il se laisse prendre à tous les pièges, 187, 188 (note). — Durée de sa vie, 189. — Le faisan blanc, à quelle cause on doit rapporter sa blancheur, 190. — Le faisan varié, 192. — Le coquar ou le faisan bâtard, 193. — Le faisan à collier, très-commun à la Chine, par Sonnini, 197. — Sa description, 198. — Cette race, depuis long-tems multipliée en Angleterre, étoit à peine connue en France en 1779, 199. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au faisan, 200. — Le faisan doré ou le tricolor huppé

de la Chine, 203. — D'où lui vient son nom, 205. — Changement de la couleur chez la femelle, 206. — Le faisan noir et blanc de la Chine, 211. — Conjectures sur son origine, 213. — Sa description, 214. — L'argus ou le luen, 217. — Addition à cet article par Sonnini, 218. — Le napaul ou faisan cornu, 221. — Le katraca, 225. — Le chinquis, 227. — Le spicifère, 230. — L'éperonnier, 234. — Le faisan superbe, par Sonnini, 242. — On ne l'a encore vu qu'en peinture, 243. — Le momoul, 244. — Le faisan noir, 246. — Celui couleur de feu, 247. — Sa description, 248. — Le faisan d'Afrique, par Sonnini, ainsi que les quatre précédens, 250. — Les hoccas, 252. *Voyez* ce mot. — L'hoazin ou faisan huppé de Cayenne, 290. — Le sasa, par Sonnini, 294. — Lyacou, 300. — Addition à cet article, par Sonnini, 304. — Le marail, 307. — Addition à son article, par Sonnini, 310. — Le caracara, 315. — Le chacamel, 318. — Le parraka et l'hoitlallotl, 320. — Addition à cet article, par Sonnini, 323.

FALAISES (les). Effets que produisent sur elles les vagues de la mer dans une tempête. *Hist. des Mollusques*, IV, 180 (note).

FARAGO, *zygophyllum*. 3^e genre des plantes rutacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 98.

FALCKS (les), ou faucons de nuit, par Sonnini. Oiseaux de proie, XXXIX, 204.

FALKIA. Genre 28 des plantes dites bourraches. *Hist. des Plantes*, XVI, 108.

FALUN. Nom qu'on donne à une matière coquille qu'on trouve en Touraine, I, 380.

FAMILLES DES PLANTES. Distribution de celles naturelles d'Ant. L. de Jussieu, suivant la méthode de Lamarck. *Hist. des Plantes*, IV, 9. 1^{re} classe, les acotylédones, famille première, les champignons, 17. — 2, les algues, 24. — 3, les hépatiques, 41. — deuxième classe, les monocotylédones-cryptogames; famille 4, les mousses, 45. — 5, les lycopodes, 48. — 6, les fougères, 61. — 7, les pilulaires, 71. — 8, les prêles, 73. — 3^e classe, les monocotylédones, proprement dites; famille 9, les massettes, 75. — 10,

les souchets, 76. — 11, les graminées, 80. — 12, les palmi-fougères, 109. — 13, les gouets, 111. — 14, les palmiers, 119. — 15 les aspergés, 127. — 16, les joncs, 136. — 17, les commelines, 139. — 18, les bétraves, 142. — 19, les merendères, 146. — 20, les lis, 152. — 21, les asphodèles, 156. — 22, les narcisses, 165. — 23, les iris, 176. — 24, les bananiers, 183. — 25, les orchis, 186. — 26, les balisiers, 202. — 4^e classe; les plantes dicotylédones; famille 27, les conifères, 208. — 28, les amentacées, 215. — 29, les euphorbes, 224. — 30, les orties, 240. — 31, les arroches, 257. — 32, les oseilles, 266. — 33, les lauriers, 269. — 34, les thymélées, 274. — 35, les protéés, 278. — 36, les chalefs, 280. — 37, les amarantes, 286. — 38, les belles de nuit, 291. — 39, les aristoloches, 294. — 40, les composées, 296. — 41, les valérianes, 367. — 42, les garances, 371. — 43, les chèvrefeuilles, 405. — 44, les campanules, 411. — 45, les courges, 418. — 46, les plantains. V^e vol. p. 5. — 47, les staticées, 7. — 48, les prime-veres, 49. — Les pédiculaires, 20. — 50, les acanthes, 27. — 51, les jasminées, 31. — 52, les verveines, 36. — 53, les labiées, 46. — 54, les personnées, 64. — 55, les morelles, 81. — 56, les bourraches, 90. — 57, les liserons, 101. — 58, les polémoines, 108. — 59, les bignones, 111. — 60, les gentianes, 118. 61, les apocins, 124. — 62, les sapotiliers, 139. — 63, les plaque-noiers, 146. — 64, les rosages, 152. — 65, les bruyères, 156. — 66, les aralies, 165. — 67, les ombellifères, 167. — 68, les saxifrages, 188. — 69, les joubarbes, 193. — 70, les pourpiers, 196. — 71, les ficoïdes, 203. — 72, les cactiers, 207. — 73, les mélastomes, 209. — 74, les salicaires, 215. — 75, les épilobes, 222. — 76, les myrtes, 233. — 77, les rosacées, 243. — 78, les térébintes, 263. — 79, les nerpruns, 279. — 80, les légumineuses, 295. — 81, les vinettiers, 340. — 82, les pavots, 345. — 83, les crucifères, 350. — 84, les câpriens, 362. — 85, les rues, 369. — 86, les caryophyllées, 376. — 87, les cistes, 391. — 88, les tilleuls, 394. — 89, les mauves, 403. — 90, les géranium, 423. — 91, les vignes, 428. — 92, les azéda-

racha. VI^e vol., p. 5: 93, les orangers, 14. — 94, les guttiers, 22. — 95, les millepertuis, 30. — 96, les malpighies, 32. — 97, les érables, 35. — 98, les savonniers, 39. — 99, les ménispermées, 48. — 100, les renoncules, 52. — 101, les anones, 62. — 102, les magnoliers, 64. — Plantes qui ne peuvent trouver place dans aucune des familles précédentes, ou plantes *incertæ sedis*, 72.

FAMINE Elle produit la stérilité; XIX, 325.

FANATISME. Ses dangers. *Hist. des Mollusques*, I, 99.

FANONS (les). On appelle ainsi des lames qui recouvrent toute la voûte du palais des baleines, et qui leur servent de dents; leur description. *Hist. des Cétacées*, 55. — Comment ils sont placés, 56. — Comment ils se développent, 58. — Comment, après la mort de la baleine, on les prépare pour le commerce et pour les arts, 60.

FAON (le). Pendant combien de tems il porte ce nom, et son éducation, XXIV, 86.

FARAMIERS (les). Genre q des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 125. — Deux espèces connues, *idem*.

FARASSE (le). XXVII, 23. C'est l'hyène de Madagascar.

FARD. Espèce d'iris avec laquelle, dans les villes de l'Archipel, les femmes préparent une fécule qui leur tient lieu de fard; manière dont on l'obtient. *Hist. des Plantes*, IX, 95.

FARÈNE (le). Espèce du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 92. — Sa description, 206.

FARLOUSE (la), ou l'alouette des prés, L, 304. — Sa description, 305. — Son chant et ses habitudes, 307. — Lieux où cet oiseau se rencontre, 310. — Son plumage, 311. — Ses variétés; celle blanche, 315. — La farlouse pieds noirs, 314. — Oiseau étranger qui a rapport à la farlouse, la farlousane, 315.

FASCI (le). 46^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Histoire des Poissons*, IX, 391; et X,

103. — On appelle du même nom la 19^e espèce du genre des poissons appelés centropomes, X, 266 et 298. — 4^e espèce du genre des poissons appelés achires, XI, 349 et 353. — 2^e espèce du genre des poissons appelés cheilodactyles, 360 et 361. — 1^{re} espèce du genre des poissons appelés synodes, XII, 314, 317.

FASCIÉS. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 523.

FASCIOLAIRE (le). genre 97 des gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 76. — Trois espèces, 77.

FAUCHETS (les). Espèce d'hirondelle de mer, LXIV, 118.

FAUCHEUR (le). Nom d'un poisson trachinote. genre 73 des osseux. *Hist. des Poissons*, VIII, 21. — Sa description, 22. — 5^e espèce du genre des poissons appelés chétodons, XI, 104, 128.

FAUCHEURS (les) Insectes. Leur manière de s'accoupler. *Hist. des Insectes*, II, 234. — Insecte du genre des phalangiens. Ex. *Phalangium opilio*, III, 61. — genre 8 des insectes dits phalangiens; leur description, VII, 314. — Leurs parties sexuelles, 316. — Leurs habitudes, 317. — Phénomène particulier à leurs pattes, 318. — Leur accouplement, 319. — Leurs ennemis, 320. — Leurs espèces: 1^o, celui des murailles, 321. — 2^o, celui à quatre dents. — 3^o, celui des mousses. — 4^o, celui à crête, 322. — 5^o, celui porc-épic. — 6^o, celui maculé, 323. — 7^o, celui mantelé, 324. — 8^o, celui annelé. — 9^o, celui rond, 325. — 10, celui d'Helwig. — 11^o, celui hispide. — 12^o, celui uni-épineux, 326.

FAUCILLE (le). 47^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 391; et X, 104. — 6^e espèce du genre des poissons appelée pomacentres, XI, 177, 184. — 4^e espèce du genre des poissons appelés osmères, XII, 208, 217. — 66^e espèce du genre des poissons appelés cyprins, XIII, 94. — Sa description, 213.

FAUCON (le). Vitesse de son vol, XXXVII, 85. — Ses variétés, XXXIX, 98. — Comment on le dresse à la chasse, 99 (note). — Ses habitudes, 102. — Son cou.
• Tab. TOMBI. A a

rage, 103. — Sa description suivant ses différens âges, 105. — Lieux où on trouve cet oiseau, 106. — Description du faucon de France, 107. — Autre espèce décrite par Frisch, 109. — Description du faucon blanc de Russie, 110. — Description d'autres espèces, 112. — Sept espèces décrites par J. de Franchieres, 115 (note). — Il n'y a que deux espèces réelles en Europe, 116. — Examen et réduction des différentes espèces dont parle Brisson, 98, 117. — Différences dans leur nature et leur éducation, 123. — Caractères d'un bon faucon, par M. Leroi, 125. — Notice de M. Forget sur les faucons, 127. — Durée de leur vie, *idem* (note). — Le faucon d'Islande; sa description par Anderson, 131 (note). — Le faucon noir, décrit par M. Edwards, 133. — Le faucon rouge des Indes orientales, décrit par Aldrovande, 136. — Le faucon huppé des Indes, décrit par Willughby, 139. — Preuve que le genre des faucons est l'un des plus universellement répandus, 140. — Art des Persans dans l'éducation des oiseaux de chasse, 141 (note). — Le tanas, espèce de faucon, 146. — Le faucon à culotte noire, 149. — Sa description, par le Vaillant, 150. — Le faucon chanteur, décrit par Sonnini, 152. — Élégance de ses formes et beauté de son plumage, 155. — Le chicquera, 157. — Sa description, par le Vaillant, 158. — Le faucon à taches rhomboïdales des bords du Gange, 159. — Le faucon de Ceylan, 161. — Le behrée, 162. — Le faucon de l'île de Java, décrit par Van-Ernest, 164. — Le faucon de l'île de Sainte-Jeanne, décrit par Latham, 167. — Les faucons d'Amérique, 169. — Ceux à retrancher de cette liste, 170. — Le faucon de New-York, 172. — Le faucon à croupion blanc, décrit par Bosc, 174. — Le faucon de la Caroline, décrit par Pennant, 178. — Le faucon léverien, par le même, 179. — Le faucon à cou noir de la Guiane, 181. — Le faucon à cou blanc de la Guiane, 182. — Le faucon à tête rousse de la Guiane, 185. — Le faucon noir rayé de la Guiane, 187. — Le faucon à double échancrure au bec, de la Guiane, 189. — Le faucon bleuâtre à queue noire, de la Guiane, 191. — Le faucon à sourcils, de la Guiane, 192. — Le faucon souffleur, de la Guiane

hollandaise, 194. — Le faucon rieur, 197. — Le faucon de la Nouvelle-Zélande, 199. — Le koler, 201. — Le falck, 204. — Tous les faucons, depuis la page 149, sont ajoutés par Sonnini Notes et observations sur la ponte des faucons de Linnæus, LX, 335.

FAUCONNERIE. Caractères qui distinguent tous les oiseaux propres à être élevés pour la fauconnerie, ou de chasse noble, XXXIX, 81.

FAUJAS (lophie). Poisson de mer, *Hist. des Poissons*, IV, 182. Voyez LOPHIE.

FAUSSE-COUCHE. Voy. AVORTEMENT.

FAUSSES-ORANGES. *Hist. des Plantes*, XIV, 282.

FAUVETTE (la). Hôte des bois; sa description et ses graces naturelles, LI, 77, 83. — Description de la première espèce, ou la fauvette proprement dite, 78. — Ses jeux, ses caresses et ses amours, 79. — Son nid; il n'est pas possible de lui faire adopter des œufs d'un autre oiseau que ceux du coucou, 80. — Voyages des fauvettes; leur nourriture, et la meilleure manière de les manger, 82. — Variété de la fauvette, par Sonnini, 85. — La petite fauvette à poitrine jaune, par le même, 86. — En quoi elle diffère de la fauvette ordinaire, 87. — La passerinette ou petite fauvette, 2^e espèce, 89. — La fauvette à tête noire, 3^e espèce, 92. — Sa prétendue métamorphose, 94. — La fauvette à tête brune n'est que la femelle de celle-là, 95. — Chant de la fauvette à tête noire, 96. — Soins du mâle pour sa femelle; son nid, 97. — Sa nourriture, 98. — On l'élève en cage, et son affection pour son maître, 99. — Lieux où cet oiseau se trouve, et ses variétés, 101. — Parties internes d'une fauvette à tête noire, par Sonnini, 104. — La fauvette moschite, 105. — La grisette ou fauvette grise, en Provence, passerine, 4^e espèce, 106. — La bouscarde, 109. — La petite grisette, par Sonnini, 111. — La fauvette babillarde, 5^e espèce, 113. — Ses habitudes, 115, 119 (note). — Les grecs modernes l'appellent potamida; remarque à ce sujet, 116. — Description de son plumage, 118. — Comment on l'élève en cage, 119. — La roussette, ou la fauvette des bois, 6^e espèce, 120. — Son courage, 123. — Sa description, 124. —

A 2 2

La fauvette de roseaux, 7^e espèce, 126. — Son nid, 127. — Ses habitudes et sa description, 128, 129. — Elle n'est ni la pétionella de Schwenckfeld, ni l'oiseau de sauge (sedge bird) d'Albin, 130. — La fauvette aquatique, par Sonnini, 132. — La petite fauvette rousse, 8^e espèce, 134. — Elle n'est point le troglodite indiqué par Aëtius, 135. — Nid et œufs de cette fauvette, 136. — Sa description, 137. — La fauvette tachetée, 9^e espèce, 139. — Lieux qu'elle habite, 140. — Le traine-buisson, ou mouchet, ou la fauvette d'hiver, 10^e espèce, 142. — Son plumage, 145. — Chant et habitudes de la fauvette d'hiver, 146. — Lieux où elle se trouve, 147. — On peut l'appriivoiser, 148 (note). — La fauvette des Alpes; sa description, 150. — Ses habitudes, 152. — Observations de Picot la Peyrouse sur cette fauvette, 153 (note). — Le pitchou, espèce de fauvette de Provence, 155. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux fauvettes; celle tachetée du Cap de Bonne-Espérance, 158. — La petite tachetée du même endroit, 160. — La fauvette tachetée de la Louisiane, 161. — Celle à poitrine jaune du même endroit, 163. — La fauvette verdâtre, 164. — La fauvette de Cayenne, à queue rousse, 165. — La fauvette de Cayenne, à gorge brune et ventre jaune, 166. — La fauvette bleuâtre de Saint-Domingue, 168.

FAUX-BUIS. *Hist. des Plantes*, XIII, 392.

FAUX-COUVALN. Maladie à laquelle sont sujettes les abeilles. *Histoire des Insectes*, XIV, 35.

FAVORITE (la). 5^e espèce de poule sultane; LIX, 256.

FÉCONDATION des fleurs. *Hist. des Plantes*, II, 51. — L'analogie entre les animaux et les plantes n'est nulle part plus frappante que dans la fécondation, 52. — Mouvements très-marqués dans les étamines et dans le pistil, 54. — Ce qui arrive lorsque les sexes sont séparés sur un même individu, et lorsqu'une espèce est dioïque, 55. — Ce qui arrive aux plantes aquatiques, et phénomène singulier que présente la valisneria, 56. — Suite de la fécondation et expériences qui ont servi à démontrer ce phénomène, 58. — Ce qu'a écrit à ce sujet Camerarius, 59. — Fécondation des plantes

dioïques, 60. — Fécondation des plantes monoïques, 61. — Triomphe de la fécondation des pistils par les étamines, découverte perfectionnée par Linnæus, 63. — Expériences contraires de Spallanzani, 64. — Des organes nécessaires à la reproduction des espèces. § 1, de la fleur et du réceptacle, 153. — § 2, du périanthe simple et double qui comprend le calice et la corolle, et du disque, 154. — Des pétales, 167. — § 3, des étamines, 168. — De l'anthère, 175. — Le pollen, 179. — § 4, le pistil, 180. — L'ovaire, 181. — § 5, des bractées, des involucre, des spathe, des glumes et des bales, considérés comme accessoires des fleurs, 190. — § 6, des pedoncules, 194. — § 7, disposition des fleurs sur la plante, 196. — § 8, des fruits et des pericarpes, 204.

FÉCONDITÉ. Elle dépend de l'abondance des substances, XIX, 325. — Fécondité des femmes suédoises, XX, 235. — Sur la fécondité, XXII, 427. — Sur l'infécondité des femmes trop ardentes, 429. — Table des rapports de la fécondité des animaux quadrupèdes, 432. — Fécondité des cochons, XXIII, 157. — Fécondité des lapins, XXIV, 228.

FÉCULES (les). Celles blanches tirées des végétaux. *Hist. des Plantes*, I, 113. — Celles colorantes, 114.

FÉDIES (les). genre 6 des plantes dites valerianées. *Hist. des Plantes*, XIII, 500. — Espèce remarquable; la fédie doucette, ou la mâche, huit espèces de France, 302. — 14 espèces connues, 304.

FELD-SPATH. Ce que c'est, VII, 443. — Ce que dit M. Pallas sur ce minéral, 445. — Ses différences avec les autres spaths, 448. — Sa formation, 449. — Il entre dans la composition de la porcelaine, 452. — Stalactites cristallisées de feld-spath, XII, 389. — Feld-spath de Russie, 395. — Table des produits du feld-spath, XIV, 249. — Du feld-spath, XVI, 255. — Ses différentes espèces, 256.

FÉMELLES. Elles contribuent, en général, plus que les mâles, au maintien des espèces, XXX, 211.

FEMMES. Leur force et leur état chez les différents peuples, XVIII, 436. — Création de la première femme, XX, 58. — Les femmes des peuples du Nord, 64 et suiv. — Femmes chinoises, 133, 134. — Femmes

Persanes, 192. — Femmes et filles arabes, 199. — Leur coiffure, 204. — Femmes égyptiennes, 212. — Femmes de Circassie, 222. — Femmes mingreliennes, 225. — Femmes turques, 229. — Fécondité des femmes suédoises, 235. — Femmes jalouses, 260. — Femmes nègres, 261. — Femmes hottentotes ; excroissance de peau sur leur pubis, 281. — Femmes de la Floride, 329. — Femmes sauvages, 333. — Femme velue, 370. — Femmes patagones ou géantes, 392. — Chez les nègres de Trésie, dans l'intérieur de l'Afrique, les femmes n'ont pas le droit de manger un œuf de poule, XLI, 175 (note).

FENNEC (le). Nom qui appartient à l'animal nommé par Buffon l'anonyme, XXVII, 205. — Détails à ce sujet, par Sonnini, 206.

FENOUIL. genre 9 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 265. — Ses propriétés, 266.

FENOUIL DE PORC, ou queue de pourceau. genre 23 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 296. — Deux espèces, et leurs propriétés, *idem*.

FENTES PERPENDICULAIRES. Sur celles qu'on remarque dans les rochers, les carrières, etc., I, 136. — Leur cause et leur origine, 138. — Variétés de leur ouverture, 139. — Elles se rencontrent dans toutes les couches de terre, III, 33. — Détails sur ces fentes, 51. Les fentes et les cavités des éminences du globe terrestre ont été incrustées et quelquefois remplies par les substances métalliques d'aujourd'hui, IV, 77.

FERU GREC, *trigonella*. genre 47 des plantes dites légumineuses. *Histoire des Plantes*, XVII, 314. — Sept espèces, 315. — Leurs propriétés, 316.

FER (montagnes de), III, 262 ; IV, 83. — Expériences de comparaison sur les progrès de la chaleur dans le fer et dans l'étain, V, 13. — Autres expériences, 17. — Ce que produisent le fer et l'or fondus ensemble, 197 (note). — Expériences sur la tenacité et la décomposition du fer, 222. — Il perd de sa masse à mesure qu'on le chauffe, 223. — Danger de trop le chauffer pour l'employer, 225. — Ce qu'on observe dans les boulets de fer soumis à l'épreuve du plus grand feu, 231. — Première loupe que l'on tire de la gueuse

dans la forge, 234. — Moyens de corriger la mauvaise qualité de la fonte, et d'adoucir à la chaufferie l'aigreur du fer, 236. — Manière de faire travailler des affineurs à leur compte, 237. — La bonne fonte est la base de tout bon fer, 239. — Mémoire de M. de Montbeillard, sur la fabrication du fer avec de vieilles ferrailles, 242. — Sur le fer sortant de la forge, 244. — Quel est le fer le plus parfait, 247. — Sur le fer de tirerie, 248. — Sur la tôle, 249. — Sur les fers de charrue, 252. — Sur le fer aigre, 253. — Sur le fer qui a le plus de nerf et de tenacité, *idem*. — Manière de souder le fer avec lui-même ou sur lui-même, 255. — Le fer se décompose par l'humidité comme par le feu, 257. — Il est le plus solide, c'est-à-dire, le moins fluide de tous les corps, VI, 39. — Expériences sur la durée de l'incandescence du fer, 69. — Abus relatif à la fonte du fer, 130. — Sur la trempe du fer, 152. — Note sur la quantité de fer qu'on tire de la terre en France, VIII, 439. — Observations sur les mines de grains de fer, 441. — Comment ils se séparent, 443. — Leur composition, 444. — Du fer dans sa première origine, 447. — Minières de fer en grains, 449. Du fer, X, 224. — Le fer a commencé le premier à s'établir sur le globe, 232. — Sa substance n'a jamais été pure, 234, 253. — Les couches de fer sont toutes attirables à l'aimant, 235, 256. — Les mines de fer en grains ne le sont pas, 236 (note). — Elles ont été produites par le feu primitif, 241. — Expériences avec le feu sur le fer, 243, 255. — Consolidation des roches ferrugineuses, 248. — Réduction de toutes les mines de fer de seconde formation, 250. — Sur les grains de la mine de fer, 251, 262, 267. — Sur le fer qu'on tire de la montagne d'Eisenartz en Styrie, 254. — D'où provient toute la quantité du fer disséminé sur le globe, 258. — Etat sous lequel il se présente, 261. — Du fer en stalactites, 265. — Sur l'hématite, mine de fer cristallisée, 269. — Elle ne doit pas être confondue avec les mines du fer primordial, 272. — Le fer est un des dons de la nature, 274. — Travaux sur les mines de fer, 275. — Observations sur le gissement et la qualité des mines de fer primordiales ou roches. Observations de M. Jars à ce sujet. 277. — Sur les mines de Danemora, à une lieue d'Up-

sal, 279. — Énumération des mines qu'on met en œuvre chez tous les peuples policés : 10 en France, 284. *Voy.* MINES DE FER. — Preuve des obstacles qui s'opposent à ce que l'on fasse du fer de la meilleure qualité, 314. — D'où vient la bonne qualité du fer, 329. — Travail du fer dans les forges, 330. — Conduite du fourneau, 334. — Sur les espèces de fontes, 338 et 346. — Mélange d'autres métaux ou demi-métaux avec le fer, 345. — Résultats des expériences faites à la fonderie de Ruelle en Angoumois, 348 (note). — Cristallisation de la fonte de fer, 359. — Le fer est, de tous les métaux, celui dont l'état varie le plus, 360. — Conversion de la fonte en fer et en acier, 362. — Opérations qu'exigent ces travaux, 366. — Le fer, une fois forgé, devient d'autant plus difficile à refondre, qu'il est plus pur et en plus gros volume, 370. — Manière de préparer le fer pour des usages communs, 378. — Pour le fil de fer, 381. — Pour le fer blanc, 382. — Ses manufactures en France, *idem*. — Conversion du fer en acier, 384. *Voyez* ACIER. — On peut, par la cémentation, juger de la bonne ou de la mauvaise qualité du fer, 403. — Principales propriétés du fer, 422. — Sa tenacité, 424. — Effets de l'air sur lui, 425. — Effets des acides sur lui, 427. — Affinité du cuivre avec le fer, XI, 243. — Sur la brûlure du fer, XII, 168. — Concrétions du fer, rouille de fer, et l'ocre, XIV, 106. — Cristaux de fer, 136 (note). — Si le fer seul peut se convertir en platine, 183. — Divers procédés pour produire et compléter l'aimantation du fer, XV, 5. — Ce qu'il faut pour rendre le fer un véritable aimant, 9 (note). — Phénomènes qui confirment la facilité avec laquelle le fer reçoit la vertu magnétique, 17. — Ce qui arrive au fer exposé à un froid très-âpre, 20. — Du fer et de ses différentes espèces, XVI, 160. — FER À CHEVAL (le), ou merle à collier d'Amérique, XLV, 68. — Il est voyageur, 70. — FER À CHEVAL. Genre 75 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 364. — 3 espèces, *idem*. — FER-BLANC. Manière de le faire, et ses manufactures en France, X, 382.

FERDAU (le). 17^e espèce des poissons dits caranx.
Hist. des Poissons, VIII, 16. Voyez **CARANX**.

FRÈRES (le). 8^e espèce du genre 9 des cétacées appelés dauphins. Sa description. *Histoire des Cétacées*, 430. — Son combat, en 1787, avec plusieurs de ces cétacées, 431.

FERMENTATION. Ce qu'on entend par ce mot, XVII, 428.

FERNELIES (les). genre 32 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 394 — 2 espèces connues, 395.

FERRAIRES (les). genre 3 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 79 — Espèces remarquables, le ferraire queue de paon, 80: — La ferraire ondulée, 81. — 4 espèces connues, 82.

FERRATS (les). Variété du poisson qu'on appelle lavaret, et qui est la première espèce du genre des corégones. *Hist. des Poissons*, XII, 229, 233.

FERRET (le). Oiseau des îles Rodrigue et Maurice, LXIV, 121. — C'est une espèce d'hirondelle de mer, 122.

FÉRULE. genre 27 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 293. — 4 espèces, 294. — Leurs propriétés, 295.

FESTUQUES. genre 60 des graminées. *Histoire des Plantes*, VII, 304. — Espèce remarquable, la festuque flottante, ou manne de Prusse, 306. — 14 espèces de France, 307. — 27 espèces connues, 310.

FEU. Preuve que la matière du feu n'est pas une substance différente de toute autre matière, IV, 201. — Ses propriétés, 210. — Considérations particulières sur le feu, 235. — Ses différences d'avec la chaleur et la lumière, 236. — Il n'y a pas de feu sans air, dont il est le premier aliment, 236, 240 — Opération de la nature dans l'action du feu. Voyez **COMBUSTION**. — Effets réciproques de l'air et du feu l'un sur l'autre, 244. — Examen particulier de l'action du feu, 254. — Effets des trois manières de l'administrer, 257. — Le feu considéré comme le seul instrument de la chimie, 259. — Examen de la nature du feu considéré

en lui-même, 260. — Division des matières soumises à l'action du feu, 263. — Expériences contradictoires de MM. Pott et d'Arcet, sur la fonte des matières par le feu, 265 (note). — Sur la force du feu, 270. — Propriété de la flamme de communiquer le feu, 273. — C'est par la lumière que le feu se communique, 276. — L'eau elle-même communique le feu, *idem*. Comparaison du feu de l'animal et de celui d'une chandelle, 305. — Action du feu sur les pierres, 327. — Le feu est le principe de la formation de l'alkali minéral, 336. — Expériences sur la pesanteur du feu, et sur la durée de son incandescence, VI, 35, 48, 69. — Rapport de cette pesanteur avec celle de l'air, 60. — Conclusions à tirer de ces expériences pour savoir combien le centre d'un globe, dont la surface seroit consistante, et même refroidie à un certain point, pourroit néanmoins être de tems dans l'état de liquéfaction : 1^o sur le fer, 62. — 2^o sur le verre, 67. — Comment on emploie le feu, VII, 408. — Fausses idées sur le feu central, IX, 303. — L'eau a plus influé que le feu sur les grands bouleversemens arrivés dans le globe, 306. — Sur le feu fixe, 372, 375. — Le feu est le grand alterateur, le seul minéralisateur primitif, XII, 288. — C'est de l'impulsion primitive que cet élément a tiré son origine, XIV, 298. — Ses effets. Il produit le feu de l'électricité, 299. — FEU D'ARTIFICE. C'est un moyen qu'on emploie pour arrêter les éléphants, XXVIII, 108 (note).

FEU GRIEUX. C'est ainsi qu'on appelle la vapeur qui s'enflamme dans l'exploitation des mines de charbon de terre, IX, 89.

FEUX SOUTERRAINS. Leurs effets, I, 141. — Ils contribuent beaucoup à changer la surface et l'intérieur du globe, 147. — Ils sont la cause la plus fréquente des tremblemens de terre, II, 442, 445.

FEUILLE (la), où le POLYDON-FEUILLE. Poisson. *Hist. des Poissons*, IV, 322. — Différences des polydons avec les squales ou chiens de mer, *idem*. — Description de la feuille, 324.

FEUILLES (les) des plantes. Considérations générales sur les feuilles des plantes. *Hist. des Plantes*, I,

226. — Leur développement, 227. — Multiplicité de leurs attributs, 228. — Temps où elles opèrent leur développement, 230. — Chaque espèce a besoin pour cela d'une température particulière, 232. — Des feuilles dans le bouton des plantes ligneuses, et dans les bourgeons des herbes, 234. — Quatre manières dont les feuilles sont roulées, *idem*. — Tableau du temps où les plantes prennent leurs feuilles, *idem*. — Trois manières dont les feuilles sont pliées, 235. — Organisation des feuilles des plantes dicotylédones et monocotylédones, 237. — Ce que c'est que la lame et le pétiole dans la feuille, *idem*. — Différences que présentent dans leur organisation les feuilles des plantes monocotylédones et celles des plantes dicotylédones, 240. — Dispositions des feuilles sur les plantes, *idem*. — Fonctions des feuilles, 245. — Retournerement, sommeil, irritabilité des feuilles, 248. — Expériences de Bonnet sur les feuilles, 250. — Autres causes que la chaleur ou l'humidité, du mouvement des feuilles, 251. — Observations de Linnée sur le sommeil des plantes, *idem*. — Ce qu'on doit entendre par ce sommeil, 253. — Il se manifeste de quatre manières différentes dans les plantes à feuilles simples, 253. — Il se manifeste de six manières différentes dans les feuilles composées, 255. — Comment on doit observer ce phénomène sur la nature, 256. — Quelle cause détermine le changement de position dans les feuilles, 257. — Expérience décisive à ce sujet, 258. — Autres conjectures à ce sujet, 259. — Sur l'irritabilité des feuilles, 261. — Quelles en sont les causes, 267. — Quel est son siège, 269. — Chute des feuilles, 271. — L'époque de cette chute n'est pas la même pour tous les végétaux, 273. — Comment les sucs résineux garantissent les feuilles de la rigueur de l'hiver, 274. — Tableau du temps où les plantes quittent leurs feuilles, 275. — Expériences de Musschenbroek, qui prouvent la fausseté de l'opinion que les gouttelettes répandues sur les feuilles ne sont autre chose que l'humidité de la terre attirée par la chaleur du jour, et précipitée par la fraîcheur de la nuit, 314. — § 6, des feuilles et des stipules, II, 133. — Leur arrangement dans le bou-

ton et dans le bourgeon, 134. — Leur attache immédiate, et leur disposition relativement au végétal, à la terre ou à l'eau, 135. — Leur disposition pendant leur sommeil, et incision de leur bord, 137. — Incision de leur corps, 138. — Forme du sommet, 139. — Forme générale des feuilles, 140. — Formes propres aux feuilles épaisses, 142. — Leur composition, 144. — Petiole considéré comme faisant partie des feuilles, 146. — Les stipules considérés comme appendices propres aux feuilles; leur nombre, leur situation et leur attache, 147.

FEUILLE-D'EAU. *Voy.* HYDROPHYLLUM,

FEUILLES MORTES, *bombyx querci-folia*. Espèce de papillon. *Hist. des Insectes*, III, 406.

FICOÏDES (les), 11^e ordre, famille 71 de la quatrième classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Histoire des Plantes*, V, 203; XVI, 379. — § 1. Ovaires supérieurs. — genre 1, *reaumuria*. — genre 2, *nitraria*, 380. — genre 3, *sesuvium*, 381. — genre 4, *aizoon*, *idem*. — genre 5, *glinole*, 382. — genre 6, *orygia*, 383. — § 2. Ovaires inférieurs. genre 7, *ficoïde*, *idem*. — genre 8, *tetragonia*, 387.

FIÈVRE. Singulier usage que font les Abyssins de la torpille pour guérir de la fièvre. *Hist. des Poissons*, III, 185 (note).

FIÈVRES INTERMITTENTES. Fumée des œufs de la raie *batis*, regardée par les Grecs modernes comme un très-bon remède contre ces fièvres. *Hist. des Poissons*, III, 117.

FIGITE. Insecte du genre des diplolépaïres. *Histoire des Insectes*, III, 307. — genre 345 d'insectes de la famille des diplolépaïres, XIII, 204, 209.

FEUILLET (le). C'est ainsi qu'on nomme le troisième estomac du bœuf: on l'appelle aussi *mellier* ou *psautier*, XXIII, 34, 57.

FÈVE, *faba*. genre 70 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 358.

FEVIER D'AMÉRIQUE. genre 3 des plantes dites lé-

gumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 249. — 2 espèces, 250.

FEVILLEX. Voyez les NAUDIROBES.

FIATOLE (la). 1^{re} espèce des poissons osseux appelés *stromatées*. *Hist. des Poissons*, VI, 193. — Sa description, 195.

FIATOLOÏDE (le). Espèce de poisson du genre des *chrysostromes*. *Hist. des Poissons*, XIII, 303. — Sa description, 304.

FIGARIA. genre 9 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 333.

FIGUES. Ce que c'est que leur caprification. *Histoire des Insectes*, I, 367. — Comment on doit les considérer. *Histoire des Plantes*, X, 65. — Leurs variétés se montent à plus de vingt; quelles sont les principales, 68. — Elles font un bon manger, 71.

FIGUIER. Ce que c'est que la caprification, et comment on la pratique sur cet arbre. — *Histoire des Insectes*, XIII, 205. — genre premier de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 63. — Leur description et leur fruit, 64. — Comment on doit considérer la figue, 65. — Lieux où on cultive le figuier. Espèces remarquables, 1^o le fignier commun, 66. — Sa culture et ce que c'est que la caprification, 67. — Culture du figuier, et comment on peut le multiplier par la greffe, 71. — 2^o, le figuier sycomore, 72. — 3^o, celui des pagodes, *idem*. — 4^o, culte que lui rendent les Indiens, 73. — 5^o, le figuier des Indes, 74. — Une espèce de France, et trente espèces connues, 75.

FIGUIERS (les). Oiseaux du genre des bec-figues; leurs différentes espèces, LI, 389. — Le figuier verd et jaune, 1^{re} espèce, 391. — Le cheric, deuxième espèce, LII, 5. — Le petit simon, 3^e espèce, 7. — Le figuier bleu, 4^e espèce, 10. — Le figuier du Sénégal, 5^e espèce, 12. — Énumération des figuiers de l'Amérique, leurs différences, et ceux de l'ancien continent, 15. — Le figuier tacheté, 1^{re} espèce, 17. — Le figuier à tête rouge, 2^e espèce, 19. — Le figuier à gorge blanche, 3^e espèce, 21. — Le figuier à gorge jaune, 4^e espèce, 23. — Le figuier verd et blanc, 5^e

espèce, 25. — Le figuier à gorge orangée, 6^e espèce, 27. — Le figuier à tête cendrée, 7^e espèce, 29. — Le figuier brun, 8^e espèce, 31. — Le figuier aux joues noires, 9^e espèce, 33. — Le figuier tacheté de jaune, 10^e espèce, 35. — Le figuier brun et jaune, 11^e espèce, 38. — Le figuier de sapins, 12^e espèce, 40. — Méprises sur ce figuier, *idem* et 41. — Le figuier à cravate noire, 13^e espèce, 43. — Le figuier à tête jaune, 14^e espèce, 45. — Le figuier cendré à gorge jaune, 15^e espèce, 47. — Le figuier cendré à collier, 16^e espèce, 49. — Le figuier à ceinture, 17^e espèce, 51. — Le figuier bleu d'Amérique, 18^e espèce, 53. — Le figuier varié, 19^e espèce, 55. — Le figuier à tête rousse, 20^e espèce, 57. — Le figuier à poitrine rouge, 21^e espèce, 60. — Le figuier gris-de-fer, 22^e espèce, 62. — Forme de son nid, 63. — Le figuier aux ailes dorées, 23^e espèce, 65. — Le figuier couronné d'or, 24^e espèce, 67. — Le figuier orangé, 25^e espèce, 69. — Le figuier huppé, 26^e espèce, 71. — Le figuier noir, 27^e espèce, 73. — Le figuier olive, 28^e espèce, 75. — Le figuier protonotaire, 29^e espèce, 76. — Indépendamment de ces 29 espèces de figuiers, toutes du nouveau continent, il y en a encore cinq espèces ou variétés dans la seule contrée de la Louisiane, 77. — Le figuier à demi-collier, 30^e espèce, 73. — Le figuier à gorge jaune, 31^e espèce, 80. — Le figuier brun-olive, 32^e espèce, 82. — Le figuier grasset, 33^e espèce, 84. — Le figuier cendré à gorge cendrée, 34^e espèce, 86. — Le grand figuier de la Jamaïque, 35^e espèce, 87. — Ce n'est point le rossignol d'Amérique, 88. — Le figuier de Pensylvanie, et le grand figuier de Madagascar, 89. — Le couturier ou le figuier tati, par Virey, 90. — Le figuier à longue queue de la Chine. Le Chinois l'a rendu domestique, 93. — Le figuier de rivage, 95. — Le figuier bleuâtre, 96. — Le figuier bleu à tête noire, 97. — Le figuier verd de Ceilan, 99. — Le figuier chinois, 100. — Deux figuiers à long bec, 101. — Le tschecantschiki et le figuier à gorge noire, 103. — Le figuier à ventre et queue jaunes, 105. — Le figuier des monts Sumamiens en Perse,

106. — Le figuier awatcha, 108. — Le figuier de la terre de Diemen, et le figuier de l'île de Noël, 109. — Le figuier incarnat à huppe noire, et le figuier livide, 111. — Le figuier noir de Cambaye, et le petit figuier verd-brun du Guzarat, 113. — Le figuier à longue queue du Guzurat, 115. Toutes ces espèces de figuier, depuis celui de la page 90, sont décrites par Virey.

FILAGE (le) PYGMÉE. genre 85 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 270. — Une espèce connue, 271.

FIGURES (les). Leurs grands avantages en histoire naturelle. *Hist. des Mollusques*, I, 40.

FILAMENT (le). 5^e espèce du genre des poissons appelés pomacentres. *Hist. des Poissons*, XI, 176, 183.

— Poisson du genre des megolopes, XII, 279, 280.

FILAMENTEUX (le). Nom d'un poisson de l'espèce des caranx. *Hist. des Poissons*, VII, 418.

FILARIA (les). genre 10 des plantes dites jasminées. *Hist. des Plantes*, XV, 178. — 3 espèces de France, et 3 espèces connues, 180.

FILET (les). C'est le support de l'anthère; sa forme. *Hist. des Plantes*, II, 173. — Sa base et son sommet, 174. — Ses poils et sa mobilité, 175.

FILET D'ALOUETTE. On appelle ainsi un piège dont on se sert pour prendre les alouettes; sa description, L, 279.

FILET DE LA LANGUE. Sa section, XVIII, 270.

FILETS. Description de ceux nécessaires pour attraper les insectes. *Hist. des Insectes*, I, 289.

FILETS pour pêcher; leur fabrique, leur entretien et leurs différentes espèces. *Hist. des Poissons*, II, 377. — Matières dont on les forme, *idem.* — Idée générale de diverses espèces de filets, 379. — Habitudes des pêcheurs à cet égard, 378, 379. — Les rêts sont de simples rappes, mais qui diffèrent beaucoup entr'elles, 380. — Leurs différentes espèces, 381 et suivantes. — Leur fabrication, 385. — La meilleure manière de constater la grandeur des mailles, 386. — Des différens petits instrumens qui servent à lacer ou à mailler les filets, 389. — Ces instrumens sont

des ciseaux de moyenne grandeur, des aiguilles de différentes grandeurs : manière de s'en servir, 390. — Le valet, le morceau de bois qui porte à chacun de ses bouts un crochet, 392. — Le moule, morceau de bois rond ou plat, qui sert à travailler les mailles, 393. — Explication de quelques termes qu'emploient les mailleurs des filets, 396. — Ce que c'est qu'enlarser un filet, 397, 413. — Ce que c'est que le border, le coudre, le monter, 398. — Des différentes formes des mailles, 399. — De la manière dont se font les différents nœuds qui joignent les fils les uns avec les autres. Il y a deux façons, qui se nomment l'une *dessus le pouce*, et l'autre *sur le petit doigt*. 1^{re} manière, 400. — 2^e manière, 403. — Trois opérations pour cela, 404. — Manière de travailler les filets, dont les mailles sont en losange, 406. — Comment on bride un filet à mailles en losange, pour qu'il ne puisse pas s'allonger aux dépens de sa largeur, 411. — Comment on augmente l'étendue du filet au moyen des *accrues*, et ce que c'est, 415. — Comment on diminue la largeur du filet, 417. — Façon de travailler les filets à mailles carrées, 418. — Comment on fait un filet à mailles carrées qui soit plus long que large, 422. — Manière de faire un trémail, tramail, ou filet contre-maillé, 423. — Comment on fait les filets ronds, soit cylindriques, soit coniques, 427. — Manière de travailler un filet rond qui ait une ou plusieurs entrées semblables à celle d'un *verveux*, et que quelques-uns nomment des *goulets*, 429. — Racommodage des filets, 432. — Cet art est le chef-d'œuvre qu'on exige, dans quelques provinces d'Allemagne, de ceux qui veulent devenir maîtres pêcheurs, *idem* (note). — Comment on garnit de lest et de flottes les bords des filets, 437. — Comment on garnit de corps légers, ou de flottes, le bord du filet qui doit tendre vers la surface de l'eau, 438. — Comment on garnit de lest le bord inférieur d'un filet, 440. — Du tannage et de la conservation des filets, 443. — Comment on tanne les filets et les cordages, 449. — Comment les Catalans, pêcheurs de sardines, tannent leurs filets, 452. — Singulière attention des pêcheurs pour

pour conserver leurs filets, 453. — Description des filets ou des pièges qui servent à la pêche, les sennes, acènes, sènes ou saines. *Hist. des Poissons*, XIII, 338. — Les bouliers, 342. — Les manets, 344. — Le guideau, 345. — L'épervier, 349. — L'échiquier, 353. — Le hunier, 356. — Le truble, le érable ou trouble, *idem*. — Les manioles, 357. *Voyez* ces différents noms.

FILICES. *Voyez* FOUGÈRES.

FILIPENDULE. genre 3 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 136.

FILICULE OU PETITE FOUGÈRE. *Hist. des Plantes*, III, 178.

FILLES. Elles peuvent faire des môles, sans avoir eu de communication avec le mâle, XVIII, 133. — Il naît à Paris plus de garçons que de filles, XIX, 331. — Causes de la plus nombreuse production de filles, 351.

FINGAH (le). Espèce de pie-grièche, XXXIX, 303. — Sa description, par Edwards, 304.

FIROLES (les) ptérotachées. genre 20 de l'ordre second des mollusques. *Hist. des Mollusques*, V, 78. — 4 espèces, 79.

FISCAL (le). Espèce de pie-grièche du Cap de Bonne-Espérance, par Sonnini, XXXIX, 325. — Particularités sur ses habitudes, 327.

FISCHER (le). 10^e espèce du genre des poissons appelés bodians. *Hist. des Poissons*, X, 303 et 319.

FISSILIA. genre 3 des orangers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 253.

FISSURELLES (les). genre 36 des mollusques. *Hist. des Mollusques*, V, 227. — Ce qu'en dit Adanson, 228. — Cinq espèces, 229.

FIST DE PROVENCE (le). Oiseau ainsi nommé à cause de son cri, II, 218.

FISTULAIBES (les). genre 188 des poissons. Celui petimbe. *Hist. des Poissons*, XII, 345, 346.

FISTULANES (les). genre 169 des mollusques dits acéphales. *Histoire des Mollusques*, VI, 445. — Celle masue, 448.

Tab. TOMZ I.

B b

TITERT (le) ou le **Traquet**. Oiseau de Madagascar, LI, 285.

FLAGELLAIRE (la). Genre 5 de la famille des asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 101. — Une espèce connue, 102.

FLAMINGO (le). Espèce de bœvreuil, XLIX, 179.

FLAMINGOS (les). Voyez le **FLAMMANT**.

FLAMMANT (le) ou le phénicoptère, 2^e espèce des oiseaux à pieds palmés et à hautes jambes. LXI, 19. — Etymologie de son nom, 20. — Sa description, 23. — Son bec singulier, 24. — Son espèce est isolée, 27. — Lieux qu'il fréquente, 28. — Ses voyages, 32. — Ce qu'en disent différents auteurs, 33 et suivantes. — Ceux d'Amérique, 37. — Leurs nids, 38. — Leur plumage, 40. — Leur nourriture, 41. — Leurs habitudes, 42, 52. — Les anciens faisoient grand cas de la chair du flammant, et sur-tout de sa langue, 47, 48. — On l'apprivoise aisément. Lettre de M. Pommier à ce sujet, 49, 50. — Ses habitudes, 52. — Le flammant du Chili, par Sonnini, 53.

FLAMME. Expérience sur (la), IV, 272. — Sa définition, par Newton, et sa propriété de communiquer le feu, 273.

FLAMME (la). Espèce de poisson de la Méditerranée, qui a des écailles; on ne les a pas observées avant M. Broussonet. *Hist. des Poissons*, II, 198.

FLAVEOLE (la). Oiseau de l'espèce des bruants, XLIX, 87.

FLAVER (le). Oiseau de Cayenne, espèce de gros-bec, XLVH, 52.

FLAVIGNY, ville. Etat des naissances, mariages et morts dans cette ville depuis 1770 jusques et compris 1774, XIX, 341.

FLÈCHE (la). Poisson osseux du genre des callionymes, 14^e espèce. *Hist. des Poissons*, VI, 226. — Sa description, 227. — Caractères qui le distinguent de la lyre, 228.

FLÉOLLES (les). genre II des graminées. *Hist. des*

plantes, VII, 118. — Espèce remarquable, la fléole des prés ou tymothy, 5 espèces de France, 119. — 5 espèces connues, 120.

FLÉTAN (le). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *pleuronectes*. *Hist. des Poissons*, XI, 278. — Sa description, 283. — Comment on le pêche, 298. — Nom qu'on donne à ses différentes parties, 299. — Le dauphin est son ennemi, 300. — Ses habitudes et description de ses parties, 302.

FLEUR (la). Analyse de ses différentes parties, et exemples tirés de l'œillet. Son organisation. *Hist. des Plantes*, II, 13. — Du calice et de la corolle, formant le périanthe double, 15. — Caractères distinctifs des différentes espèces de périanthes, enveloppes immédiates des organes de la génération, 21. — Des enveloppes florales, 22. — D'où vient qu'elles sont mal définies, 28. — Des étamines et de leur métamorphose en pétales, 31. — De l'anthère, 34. — De la poussière appelée *aura seminalis*, ou pollen, 36. — Du pistil, 37, 40. — De l'ovaire, 38. — Des styles et des stigmates, 39. — Des glands, 41. — Du disque, du réceptacle et de l'union des parties des fleurs, 42. — Développement de la fleur, action des organes qui la composent, son épanouissement, horloge de Flore, 44. — Tableau de la floraison annuelle, d'après Lamarck, 46. — Des fleurs météoriques, 47. — Des fleurs tropiques, 48. — Pourquoi certaines ne s'épanouissent que dans les ténèbres, 49. — De leur fécondation, 52. — Mouvement très-marqué dans les étamines et le pistil, 54. — Ce qui arrive, lorsque les sexes sont séparés sur un même individu, et lorsqu'une espèce est dioïque, 55. — Ce qui arrive aux plantes aquatiques, et phénomène que présente la *Valisneria*, 56. **VOY. FÉCONDATION.** — Composition de la fleur, 153. — Disposition des fleurs sur la plante, 196. — Les fleurs en tête et les fleurs composées, 202. — Réceptacle commun, 203. — Fleurs composées, IV, 12, (note). — Fleurs monopétales; ovaire libre, VI, 71. — Fleurs monopétales, ovaire adhérent, 86. —

- Fleurs polypétales, ovaire libre, 89. — Fleurs polypétales, ovaire adhérent, 118. — Fleurs apétales hermaphrodites, ovaire libre, 121. — Fleurs hermaphrodites; périanthe simple adhérent à l'ovaire, 131. — Fleurs à sexes séparés; périanthe simple, ovaire libre, 137. — Sexes séparés, périanthe simple, ovaire adhérent, 143.

FLEURS DE SAINT-THOMAS ou la quettarde de l'Inde. *Histoire des Plantes*, XIV, 99.

FLEURIEU (le). Seule espèce du genre 10 des poissons appelés ostorhinqes. *Hist. des Poissons*, IX, 369. — Sa description, 370.

FLEUVES. Direction des fleuves pareille à celle des plus grandes montagnes, II, 57. — Pourquoi dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique ils s'étendent plus d'orient en occident, que du nord au sud, 60. — Fonds du lit des fleuves et surface de l'eau souvent plus élevée que les terres adjacentes, 64. — Plus grande largeur des fleuves à leur embouchure, 65. — Le mouvement de leurs eaux, 67. — Il y a dans les fleuves deux espèces de remous, 69. — Comment les gens de rivière s'aperçoivent qu'il doit arriver une grande crue d'eau, 72. — Courant des fleuves, 73. — Moyen de diminuer la vitesse de l'eau et de la contenir, 76. — Nouvelles observations sur la théorie des eaux courantes, 78, 84. — Sur les inondations, 81. — Quels sont les plus grands fleuves de l'Europe et de l'Asie, 85. — Quels sont les plus grands fleuves de l'Afrique, 86. — De l'Amérique, 87. — Quelle est la quantité d'eau que reçoit la mer par tous les fleuves qui y arrivent, 88. — Quels sont les fleuves les plus rapides, 92. — Quantité de rivières qu'ils reçoivent dans leur cours, 93. — Combien de fleuves tombent immédiatement dans l'Océan, la Méditerranée et la mer Noire, 95. — Ce qu'ils transportent avec leurs eaux, *idem*. — Sur la différente pente des eaux des fleuves, 104. — Fleuves qui se perdent dans les sables et dans le sein de la terre, 109. — Le Volga est un des plus grands fleuves du monde, 196. — Changemens que les fleuves occasionnent dans

la terre, III, 135, 429. — Sur les fleuves de la Guiane, IV, 121.

FLOUVES (les), *anthoxanthum*. genre 4 des graminées *Hist. des Plantes*, VII, 105. — Espèce remarquable, la flouve odorante, une espèce de France, 106. — 5 espèces connues, 107.

FLEW-COAL. Espèce de charbon de terre qu'on emploie à Birmingham dans les cheminées, IX, 28, (ote) 125.

FLEZ (le). 5^e espèce du genre des poissons appelés pleuronectes. *Histoire des Poissons*, XI, 274. — Lieux qu'il fréquente, 319. — Bonté de sa chair, 322. — Sa description, 323.

FLINT-COAL. Espèce de charbon de terre d'Angleterre, IX, 124.

FLORAISON (la). Tableau de la floraison annuelle, d'après Lamarck. *Hist. des Plantes*, II, 46.

FLORE (calendrier de), nécessaire à dresser partout relativement à la germination et à la feuillaison. *Hist. des Plantes* I, 233. — Horloge de Flore et tableau de l'heure de leur épanouissement à Upsal, II, 48.

FLORIDE (la). Habitudes de ses habitants, XX, 328.

FLOSCOPA (le). genre 4 de la famille des asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 100. — Espèce connue, 101.

FLOTTE d'Alexandre-le-Grand. Conjecture sur la cause du soulèvement momentané des flots qui faillit à la culbuter. *Hist. des Mollusques*, II, 351.

FLOTTES. Corps spécifiquement plus légers que l'eau, dont on se sert pour garnir les bords des filets pour la pêche, afin qu'ils se tiennent dans l'eau verticalement, *Hist. des Poissons*, II, 438.

FLOX. genre 1 des plantes dites *polemoines*. *Hist. des Plantes*, XVI, 122. — Onze espèces, 123, 124. — Leurs propriétés, 125.

FLUX (la). On appelle ainsi les rets qui sont entre deux hameaux d'un filet pour la pêche. *Histoire des Poissons*, II, 381.

FLUOR, ou chaux fluatée, XVI, 225. — Fluors composés, 241.

FLUTEAU (le), ou la damasone étoilée. genre 2 de la famille des plantes dites butomes. *Histoire des*

Plantes, VIII, 197. — Espèce de France et espèce connue, 198.

FLÛTEUR (le). Espèce de merle de l'Afrique, **XLVI**, 212 — Sa description, par le Vaillant, 215.

FLUX ET REFLUX. Il est causé principalement par la lune, I, 105. — Effets qu'il produit dans la mer, 112. — Il a produit les plus grandes montagnes, 120. — Du flux et du reflux, II, 218. — Ses rapports avec la lune, 219. — Ses principales circonstances, 220. — Nature de la force qui le produit; son action, ses effets, 221. — Ce qui en résulte, 225. — Quel est le plus grand flux qu'on connoisse, 226. — Ses alternatives, 228. — Phénomènes qui résultent du mouvement alternatif du flux et du reflux, et du mouvement constant de la mer d'orient en occident, 234.

FLUX MENSTRUEL. **XVII**, 80; il est nécessaire à l'accomplissement de la génération, 111.

FLYNDRE (le). 6^e espèce du genre des poissons appelés pleuronectes. *Hist. des Poissons*, XI, 274, 324.

FODIA (la). genre 105 des mollusques dits acéphales. *Histoire des Mollusques*, VI, 163.

FOUNE. Insecte de la famille des évaniales. Ex. *Fœnus asseclator*. *Hist. des Insectes*, III, 329. — Genre 341 d'insectes, **XIII**, 194.

FÆTIDIA. Genre 14 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, **XVII**, 72.

FÆTUS. Idées de Descartes sur sa formation, **XVII**, 125. — Comment elle a lieu suivant Hippocrate, 151. — Différence entre le fœtus, et la ponte des ovipares et celle des vivipares, 312. — De la formation du fœtus, **XVIII**, 78. — Le fœtus humain est le résultat du mélange des deux semences de l'homme et de la femme; explication à ce sujet, 83, 107, 109. — Pourquoi chaque indivision, mâle ou femelle, ne produit pas seul son semblable, 87. — Remarques de M. Daubenton sur un fœtus, 108. — Le produit total de la génération, le fœtus, son placenta et ses enveloppes croissent tous par intussusception, 125. — Lieu où doit se faire la formation immédiate du fœtus, 126. — Fœtus formé dans l'ovaire, 129. — Développement et accroissement du fœtus, 141. — Son premier développement, 146.

— Immédiatement après le mélange des deux liqueurs séminales, tout l'ouvrage de la génération est dans la matrice sous la forme d'un petit globe, 159. — Premières branches du fœtus, et développement successif de ses parties; son état suivant ses différens âges, 160. — Ses changemens de position dans la matrice, 169. — Examen de ses fonctions naturelles et des organes qui lui sont nécessaires alors, et qui lui deviennent inutiles après sa naissance, 177. — Le fœtus n'a aucune communication avec l'air libre, et ne respire pas, à moins que, après l'écoulement des eaux, l'air n'entre dans la cavité de la matrice, 181. — Circulation du sang dans le poumon du fœtus, 182. — Si le sang de la mère passe dans le corps du fœtus, 184. — Si la liqueur de l'amnios est une nourriture qu'il reçoive par la bouche, 185. — Comment il est nourri, 186, 269. — Si tout ce qui affecte la mère peut aussi affecter le fœtus, 188, 190, 197. — Comment il contracte dans le sein de sa mère la vérole, 193. — Il en est de même du rachitisme, 194. — Causes occasionnelles de sa sortie de la matrice, 208. — Cette cause, suivant M. de Buffon, vient des menstrues, 211, 218. — L'action propre du fœtus y contribue aussi, 221. — Son accroissement successif, 293. — Du toucher du fœtus, XX, 48. — Fœtus de guenon, XXXVI, 84.

FOLLE. Sa description, XXI, 95.

FOLATRETTES. Manière de prendre les bécasses, décrites par Belon, LVII, 369.

FOLLE. C'est ainsi qu'on appelle un filet avec lequel on prend les tortues marines; ce qu'on nomme la folle. *Histoire des Reptiles*, II, 32. — Autre espèce de filet dont on se sert pour la pêche des raies. *Hist. des Poissons*, III, 222. — Comment avec la demi-folle on pêche les squales, IV, 151. — On appelle ce filet *hoye leviche*, à Barfleur, 152.

FOLLICULE (le). Capsule allongée, espèce de fruit. *Histoire des Plantes*, II, 208.

FONTAINES SALÉES, X, 157.

FONTANÉSIE (la) à feuilles de fillaria. genre 4 de

plantes dites jasminées. *Hist. des Plantes*, XV, 149 — Une espèce connue, 150.

FONTINALE. Genre 5 des plantes mousses. *Hist. des plantes*, III, 151. — Quatre espèces, 152. — IV, 57.

FORCES. Forces primitives de la nature, IV, 187. — Force d'impulsion secondaire à celle-ci, *idem.* — La force d'attraction et celle d'expansion étant deux effets généraux de la nature, on ne doit pas en demander les causes, 194. — Réduction de ces deux forces à une seule primitive, 195. — Ce qui produit les effets de la force expansive, confirmée par l'expérience, 196. — Elle n'est dans le fait que la réaction de la force attractive, 197. — Sur le mot force en général, XIV, 297. — Comparaison de celle de l'homme avec celle des animaux, XVIII, 433. — Expérience sur celle de l'homme, 434.

FORÊTS (les). Une seule forêt de plus ou de moins suffit pour changer la température d'un pays, IV, 29. — Conservation et rétablissement des forêts, VI, 367. — Note à ce sujet, par Sonnini, *idem.* — Premier moyen de conservation, 371. — Sur la loi de réserve, 374. — Second moyen de renouveler les bois, 383. — Culture et exploitation de forêts, 398. — Expériences à ce sujet, 401. — Moyen de convertir en bois un champ, 405. — Règlement pour les eaux et forêts, donné en 1707, par le duc de Lorraine. *Hist. des Poissons*, II, 219.

FORFIGULE. Insecte particulier. Ex. *Forficula auricularia*. *Hist. des Insectes*, III, 268. — Genre 249 d'insectes, formant la première section des orthoptères; on les connoît vulgairement sous le nom de perce-oreilles, XII, 87. — Leur accouplement, 88. — Quatre espèces: l'auriculaire, le gigantesque, le bimoucheté et le nain, 90, 91.

FORGERON (le). 2.^e espèce du genre des poissons appelés chétodons. *Hist. des Poissons*, XI, 109, 144. — 5.^e espèce du genre des poissons appelés zéés, 252 257. — Cas que faisoient les anciens de ce poisson

258. — Anecdote à ce sujet, 259. — Sa description, 260, 261.

FORGESIA. *Hist. des Plantes*, XIV, 186.

FORME. On a plus besoin souvent de connoître la forme que la matière, XVIII, 151.

FORMICAIRES. Fourmis. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 352. — Famille 16, V, 311. — Famille 66 des insectes, XIII, 241. — genre 362, les fourmis; leurs rapports avec les typhies et les doryles, *idem*. — Leurs habitations, 242. — Celles ouvrières, 243. — Leurs larves en nymphes, 233 — Les fourmis ailés, 245. — Leurs habitudes, 246. — Ravage qu'elles causent, 247. — Moyen de les détruire, 249. — Celles noires, *idem*. — Espèce particulière en Amérique, 250. — Passage curieux du voyage de Stedman sur les fourmis exotiques, *idem*. — Les ennemis des fourmis, 252. — On peut les diviser en plusieurs genres et espèces, 253. — genre 352, la fourmi, proprement dite, 254. — Huit espèces, 255. — genre 363, la polyerque, 256. — genre 354, l'odontomaque, 257. — genre 365, la ponère, 257. — genre 366, l'éciton, 258. — genre 367, la myrmice, *idem*. — Quatre espèces, 259. — genre 368, le cryptocère, 260. — genre 369, les doryles, *idem*.

FORMIQUE. Nom donné par les chimistes à un acide qu'on retire de certaines fourmis. *Hist. des Insectes*, XIII, 252. — Usage qu'on en peut faire, 253.

FORMOSE (île). Ses habitans, XX, 160.

FORSYTHIE (la) à rameaux perdus. genre 3 des plantes dites jasminées. *Hist. des Plantes*, XV, 148. — Une espèce connue, 149.

FORSKALES (les) genre 18 de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 124. — Trois espèces connues, 126.

FOSSANNE (la). Animal de Madagascar, qui a les mœurs de la fouine, XXXIII, 2.

FOSSILE (le). Poisson du genre des misgurnes. *Histoire des Poissons*, XI, 372. — Ses habitudes, 373. — Sa sensibilité aux variations de l'atmosphère, 375. — Pourquoi on l'a appelé thermomètre vivant, 376. — Ses couleurs. 378. — Sa description, 379. —

4^e espèce du genre des poissons appelés silures, XII, 6, 22.

Fossiles (les). Sur ceux qui procurent aux pierres une plus grande dureté que celle qui leur est propre, VIII, 217 (note). — Pétification fossile, XIII, 337. — Des différentes espèces de fossiles, *idem*. — Collection particulière de fossile-coquille. *Histoire des Mollusques*, IV, 141. — Fossiles gigantesques qu'on retrouve dans le sein de la terre, 274 (note). — Difficultés que présente l'histoire des corps fossiles, 333. — Mémoire sur les reptiles trouvés fossiles dans l'intérieur de la terre. *Hist. des Reptiles*, VIII, 276. *Voy. Coquilles, Nautilus.*

Fossoyeurs (les). Insectes du genre des carabiques, qui comprennent ceux scarita et clivine. *Hist. des Insectes*, VIII, 373.

Fothergill (le). Genre 1 de la famille des plantes appelés amentacés. Sa description. *Hist. des Plantes*, X, 259. — Une espèce connue, 260.

Fouane (Pêche à la). On l'emploie pour prendre les anguilles. *Hist. des Poissons*, VI, 109.

Foucroi (la persèque). 14^e espèce du genre des poissons appelés persèques. *Hist. des Poissons*, XI, 37 et 76.

Fou-di-jala (le). Oiseau de Madagascar qui a rapport au rossignol, LI, 73.

Foudis (les). Oiseaux de Madagascar, espèce de friquet, XLVII, 171. — Leur description, 172. — Deux espèces, 173.

Foudre (la). Ses effets sur une journée de saïence, XIV, 304 (note).

Fougères (les). *Silices*. Leur cotylédon. *Hist. des Plantes*, I, 135. — Anatomie des fougères, II, 351. — Famille 6 des plantes acotylédones, III, 166. — Fougères proprement dites, et leurs différentes espèces, 167. — La lonkite et ses différentes espèces, 172. — Le polytric et ses espèces, 174. — Le polypode et ses espèces, 175. — La rue des murailles et ses espèces, 177. — Filicule ou petite fougère, 178. — Capillaire et ses espèces, 180. — Cétérac, 181. — Ses es-

pièces, 182. — La langue de cerf et ses espèces, *idem*. — L'émissionite et ses espèces, 187. — L'osmonde, 188, 191. — § 1. Follicules disposées sur un épi distinct; les autres parties de la fructification inconnues. genre 1, l'ophioglosse ou langue de serpent, 189. — Ses espèces et leurs vertus, 190. — genre 2, l'osnocea. § 2, follicules imposées au-dessous du feuillage; les autres caractères inconnus. genre 4, fougère mâle, polypode. *Voyez ce mot*. — genre 5, fougère femelle, ptéris, 203. — 19 espèces, 204. — Propriétés et usages, 205. — genre 6, cétérac, 206. — genre 7, scolopendre, 207. — genre 8, polytric, *asplenium*, 208. — genre 9, rue des murailles, ou sauve-vie, *ruta muraria*, 209. — genre 10, émissionite. genre 11, lonchite. genre 12, blechnum, 210. — genre 13, myriotheca. genre 14, capillaire, *adiantum*, 211. — genre 15, darea. genre 16, trichomanes. § 3, anthères imposées sur le strobile, pistil visiblement séparé des étamines. genre 17, zamia, 213. — genre 18, cycas, 215. — § 4, anthères mêlées avec les pistils sous le même involucre. genre 19, pillulaire, 215. — genre 20, lentille d'eau ou canillée, *lemna*, 217. — § 5, fructifications moins connues, plantes rapprochées des fougères. genre 21, marisses ou grandes lentilles d'eau, *marsilea*, 218. — genre 22, insectes, 219. — genre 23, préle, *equisetum*, 220.

FOUILLE. Fouille faite pour un puits, à Marly-la-Ville, et état des différens lits de terre qu'on y a trouvé, I, 321. — Fouille faite pour reconnoître les couches de glaise et d'ardoise, VIII, 110.

FOUINE (la). On appelle ainsi un instrument dont on se sert pour percer les poissons qu'on veut prendre. *Hist. des Poissons*, VIII, 225 (note).

FOUINE (la). Si la fouine et la marte sont de la même espèce, XXIV, 356 et suiv. — Habitudes de la fouine, et si on peut l'appriivoiser, 361. — Portée de la femelle, 363. — Description de la fouine, 364 (note). — Différentes espèces de fouines, 368. — Celle de la Guiane, 367.

FOULES (les). Espèce d'hommes qui semblent

faire la nuance entre les Maures et les Nègres, XX, 258.

FOULQUE (la). Oiseau d'eau, appelé aussi moule. Sa description et ses habitudes, LIX, 270. — Comment on la chasse, 272. — Son nid et sa ponte, 273. — Lieux où on la trouve, 276. — Deux espèces, 277. — Pourquoi on l'a appelée *chauve*; son plumage, sa grandeur, 278. — Son cri, 279. — Ses variétés, par Sonnini, 280. — La macroule ou grande foulque, 282. — Observations faites sur cet oiseau vivant, 283. — La grande foulque à crête, 285. — La foulque cendrée, par Sonnini, 286. — Le grèbe-foulque, 347.

FOUNINGO (le). Espèce de pigeon ramier de Madagascar, XLIII, 245.

FOURMEIRON (le). Oiseau de Provence, qui se nourrit principalement de fourmis, et qui a du rapport avec le traquet, LI, 269.

FOURMILIERS (les). Celui de l'Amérique méridionale, XXVII, 224. — Sa description par M. de La Borde, 225. — Les fourmiliers sont des oiseaux de la Guiane, mangeurs de fourmis, XLIX, 335. — Ces oiseaux ne sont ni des perdrix, ni des merles, ni même des brèves, 337. — Plusieurs espèces d'oiseaux mangeurs de fourmis, 338. — Leur voix, 339. — Le roi des fourmiliers, 1^{re} espèce, 341. — Sa description, 342. — L'azurin, 2^e espèce, 344. — Le grand bécroï, 3^e espèce, 345. — Son singulier qu'il fait entendre matin et soir, 346. — Le petit bécroï, 348. — Le palikur ou fourmilier proprement dit, 4^e espèce, 350. — Le colma, 354. — Le tetema, 355. — Le fourmilier huppé, 5^e espèce, 357. — Le fourmilier à oreilles blanches, 6^e espèce, 359. — Le carillonneur, 7^e espèce, 361. — Le bambla, 8^e espèce, 364. — L'arada, 366. — Les fourmiliers rossignols, 372. — Le coraya, 1^{re} espèce, 373. — L'alapi, 2^e espèce, 374. — Le fourmilier ou louatirouaou, XXVII, 224. — Sa description, par M. de la Borde, 125. — Celui aux longues oreilles, 127. — Erreur de Seba sur les fourmiliers, *idem*. — Climats propres aux fourmiliers, et réponse de Buffon à M. Vosmaër, 242. — Du cochon de terre, espèce de fourmilier, 252 (note), 254 (note).

FOURMI BLANCHE. Voy. TERMES.

FOURMI-LION (le). Sa description et son industrie. *Hist. des Insectes*, I, 134. — Il présente dans quelques cas l'image bien naturelle du malheureux Sysiphe, 137. — On appelle aussi de ce nom les myrméléonides. *Histoire des Insectes*, III, 282 ; V, 285. — 53^e famille des insectes. Les seules de cette famille sont les ascalaphes et les myrméléons. XIII, 22.

FOURMIS (les). Leur immense quantité dans différents endroits, XLIX, 333 (note). Voy. FOURMI-LIERS. — Elles sont très-friandes du miel. *Hist. des Insectes*, I, 120. — Leur république, 225.

FOURMICAIRES. Leur logement, 224. — Les grains qu'elles charrient sont pour cet objet, 225. — Celles du nouveau-monde font du carton, 228. — Fourmis arquées, *arcuatæ*. *Histoire des Insectes*, III, 353. — Fourmis chameaux, *camelinæ* ; fourmis atômes, *atomariæ* ; fourmis ambiguës, *ambiguæ*, 354. — Fourmis porte-pince, *chelatæ* ; fourmis étranglées, *coarctatæ*, 355. — Fourmis bossues, *gibbosæ* ; fourmis piquantes, *punctoriæ*, 356. Voy. FORMICAIRES.

FOURNEAUX à la catalane, ce que c'est, X, 24.

FOURNIER (le). Oiseau d'Amérique, qui fait la nuance de passage entre la femelle des promerops et celle des guépiers, LIV, 208.

FOURRURE. Où se trouvent les plus belles. Celles du castor, XXVI, 123, 124.

Fous (les) Oiseaux qui sont répandus d'un bout du monde à l'autre, et des mers du nord à celles du midi ; pourquoi on les a ainsi nommés, et leur peu d'instinct, LX, 153. — Cause à laquelle on peut attribuer leur stupidité ou imbécillité, 157. — Leur plus cruel ennemi est l'oiseau appelé frégate, 158, 196. — Description de leurs combats, 158 (note). — Vol et pêche du fou, 159. — Sur les boubies, oiseaux de mer, *idem* (note 2). — Hostilités entre ces oiseaux et la frégate, 162. — Leur rapport avec les corimorans, 164. — Leur cri et articulation de leurs mandibules ou mâchoires, 165. — Ils sont du genre des palmipèdes, et ne per-

chent pas, 166 (note). — Le fou commun, 1^{re} espèce; on l'appelle oiseau fauve, 167. — Lieux où il se trouve, 169. — Ses voyages, 170 (note 5). — Le fou blanc, 2^e espèce, 172. — Le grand fou, 3^e espèce, 174. — On en a apprivoisé un, et comment, 175. — Le petit fou, 4^e espèce, 177. — Le petit fou brun, 5^e espèce, 178. — Le fou tacheté, 6^e espèce, 180. — Le fou de Bassan, 7^e espèce, 182. — Sa description, 184. — Le petit fouquet, par Sonnini, 188.

FRACTICORNES. Insectes particuliers. *Hist. des Insectes*, III, 198. — 2^e division des insectes dits charançonites, XI, 97.

FRAGONS (les) genre 15 de la famille des asperges. *Hist. des Plantes*, VIII, 130. — Espèces remarquables, le fragon piquant, 132. — Le fragon à feuilles nues, et une espèce de France, 133. — 5 espèces connues, 134.

FRÉGATE (la) Oiseau ainsi nommé à cause de son vol très-rapide, LX, 190. — Ce que dit Labat de son vol, 192. — Ce qu'en disent d'autres auteurs, 193, 194. — Les poissons qui voyagent en troupes dans les hautes mers, et s'élancent en l'air pour échapper aux dorades, n'échappent point à la frégate, 193. — Lieux où on l'aperçoit, 195. — Son armure guerrière, 198. Longueur de ses ailes, 199. — Son nid et sa ponte, 201. — Comment on la reconnoît de loin en mer, 202. — Utilité de son huile ou graisse, 204 (note).

FRELICHE (la) paniculée. Genre 1 des plantes rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 312. — Une espèce connue, 313.

FRÈNES (les) genre 5 des plantes dites jasminées. *Histoire des Plantes*, XV, 151. — Le frêne commun, ou le grand frêne, 152. — Pourquoi on l'écarte des jardins, 155. — Usage de son bois, *idem*. — Le frêne à feuilles rondes, ou frêne de Calabre, ou frêne à la manne-l'orne, 157. — Comment la manne en découle, et comment on la tire, 159. — Le frêne à fleurs, 160. — 2 espèces de France, 161. — 16 espèces connues, 162.

FRAISE (la), ou caille de la Chine, XLIII, 104.

— Elles se battent à outrance les unes contre les autres, 105. — La grande caille de la Chine décrite par Sonnerat, 106.

FRAISIER, *fragaria*. genre 21 des plantes dites rosacées. *Histoire des Plantes*, XVII, 119. — 3 espèces, et leurs propriétés, 120.

FRAMBOISIER, *rubus idæa*. genre 25 des plantes dites rosacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 127. — 2 espèces, *idem*. — Leurs propriétés, 128.

FRANCE (la). Elle étoit autrefois jointe à l'Angleterre, I, 356.

FRANC-CARRÉAU (jeu du). Ses conditions et chances qu'il peut présenter, XXI, 164.

FRANGOLIN (le). Espèce de gelinotte bien différente de l'attaga, XLII, 18. — Autre espèce de francolin, XLIII, 31. — Plumage du francolin, espèce de perdrix, 32, 36. — En quoi il diffère, 34. — D'où lui vient son nom, 36. — Autres particularités sur cet oiseau, 37.

FRANGÉE (la raie). 33^e espèce. Voy. RAIE.

FRANGIPANIER, *plumieria*. genre 6 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 168. — 3 espèces et leurs propriétés, 169.

FRANKENIA. genre 31 des plantes caryophyllées. *Histoire des Plantes*, XVIII, 149. — 3 espèces, 150.

FRANGULA. Voyez BOURDAINE.

FRANQUISE. Nom donné, à Caen, à une variété du poisson appelé la plie. *Hist. des Poissons*, XI, 318.

FRAYÈRE. On appelle ainsi la cavité que creuse la femelle du saumon pour sa ponte. *Hist. des Poissons*, XII, 132.

FRÉDÉRIC (le). 12^e espèce du genre des poissons appelés characins. *Histoire des Poissons*, XII, 260, 271.

FRÈUX (le), ou la FRAYONNE. Espèce de cornelle, XLIV, 91. — Particularités sur son bec, 92. — Ces oiseaux volent par troupes, et dégâts qu'ils occasionnent, 95. — Leur ponte et leurs nids, 96. —

Remarques à ce sujet de Schwenckfeld, 97 (note). — Lieux qu'habite le freux, 98.

FRINGILLA ou MOINEAU. Nom sous lequel des auteurs ont compris différentes espèces d'oiseaux, XLVII, 16. — On trouvera leurs différens noms à l'article MOINEAU.

FRIQUET (le). Espèce de moineau, et ses différences d'avec le véritable, XLVII, 154. — Lieux qu'il habite, et ses habitudes, 156, 164. — Ses variétés, 158. — Son plumage, 161. — Ses alimens, 162. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au friquet : savoir, le passereau sauvage, 166. — Le passe-verd, 168. — Le passe-bleu, 169. — Les foudis, 171. — Le friquet huppé, oiseau de Cayenne, 175. — Le beau marquet, 178. — Le lovely, 180.

FRITILLAIRES (les). genre 2 de la famille des lys. *Hist. des Plantes*, VIII, 267. — Espèces remarquables, la fritillaire méléagre, 268. — La fritillaire des Pyrénées, 269. — La fritillaire de Perse, 270. — 2 espèces de France et 5 espèces connues, 271.

FROID. Quel est le pays du monde le plus froid, II, 12. — L'homme, maître de l'élément du feu, ne l'est pas également de l'élément du froid, IV, 30. — D'où vient que le froid augmente à mesure que l'on monte dans les montagnes, 220. — Sur le degré absolu du froid, 230 (note). — Ses différens degrés, 250. — Il y, a pour le froid, comme pour le chaud, quelques contrées sur la terre qui font une exception à la règle générale, VII, 341. — Pourquoi les hommes, les animaux et les plantes supportent plus aisément le grand froid que la grande chaleur, 345. — Comment de très-petits animaux peuvent résister à un très-grand froid, LII, 169 (note). — Le froid est le terme du repos de la nature. *Hist. des Mollusques*, I, 101.

FROMAGER, *bombax*. genre 26 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 204. — 4 espèces et leurs propriétés, 205.

FROMENS (les). genre 57 des graminées. *Hist. des Plantes*, VII, 275. — Espèces remarquables; celui cultivé

cultivé, 276. — Celui à épi rameux ou blé de miracle, et celui épéautre, speltz des Allemands, 285. — Celui locular ou petit épéautre, 286. — Le chien-dent ou froment rampant, 287. — Maladies des fromens, 281. — 10 especes de France, 288. — 11 especes connues, 290.

FRONT. Description de celui de l'homme, XXIII, 394.

FRUITS. Date très-moderne de nos meilleurs fruits à pepins et à noyaux, IV, 38. — Fruits rongés par les insectes. *Histoire des Insectes*, I, 154, 166. — Les insectes accélèrent aussi quelquefois leur maturité, 168. — Développement de la graine dans le fruit. *Hist. des Plantes*, II, 66. — Des diverses especes de péricarpe considérés comme faisant partie du fruit, 70. — Des fruits, 204. — 5 especes, 205. — La graine considérée comme partie du fruit, 230. — Nombre, situation, 231. — Les fruits mous ne peuvent pas se pétrifier, etc. *Hist. des Mollusques*, 319. — Fait très-remarquable que rapporte *Rumphius*, au sujet du fruit d'une espece de palmier, appelé *arenga*. *Hist. des Plantes*, VIII, 67.

FRUTEX, *terribilis*. *Hist. des Plantes*, XIV, 395.

FRYGANES (les). Fryganides. genre 323 d'insectes divisés en fryganes et en éphémères. Leurs larves. *Hist. des Insectes*, XIII, 74. — Leurs habitudes, 78. — 31 especes, 86.

FUCHSIA, *involucrata*. *Hist. des Plantes*, XIV, 146. — Genre 15 des plantes dites épilobes, XVII, 49. — 3 especes et leurs propriétés, *idem*.

FUCUS (les). *Fucus fimbriatus*. Sa coupe et sa description. *Hist. des Plantes*, I, 373. — Organisation des fucus, II, 342. Voy. VAREC.

FUGORIA. genre 18 des plantes malvacées, mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 200.

FUIRENE (la) à panicule. Genre 3 des plantes souchets. *Hist. des Plantes*, VII, 39.

FULGORE. Insecte particulier; ex. *Fulgora laternaria*. *Histoire des Insectes*, III, 258. — Insectes du genre des cicadaires. Leur description. XII, 300. — genre 287, 3 especes, 308.

Tab. TOME I.

C c



FULMAR (le). Oiseau formant la 8^e espèce des pétrels, LXII, 297. — Ses habitudes, 298.

FUMÉE. Expérience au sujet de son inflammation, IV, 302 (note).

FUMETERRE, *fumaria*. genre 8 des plantes papavéracées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 16. — 6 espèces, 17. — Usages, 18. — Fumeterre musquée. *Voyez* MASCUTELLONE.

FUNDULE (les). genre 153 de poissons, 2^e espèce. *Histoire des Poissons*, XI, 394. — Le fundule mudfish, 394, 395. — Le fundule japonais, 394 et 396.

FUNGI. *Voyez* CHAMPIGNONS.

FURCRÉE (la). genre 12 de la famille des narcisses. *Histoire des Plantes*, IX, 51. — Une espèce connue, 52.

FURET (le). On ne l'a pas trouvé en Amérique, XXV, 37. — Si le furet et le putois sont des animaux d'espèce différente, 117. — Sur la femelle du furet, 119. — Il est l'ennemi naturel du lapin, 120. — D'où il vient, et comment on l'apprivoise, 121. — Si c'est l'ictis des grecs, 122. — Combat d'un furet avec un canard, LXI, 361 (note).

FUREUR UTÉRINE. *Voy.* NYMPHOMANIE.

FUSAIN, *evonymus*. genre 2 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 213. — 2 espèces et leurs propriétés, 214.

FUSAN (le), *colpoon*. genre 4 de la famille des plantes dites chalefs. *Hist. des Plantes*, XI, 221. — Sa description, 222. — Une espèce connue, 223.

FUSEAU (le). genre 94 des gastéropodes. *Hist. des Mollusques*, VI, 59. — 3 espèces, 60.

FUSIBILITÉ. Ce qu'on peut lui attribuer dans les expériences sur le progrès de la chaleur chez les différents minéraux et métaux, V, 154. — Sa cause, 155. — La fusibilité de l'antimoine, 160. — Celle du zinc, 161. — Celle de la platine, 169. — Tout dans la nature est fusible, VII, 405.

FUSUS. *Voy.* FUSEAU.

G.

GABAR (le). Oiseau de proie des terres australes, XXXIX, 35. — Sa description, 36.

GABELLE. Réflexions sur le mal qu'elle a produit, X, 116.

GABIAN (fontaine de), près Beziers. Elle produit beaucoup de pétrole, IX, 212. — Nature de ce pétrole, 213.

GACHET (le) 3^e espèce de l'hirondelle de mer, LX, 107. — Désigné sous le nom de buse, par Dampier, Note de M. Sonnini, 108.

GADES (les). genre 46 des poissons osseux, 19 espèces; 1^{er} sous-genre, 3 nageoires sur le dos, un ou plusieurs barbillons au bout du museau. *Hist. des Poissons*, VI, 263. — Le gade morue, *idem.* et 269. *Voy. ce mot.* L'æglefin, 263, 311. — Le gade bib, 263 et 320. — Le gade saida et le gade blennioïde, 264, 323. — Le muschebout ou le callarias, 328. — Le tacaud, 335. — Le capelan, 337. — 2^e sous-genre, trois nageoires sur le dos, point de barbillons au bout du museau, 265. — Le colin, 340. — Le pollack, 345. — Le scy, 347. — Le merlan, 350. — Le lingue ou le gade molve, 360. — Le gade danois, 363. — La lote, 365. — La mustelle, 373. — Le gade cembre, 379. — La merluche, 380. — Le gade brosmes, 386. — Supplément au tableau générique des gades; 1^{er} sous-genre, 3 nageoires sur le dos; un ou plusieurs barbillons au bout du museau. 8^e espèce, le gade rouge. 3^e sous-genre, 2 nageoires dorsales; un ou plusieurs barbillons au bout du museau. — 14^e espèce, le gade nègre, XIII, 279. — 5^e sous-genre, une seule nageoire dorsale; des barbillons au bout du museau. Le gade lubb, 280, 281.

GADOIDE (le salmone). 2^o espèce du genre des poissons appelés salmones. *Hist. des Poissons*, XII, 117, 204.

GÆDEN (le) 9^e espèce du genre des poissons appelés salmones. *Hist. des Poissons*, XII, 112, 184.

GÆSS (le). 18^e espèce des poissons dits caranx. *Hist. des Poissons*, VIII, 17. *Voy. CARANX.*

GAHNIES (les). genre 5 des plantes dites souchets *Hist. des Plantes*, VII, 46. — 2 especes connues, *idem*.

GAILLETS (les), ou **CAILLE-LAITS**. genre 6 des plantes rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 324. — Especes remarquables, le gaillet tubéreux, 325. — Le gaillet jaune, 326. — 30 especes de France, 327. — 60 especes connues, 335.

GAINIER, ou arbre de Judée, *cercis*. genre 24 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 274. — Deux especes et leurs propriétés, 275.

GAL (le). 2^e espece de la classe des poissons osphromènes; ses couleurs. *Hist. des Poissons*, VIII, 134. — Il est venimeux, 135. — Sa description, 136.

GALAGO (le). Animal du Sénégal, espece de singe, XXXIII, par Sonnini, 88. — Ses dimensions et ses habitudes, 90.

GALANE. Voy. **CHELONE**.

GALANT de neige (le), vulgairement perce-neige. genre 10 de la famille des narcisses. *Hist. des Plantes*, IX, 44. — Une espece de France. Une espece connue, *idem*.

GALARDIENNE (la). genre 171 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 221. — 2 especes connues, 225.

GALATHÉE. Insecte de l'espece des langoustières; ex. *Galathea strigosa*. *Hist. des Insectes*, III, 32. — Genre des insectes exochantes, V, 160. — Description des galathées, 24^e genre, VI, 195. — Ce qu'en dit Bosc, 197. — Leurs especes. — La galathée striée, celle rugueuse, 198. — La galathée sociale, celle lumineuse, 199.

GALAXIES (les). genre 1^{er} de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 75. — 4 especes connues, 76.

GALBANUM, gomme. Sa nature, et d'où on la tire. *Hist. des Plantes*, XVI, 281.

GALE (la). L'insecte, appelé mite, de la deuxième espece, produit cette maladie. *Histoire des Insectes*, VII, 347.

GALEDUPA. genre 81 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 314.

GALEGA. Voyez **LAVANÈSE**.

GALÈNE de plomb. Ce que c'est; et ses espèces, X, 383. — Manière de traiter les mines en galène, 387. — Figure des usines de plomb en galène, 415. — Leur couleur, 421.

GALBOBDOLON (le) à fleurs jaunes. genre 35 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 364. — Une espèce connue, 365.

GALRODES. Insecte du genre des phalangiens; ex. *Galeodes araneides*. *Hist. des Insectes*, III, 61. — genre 7 d'insectes, décrit par Olivier, VII, 307. — Leur description, 308. — Celle aranéide, décrite par Pallas, *idem*. — Leurs habitations, 311. — Leurs espèces, 312.

GALEOPITHÈQUES (les). Oiseaux. XXXIII, 92. — Leurs rapports avec les chauve-souris, 93. — Le galéopithèque roux, par Sonnini, 95. — Le galéopithèque varié, par le même, 97.

GALEOPSIS (les). genre 29 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 345. — 5 espèces de France, 346. — 5 espèces connues, 347.

GALERA (le). Animal qui a du rapport avec la bécette et la fouine, XXXIII, 8. Voyez TAYRA.

GALERITE. Insecte du genre des longipalpes; ex. *Galerita americana*. *Hist. des Insectes*, III, 86. — genre 16 des insectes coléoptères. Leur description, VIII, 260. — 5 Espèces : 1^o celle américaine; 2^o celle occidentale; 3^o celle attelaboïde, 261. — 4^o celle odorante; 5^o celle fasciolée, 262.

GALERUQUES (les). Espèce d'insecte. *Hist. des Insectes*, III, 229, 230. — Leurs rapports avec les chrysomèles. Leur description, XI, 333. — Leurs larves, 334. — Multiplication de la galéruque de l'orme, 336. — genre 234 d'insecte, établi par Geoffroy, 394. — Dégâts qu'il fait, 395. — 16 espèces, 396.

GALÈTES. Une des pièces qui composent la bouche des insectes. *Hist. des Insectes*, II, 128.

GALETS. Ce que c'est, et où on les trouve, III, 134.

GALGULE. Insecte particulier; ex. *Naucoris oculata*.

Hist. des Insectes, III, 253. — genre 283 d'insectes de la famille des punaises d'eau, XII, 286.

GALIAN (le). 38^e espèce du genre des poissons appelés cyprins. *Histoire des Poissons*, XIII, 86. — Sa description, 170.

GALIÈNE (la) d'Afrique. genre 9 de la famille des plantes dites arroches. *Hist. des Plantes*, XI, 23. — Deux espèces connues, 24.

GALILÉEN (le). 76^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 404; et X, 127.

GALINSOGA (le). genre 172 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 174. — 2 espèces connues, 175.

GALIUM. Voyez les GAILLETS. *Hist. des Plantes*, XIII, 324.

GALLE. Espèce d'insecte des plantes et des arbres. *Hist. des Insectes*, I, 153. — Nom qu'on a aussi donné à une excroissance ou tumeur formée dans les plantes ou arbres, à la suite des blessures que leur font certains insectes, XIII, 190. — Leurs différentes espèces, 200. — Le chêne en a beaucoup, 201. — Leur accroissement, 202.

GALLERIE. Insecte du genre des papillons; ex *Galleria cereana*. *Hist. des Insectes*, III, 414. — genre 447 d'insectes de la famille des phalénites, XIV, 216. — Leurs chenilles, *idem*. — Les galeries de la cire, et celles alvéolaires, 230.

GALLINACÉS (les). Analogie entre les oiseaux gallinacés et les quadrupèdes ruminans, XLI, 297 (note). — Leur ponte, leurs œufs et leur nid, LX, 360. Voy. COQ, POULE, POULET.

GALLINE (le). 40^e espèce du genre des poissons appelés chétodons. *Hist. des Poissons*, XI, 117, 164.

GALLINSECTES. Comment se nourrissent ces insectes. *Hist. des Insectes*, I, 122. — Singularités dans les métamorphoses du mâle, II, 291. — Leur description, III, 265; V, 276. — Famille 50^e d'insectes, XII, 353.

GALON D'OR (le). 23^e espèce du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 174, 218.

GALONNÉ (le). 17^e espèce de squalé, dont Broussonnet a le premier donné la description. *Hist. des Poissons*, IV, 66. — Description de ses parties, 67. 6^e espèce du genre des poissons appelés *osmères*, XII, 209, 218.

GALOPIN (le) circéioïde. genre 16 des plantes dites rubiacées *Hist. des plantes*, XIII, 368. — Une espèce connue, 369.

GALS (les). Poissons du 3^e ordre de la 1^{re} division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 154. — genre 143 des poissons, XI, 263. — Le gal verdâtre, 263, 264.

GALUCHAT. Peau employée dans le commerce. *Hist. des Poissons*, III, 238. — Elle est la dépouille de la raie sephens, 239. — Observations, à ce sujet, d'un critique, 242 (note). — Autre espèce de galuchat, IV, 27.

GALVESIE. genre 9 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 7.

GAMASÉ. Insecte du genre des acaridies; ex. *acarus ceptoratorum*. *Hist. des Insectes*, III, 64.

GAMBARUR (le). 5^e espèce du genre des poissons appelés *esoces*. *Hist. des Poissons*, XII, 285, 307. — Sa description, 309.

GANGA (le), ou la gelinotte des Pyrénées. Sa description, XLII, 5. — Erreurs de M. Brisson sur cet oiseau, 6. — Ses habitudes et ses différences, 9. — Son plumage, 13. — Lieux où il se trouve, 14.

GANGVADEN ou **GANGWAD**. Instrument pour la pêche. Sa description. *Hist. des Poissons*, XI, 298.

GARAMIT (le). Poisson de l'espèce des blennies. *Hist. des Poissons*, VII, 154. Voy. **BLENNIE**.

GARANCES (les), *rubiacæ*. 6^e ordre, famille 43 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leur différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 371. Voyez **RUBIACÉES**, XIII, 310. — genre 9.

qu'elles forment des rubiacées ; espèces remarquables, la garance des teinturiers, 349. — Sa culture, 351. — 5 espèces de France, 355. — 8 espèces connues, 356.

GARZETTE (la) blanche. 6^e espèce du genre des hérons, LVII, 157.

GARDÈNES (les). Genre 52 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 40. — Espèces remarquables, la gardène à larges fleurs, ou le jasmin du Cap, et celle verticillée, 41. — Celle à gomme et celle à grandes fleurs, 42. — Celle à longues fleurs, 43. — 17 espèces connues, *idem*.

GARDEROBE (la). *Hist. des Plantes*, XIII, 69.

GARCINIA. Genre 3 des plantes guttiers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 270. — 3 espèces et leurs propriétés, 271.

GARENNES (les). Leur grand produit en Angleterre, XXIV, 239 (note).

GARIDELLE. Genre 15 des plantes renonculacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 341.

GARLO (le), ou le Geai à ventre jaune de Cayenne, XLIV, 255.

GARROT. Espèce de canard, LXII, 79. — Ses habitudes, 81. — Observations de M. Baillon sur sa domesticité, 82.

GARUM (le). Substance liquide ou préparation particulière que faisoient les anciens de la chair de maquereaux, et utilité qu'on en tiroit. *Hist. des Poissons*, VII, 363. — *Idem*, VIII, 89.

GASTÉROPODES (les). Ordre troisième des mollusques. Leur histoire, V, 81. — Pourquoi ainsi nommés, *ibid* — Leur description, 82. — Ils ont deux seuls sens extérieurs, *ibid*. — Organes du mouvement et de la respiration, 83. — Système de la nutrition, 84. — Distinction des sexes, 85. — Description des parties génitales, 86. — Description de la partie appelée *manteau*, qui couvre leur corps, 89. — Formation de leurs coquilles, 90. — Leur description, 92. — Tableau de leur divi-

sion , 94. — Nature de leur habitation et de leur nourriture, 95. — Comment on recueille les coquillages, 96. — Comment on détache l'animal que renferment les coquilles, 97. — Moyen inventé par l'art pour jouir des nuances de couleur qu'elles présentent, 98. — Utilité qu'on retire de l'immense quantité de gastéropodes répandue sur la surface du globe et dans les mers, 99. — Quels sont les animaux qui sont nuisibles dans cet ordre, 101. — Origine des coquilles fossiles, 102. — Nomenclature des différentes parties de la coquille, 105 et suivantes. — Gastéropodes nus. genre 21, les doris, 130. — 11 especes, 136. — genre 22, les tritonies, 141. — genre 23, les onchidies, 148. — genre 24, les téthis, 153. — genre 25, les phyllidies, 154. — genre 26, les scylées, 155. — genre 27, les aphysies, 158. — genre 28, les limaces, 174. — genre 29, la dolabelle, 184. — genre 30, le sigaret, 186. — genre 31, la bullée, 189. — Les gastéropodes testacées. genre 32, les oscabrions, 195. — genre 33, l'oscane, 203. — genre 34, les patelles, 205. — genre 35, les ancytes, 225. — genre 36, les fissurelles, 227. — genre 37, les émarginules, 231. — genre 38, les crépidules, 234. — genre 39, les calyptrées, 241. — genre 40, les planospirites, 245. — genre 41, les concholépas, 246. — genre 42, les testacelles, 249. — genre 43, les stomates, 254. — genre 44, les haliotides, 256. — genre 45, les natices, 261. — genre 46, les nérites, 267. — genre 47, les hélicines, 275. — genre 48, les sabots, 277. — genre 49, les monodontes, 285. — genre 50, les dauphinules, 290. — genre 51, les cyclostomes, 295. — genre 52, les scalaires, 300. — genre 53, les turritelles, 306. — genre 54, les toupies, 312. — genre 55, les cadrans, 318. — genre 56, les bulles, 323. — genre 57, les volvaires, 328. — genre 58, les phasianelles, 330. — genre 59, les bulimes, 333. — genre 60, les mélanies, 341. — genre 61, les physes, 343. — genre 62, les lymnées, 345. — genre 63, les succinées, 350. — genre 64, les agathines, 353. — genre 65, les maillots, 358. — genre 66, les auricules, 362. — genre 67, les pyramidelles, 368. — genre 68, les ampullaires, 371.

genre 69, les planorbes, 375. — genre 70, les valvées, 379. — genre 71, les helices, 381. — genre 72, les vitrines, 394. — genre 73, les janthines, 395. — genre 74, les vermet, 397. — genre 75, les cones, 400. — genre 76, les porcelaines, 410. — genre 77, les ovules, 419. — genre 78, les tarières, 423. — genre 79, les olives, 427. — genre 80, les anaulaces, 430. — genre 81, les volutes, 434. — genre 82, les mitres, 441. — Suite des spirivalves à ouverture échancrée à la base. genre 83, la columbelle, VI, 5. — genre 84, la marginelle, 7. — genre 85, la cancellaire, 11. — genre 86, la nasse, 15. — genre 87, la pourpre, 18. — genre 88, le buccin, 25. — genre 89, l'éburne, 30. — genre 90, les vis, 33. — genre 91, la tonne, 37. — genre 92, la harpe, 41. — genre 93, le rocher, 45. — genre 94, le fuseau, 59. — genre 95, le pyrole, 64. — genre 96, la pleurotome, 69. — genre 97, la fasciolaire, 76. — genre 98, la turbinielle, 79. — genre 99, le strombe, 82. — genre 100, les ptérocères, 89. — genre 101, les rostellaires, 93. — genre 102, le casque, 98. — genre 103, le cérillie, 106.

GASTÉROSTÈES (les). genre 88 des poissons osseux. Leurs caractères distinctifs, *Hist. des Poissons*, VIII, 377. — 3 espèces; 1^o le gastérostée épinoche. Sa synonymie et sa description, 378. — 2^o l'épinochette, 386. — 3^o la grande épinoche ou la gastérostée spinochie, 387.

GASTONIA. genre 1^{er} des plantes dites *aralies*. *Hist. des Plantes*, XVI, 249.

GASTROBRANCHES (les). genre 1^{er} (*bis*) des poissons apodes ou qui n'ont point de nageoires dites ventrales. *Hist. des Poissons*, V, 144. — L'aveugle, 1^{ere} espèce, 145. — En quoi il ressemble au pétromyzon, 146. — Sa description par le docteur Bloch, 149. — Ce que dit Kalm de ce poisson, 151, note. — Le gastrobranche dombey, 156.

GATERIN (le). Espèce 6 du genre des poissons appelés *holocentres*. *Hist. des Poissons*, X, 357, 389.

GATILIERS (les) ou **VERBENACÉES**. Famille 52 des plantes. *Hist. des Plant.*, XV, 195. — 1^{ere} section, fleur

en corymbes rameux. Fruit : baie ou drupe. Genre 1^{er}, les péragus, 197. — Genre 2, les oviedes, 199. — Genre 3, les volkamères 200. — Genre 4, les égiphilles, 202. — Genre 5, les gatiliers proprement dits, 204. — Une espèce de France, 206. — 13 espèces connues, 208. — Genre 6, les callicarpes, *idem*. — Genre 7, les andareses, 211. — Genre 8, le pétitier de Saint-Domingue, 213. — Genre 9, les agnantes, *idem*. — Genre 10, la gmeline d'Asie, 215. — Genre 11, le thek ou tek, 215. — Genre 12, les avicennes, 218. — § 2. Fleurs alternes et en épis ou en têtes, fruit ordinairement capsulaire. Genre 13, la pétée grimpante, 220. — Genre 14, les cotelets, 221. — Genre 15, les durantes, 223. — Genre 16, les lippies, 224. — Genre 17, les camaras, 226. — Genre 18, le spielmanne d'Afrique, 230. — Genre 19, les taligalées, 231. — Genre 20, les tamonnées, 232. — Genre 21, les verveines, 234. — Genre 22, les zapanes, 239. — Genre 23, la pérème velue, 242. — Genre 24, les éranthèmes, 243. — Genre 25, les sélagines, 244. — Genre 26, les hébenstrètes, 247. — Genre 27, l'hoslonde, 248. — Extrait du travail de M. Jussieu, sur la famille des gatiliers, deux nouveaux genres, le platunium et le priva, 416.

GATTAIR. Espèce de sarcelle d'Alexandrie, par Sonnini, LXII, 234.

GAULOIS (les). Culte religieux qu'ils rendoient au gui commun. *Hist. des Plantes*, XIV, 150.

GAULTIERIA. genre 10 des plantes dites bruyères. *Hist. des Plantes*, XVI, 241.

GAUR (le). Oiseau des Indes orientales, de l'espèce du bruant, par Sonnini, XLIX, 135.

GAURA. genre 11 des plantes dites épilobes. *Hist. des Plantes*, XVII, 47.

GAVAL. Voy. CROCODILE. — Description de celui fossile. *Hist. des Reptiles*, VIII, 290. — Autre espèce, 292.

GAVAL (le) 1^{ère} espèce du genre des poissons appelés lépisostées. *Hist. des Poissons*, XII, 327, 330.

GAVOURÉ (le) de Provence. Espèce d'ortolan ; XLIX, 19.

GAYAC, *Guaicum*. genre 4 des plantes rutacées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 98. — Trois espèces et leurs propriétés, 99.

GAZ. Gaz ou airs minéraux. 1^{re} classe du règne minéral, XVI, 133. — Influence des différens gaz , et sur-tout du gaz oxygène , sur la germination. *Hist. des Plantes*, I, 127, note.

GAZELLES (les). Elles ne se sont jamais étendues dans les pays du nord de l'ancien continent, XXV, 35. — On en connoit treize variétés, XXX, 260. — La gazelle commune, 261. — Sa comparaison avec le chevreuil, 262. — 2^e espèce de gazelle appelée *kevel*, 265. — 3^e espèce appelée *corine*, 266. — 4^e espèce appelée *tzeiran*, 270. — Le koba et le kob, 5^e et 6^e espèces, 274. — L'algazel, 7^e espèce, 276, 295. — Le pasan ou gazelle du bezoard, 8^e espèce, 277. — Le nan-guer, 9^e espèce, 279. — L'antilope, 10^e espèce, 282, 297. — Le lidmée, 11^e espèce, 286. — Comparaison de ces différentes espèces de gazelles, et résultats, *idem*. (Voy. ces différentes espèces, chacune à l'article qui les concerne). — Remarques sur les gazelles, 288. — Gazelles d'Alep ; ce qu'en dit M. Russell, 290. — Chasse de la gazelle avec le léopard, et autrement, 294. — Singularité des yeux des gazelles, et leurs courses, 298. — Si elles seules produisent la pierre appelée *bezoard* oriental, 300. — Ce que dit à ce sujet Kœmpfer, 301 (note). — Nouvelles espèces de gazelles découvertes par divers auteurs, 330. — Ce que rapporte à ce sujet M. Pallas, 331. — De la gazelle-pasan, 334. *Voy. PASAN*. — Description d'une gazelle particulière, par M. Klockner, 342. — Singularité de la corne de ses pieds, 346. — Ses dimensions, 347. — La gazelle antilope, XXXI, 5. — La gazelle tzeiran, 12. — La gazelle ou chèvre sautante du cap de Bonne-Espérance, 23. — Observations de M. Forster sur cette espèce de gazelle, 24. — Remarque particulière de M. Latreille sur la chasse des gazelles, 24 (note). — Gazelle privée, de cette

espèce, et sa description, 26. — Gazelle à bourse sur le dos Sa description par M. Allamand, 31. — Le klippranger ou sauteur des rochers, 34. — Le nanguer et le nagor, 36. — Le ritbok, décrit par M. Allamand, 41. — La gazelle rével, 48. — Le bosbok, décrit par le même, 49. — Animaux qui ont rapport aux gazelles. Le Bubale, 55.

GAZ HYDROGÈNE dans la vessie natatoire des poissons. *Hist. des Poissons*, I, 184, 187.

GEAI (le). Ses différences d'avec la pie, XLIV, 222. — Ses habitudes, 224. — Lieux où il fait son nid, 227. — Sa nourriture, 228. — Sa description, 229. — Son goût pour les œillets, 230. — Geai à cinq doigts, 231. — Le geai blanc, 232. — Addition à l'article du geai, par Sonnini, 234. — Ses voyages, 235. — Son éducation domestique, 237. — Manière de lui apprendre à parler, 238. — Usage qu'on faisoit de ses plumes, 239. — Comment on attrape ses petits, 241. — Oiseaux étrangers qui ont rapport au geai. Celui de la Chine à bec rouge, 243. — Le geai du Pérou, 246. — Le geai brun du Canada, 248. — Le geai de Sibérie, 251. — Sa description, 252. — Le blanche-coiffe ou le geai de Cayenne, 253. — Le garlu ou le geai à ventre jaune de Cayenne, 255. — Le geai bleu de l'Amérique septentrionale, 259. — En quoi il diffère du geai d'Europe, 259 (note). — Le geai de la baie de Nootka, par Sonnini, 261. — Le geai verd, par Sonnini, 263. — Le geai à tête pourprée, par le même, 265. — Le petit geai de la Chine, par le même, 266.

GÉANS. Les productions gigantesques paroissent avoir été fréquentes dans les premiers âges du monde, III, 285. — Géans de l'Amérique méridionale, 431. — Géans dans plusieurs espèces d'animaux, IV, 98. — La race des géans en homme est détruite depuis nombre de siècles dans les lieux de son origine, en Asie, 124. — Histoire de la dispute entre Riolan et Habicot, au sujet des os du prétendu roi Thentobochus, trouvés en Dauphiné, 127. — Histoire de tous les géans dont les auteurs ont fait mention, 131. — Différens exemples

de géans, *XIII*, 444. — Sur les géans patagons; différens détails, *XX*, 384. *Voyez* PATAGONS.

GEBELTEIR, ou la montagne des oiseaux, *I*, 346.

GECKOS (les). Genre 12 des reptiles dits sauriens. Leur description. *Histoire des Reptiles*, *IV*, 105. — Section 1^{re}. Les geckos proprement dits; celui ordinaire ou d'Égypte, 107. — Sa description, 108. — Détails sur son venin, 110. — Le gecko-lisse d'Amérique, 112. — Sa description, 113. — Le gecko à queue épineuse d'Houttuyn, 115. — Sa description, 116. — Ses dimensions, 117. — Reptiles qui ont rapport au gecko, 118. — Le tockiaie est évidemment un gecko, 120. — le gecko à gouttelettes blanches, 122. Sa description, 123. — Ses dimensions et ses variétés, 124. — Le gecko de Surinam, 126. — Le gecko porphyré, 130. — Notice de M. le Romain sur ce gecko, 132. — Le gecko chagriné, 134. — Le gecko à bande blanche de l'Inde, 136. — Sa description, 137. — Ses couleurs, 138. — Ses variétés, 139. — Le gecko à queue turbinée, 141. — Sa description, 142. — Ses dimensions, 143. — Section 2, les geckottes. Le gecko fasciculaire ou le geckotte, 144. — Sa description, 145. — Ses dimensions, 146. — Le gecko muriqué, 153. — Le gecko à écailles trièdres, 155. — Ses dimensions, 157. — Le gecko tuberculeux, 158. — Section 3 Geckos à queue plate. Celui à tête plate, 160. Sa description, 162. — Ses couleurs, 163. — Ses habitudes, 164. — Le gecko à queue crétée, 167. — Sa description par Feuillée, 168. — Ses dimensions, 171. — Autre description par Séba, 172. — Le gecko sarroubé de Madagascar, 176. — Tableau méthodique des geckos, *VIII*, 370.

GEDI (le) paragoudou, ou bongare bleu, espèce de serpent du Bengale. Expériences sur sa morsure. *Hist. des Reptiles*, *V*, 78.

GEITJE (le). Observations sur ce reptile du cap de Bonne-Espérance. *Hist. des Reptiles*, *IV*, 385. — Détails donnés par Sparrman, 386.

GELEES. Torts que les gelées du printemps font aux

taillis, VI, 377.—Effets que les grandes gelées d'hiver et les petites du printemps produisent sur les végétaux, VII, 32.—Effets de celles de 1709, 33.—Effets de celles du printemps, 34.—Sur les grandes gelées d'hiver, 37.—Effet qu'elles produisent suivant les différentes expositions, 50.—Observations qui prouvent que l'humidité est la principale cause de ces effets, 56.—Sur celle du printemps de 1736, 62.—Autre cause des désordres que produit la gelée plutôt à certaines expositions qu'à d'autres, 64.—Comment, après de fortes gelées, le soleil, donnant sur les arbres, y produit tant de désordres, 66.—Précautions à prendre pour éviter les funestes effets des gelées, 74.—Suppression des émanations de la chaleur intérieure de la terre par la gelée, 318.

GELINOTTE (la). Espèce de poule. Sa description, XLI, 381 (note).—Différences entre le mâle et la femelle, 383.—Sa nourriture, 386.—Sa chasse, 387.—Fables et erreurs sur la gelinotte, 388.—Sa ponte et éducation des petits, 390.—Elle habite les forêts et les bois, 392.—La gelinotte d'Ecosse, 394.—Le garga, vulgairement la gelinotte des Pyrénées, XLII, 5.—Le kitaviah, ou gelinotte de Barbarie, 16.—L'attagas, 18.—La gelinotte du Canada, 58.—Son plumage, 59.—Lieux qu'elle habite, 60.—Pourquoi elle a des doigts dentelés, *idem* (note).—Description du mâle et de la femelle, 61.—La grosse gelinotte du Canada, ou le coq de bruyère à fraise, 63.—Sa description, 66.—Lieux qu'elle habite, 67.—Ses habitudes, 68.—Gelinotte à longue queue de la baie d'Hudson, 72.—La gelinotte huppée d'Amérique, par Virey, ainsi que les suivantes, 74.—La gelinotte de Laponie, 76.—La gelinotte des Indes, 78.—La gelinotte des Namaquois, 80.—Sa description, 81.—La gelinotte des sables, 82.—Sa description, 83.—La gelinotte à trois doigts, 84.

GELIVURE (la). Défaut que produisent dans les arbres les grandes gelées d'hiver, VII, 38.—Sur celle entre-lardée, espèce de bois mort, 46.

GELSEMIUM. Genre 29 des plantes dites *apocins*. *Histoire des Plantes*, XVI, 197.

GÉNÉRATION. Celle de l'homme et celle des ani-

maux. Exception à cet égard , XVII, 74. — Sur celle de l'homme, 79. — Explication des systèmes sur la génération, et examen de celui de Platon, 101. — Examen de celui d'Aristote, 109. — Développement de ses idées à ce sujet, 115. — Système d'Hippocrate sur le même sujet, 126. — Résultat des observations et expériences de Fabrice d'Aqua Andente sur la génération, 133. — Examen du Traité de la Génération d'Harvey, 136. — Ses idées semblables à celles d'Aristote, 150. — Comparaison de ses expériences sur les œufs, avec celles de Malpighi, 154. — Comparaison de ses expériences sur les biches, avec celles de Graaf sur les lapins, 163. — Stenon a le premier découvert les œufs dans les ovaires, 173. — Examens de l'existence des œufs, 174. — Observations de Malpighi à ce sujet, 177. — Observations de Vallisnieri sur le système des œufs, 181. — Ses idées sur la génération, 192. — Examen comparatif du système des œufs et de celui des vers spermatiques, 213. — Difficultés particulières à ce dernier système, 218. — Difficultés particulières au premier système, 222. — Difficultés proposées par Mery et autres anatomistes, 226. — Expérience fameuse de Nuck en faveur des œufs, 229. — Expériences de Buffon au sujet de la génération, avec MM. Needham, Dalibart et Daubenton, 231. — Première expérience sur les vésicules séminales d'un homme péri de mort violente, dont le cadavre étoit encore chaud, 242. *Voy. au mot Expérience*, la suite des autres. — Variétés dans la génération des animaux, XVIII, 1, 28, 30. — Différences pour la génération entre les animaux qui multiplient beaucoup et ceux qui multiplient moins, 8. — Comment elle a lieu chez les ovipares et chez les vivipares, 13. — De nouvelles productions la précèdent, 15. — Génération dans la plupart des gros animaux, 19. — Temps marqué pour la génération chez presque tous les animaux, à l'exception de l'homme, 21. — Un seul acte épuise les uns, amaigrit les autres, et chez d'autres animaux est fréquent, 22. — Causes de la génération dans les animaux et les végétaux, 22. — Générations spontanées, 24, 39,

40, 57, 64. — Dans certains cas la semence seule d'un individu mâle ou femelle peut produire quelque chose, 133. — A quel âge l'homme peut engendrer, 374. — Comment les vieillards décrépits engendrent, XIX, 28. *Voyez* REPRODUCTION. — Sur la génération spontanée. *Hist. des Mollusques*, I, 97, 111, 113 et 126. — Opinions de différens naturalistes sur la formation des germes, *idem*, II, 26. — Haller a le premier bien développé le problème de la génération, 28. — Dans le produit de la génération le mâle influe plus que la femelle, XXII, 143. — La production nombreuse dépend plutôt de la conformation des parties internes génitales que de toute autre cause, XXIII, 126. — Elle peut aussi dépendre en entier de la surabondance de la nourriture; preuve tirée du cerf, XXIV, 88.

GENÈSE (la). Interprétation de ses premiers versets, III, 195.

GENET ÉPINEUX. *Ulex*. genre 30 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 280. — Deux espèces, 281. — Genêt, *spartium*. genre 34 des mêmes plantes, 284. — 8 espèces, 285. — Leurs propriétés, 286. — Genêt, *genista*. genre 35 des mêmes plantes, 287. — 7 espèces, 288. — Leurs propriétés, 289.

GENETTE (la). Animal d'Espagne, XXV, 30. — Différence de la genette avec la civette, XXVII, 41. — Sa description, 59. — On l'apprivoise assez aisément, 61. — Lieux qu'elle habite, *idem*. — Description d'une genette femelle, vue à Paris en 1772, 63. — Ses dimensions, 65. — Sur la genette du Cap, 66.

GENEVRIERS (les). *Juniperus*. genre 4 de la famille des plantes conifères, 10 espèces. *Hist. des Plantes*, X, 181. — Celui commun, 182. — Son usage et ses propriétés, 184. — Le genévrier oxycèdre, 185. — Celui de Virginie, 186. — Celui des Bermudes, 187. — Celui des Barbades, 188. — Le genévrier sabine, 189. — 4 espèces de France, 190. — 10 espèces connues, 191.

GENIPAYERS (les). genre 50 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 36. — Espèces remarquables. Le genipayer d'Amérique, *idem*. — Le geni-

Tab. TOME I.

D d

payer à feuilles oblongues et celui de Mérian , 37. — 4 espèces connues , 38.

GENISTA. Voy. GENET.

GENRE. Plan des coupes secondaires connues sous la dénomination de *genres* dans l'histoire générale des insectes. *Hist. des Insectes* , III , (avertissement , pag. v.).

GENRE HUMAIN. Voyez HOMME.

GENTIANES (les). *Gentianeæ* , 8^e ordre , famille 60 de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes* , V , 118. — Genre voisin de la famille des gentianes , 124. — Famille 61 , XVI , 145. — § 1. Capsule simple , à une loge. 1^{er} genre , 146. — 18 espèces , 147. — Leurs propriétés , 151. — genre 2 , vohiria. genre 3 , coutoubea. genre 4 , swertia , 152. — genre 5 , chlore , 154. — § 2. Capsule simple , à une loge. genre 6 , exacum. genre 7 , lisianthus , 155. — genre 8 , tachia , 156. — genre 9 , chironie , *idem*. — genre 10 , nigrina , 158. — § 3. Capsule didyme , à deux loges. genre 11 , spigelia , 158. — genre 12 , ophiorrhiza , 160. — genre 13 , potalia , 161.

GEOFFROY (le). Espèce d'étourneau découvert et décrit par Geoffroy de Villeneuve , XLV , 94. — Ce n'est point une pie-grièche , 95. — Couleur de son plumage , décrit par Levaillant , 96.

GEOFFROYA. genre 83 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes* , XVII , 375.

GÉOGRAPHIE de la terre. Sa division , I , 263. — Erreurs à ce sujet , 272.

GÉOLOGIE. Voy. TERRE.

GÉOMÉTRIE. Mesures géométriques , XXI , 201. — Courbes géométriques , 206. — Sur les difficultés des questions de géométrie , 217.

GÉOMÉTRIQUE (le). 12^e espèce du genre des poissons appelés holacanthés. *Histoire des Poissons* , XI , 204 , 215.

GERMANDRÉES (les). *Tucarium*. genre 11 des plantes dites labiées. *Hist. des Plantes* , XV , 289. — 16 espèces de France , 291. — 67 espèces connues , 295.

GERMES PRÉEXISTANS. Il n'y en a point, XVIII, 24, 30. — Opinions des différens naturalistes sur la formation des germes. *Hist. des Mollusques*, II, 26.

GERMINATION (la). Causes qui la déterminent. *Hist. des Plantes*, I, 127. — Influence des différens gaz, et sur-tout du gaz oxygène sur la germination, par Huber et Senebier, 127 (note). — Comment se fait la germination, 132. — Comment les cotylédons y contribuent, 134. — Phénomène observé sur la germination, 138. — Autre sur la direction qu'affectent alors la radicule et la plumule, 139.

GERAINES ou **GERANIUMS** (les), *gerania*. 12^e ordre; Famille XLI de la 4^e classe des plantes dicotylédones. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, V, 423. — Genres voisins de la famille des *geranium*, 426. — Famille 91 des plantes cryptogames, XVIII, 218. — Genre 1^{er}, geraine, *geranium*, 4 espèces et leurs propriétés, 220. — Genre 2, *monzonia*, 221. — Genre 3, capucine, *tropeolum*, *idem*. — Genre 4, balsamine, 224. — Genre 5, alleluia, ou pain de coucou, 226.

GÉORGIE. Ses habitans, XX, 121.

GÉOTRUPE, *geotrupinas*, Famille 15 des genres des insectes. *Hist. des Insectes*, III, 142. — Genre 1^{er}, géotrupe. Genre 2, lethrus, 143. — *Geotrupins* (les), X, 137. — *Géotrupes* (les), 142. — 6 espèces, 144.

GERANDES. Genre 13 des plantes dites personnées. *Hist. des Plantes*, XVI, 14. — 5 espèces *idem*.

GERBO. Voyez **JERBO**.

GERBOISE (la). Sa comparaison avec le tarsier, XXXII, 161. — Nom générique employé pour désigner des animaux remarquables par la très-grande disproportion qu'il y a entre les jambes de derrière et celles de devant. 4 espèces de ce genre : savoir, le tarsier, le gerbo ou gerboise proprement dite, l'alagtaga, le daman, ou agneau d'Israël, 240. — De la gerboise du désert de Barca, 252. — Lièvre sauteur, espèce de gerboise, 253. — Seconde addition sur le daman, 266. — Sur le kangaroo, très-grande gerboise de la nouvelle

Hollande, décrite par le capitaine Cook, 275. — Addition à l'article des gerboises, par Latreille, 292. — Mémoire de Sonnini sur les gerboises, 308. — Lettre critique de M. Berthout Van-Berchem, sur les gerboises, 333. — Réponse de Sonnini, 339. — Extrait d'un mémoire de M. Olivier sur les gerboises, 352.

GERMON. Poisson du genre des scombres, et espèce de thon. Sa description. *Hist. des Poissons*, VII, 319. — Ses nageoires, 322. — Sa conformation intérieure, 324. — Mers où on le rencontre, 325.

GERRIS. Insecte : ex. *Gerris lacustris*. *Hist. des Insectes*, III, 250. — Insectes de l'ordre des hémiptères, de la famille des rameurs, XII, 264. — 3 variétés, 265. — genre 279, leur description, 271. — 4 espèces, 270.

GEROPOGONS (les). genre 24 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 34. — Deux espèces connues, 35.

GESSE, *latyrus*. genre 66 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 347. — 7 espèces, 348. — Leurs propriétés, 350.

GERUMA. genre 4 des plantes azédaracks. *Hist. des Plantes*, XVIII, 242.

GERFAUT (le). Le premier des oiseaux de la fauconnerie, XXXIX, 80. — En quoi il diffère de l'autour, et lieux où il se trouve, 82, 84. — Particularités sur les gerfauts blancs, et anecdote, 83. — Comment on les prend au nord de la Russie, 84 (note). — C'est, après l'aigle, le plus courageux de tous les oiseaux de proie, et commerce qu'on en fait, 85. — Ce qu'en dit Charadin, 85 (note).

GESNÈRES (les). genre 9 des plantes dites campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 216. — 13 espèces connues, 217.

GESTATION. Voyez GROSSESSE.

GETHYLLIS (les). genre 1^{er} de la famille des narcisses. *Hist. des Plantes*, IX, 6. — 5 espèces connues, 7.

GEUM. Voy. BENOITE.

GHANAM (le) 5^e espèce du genre des poissons

appelés *holocentres*. *Histoire des Poissons*, X, 356, 383.

GHÀ-TOITOI (le). Espèce de merle de la baie Dusky, dans la nouvelle Zélande, XLVI, 287.

GHOBBAN (le). Espèce 13 du genre des poissons appelés *scares*. *Hist. des Poissons*, IX, 344 et 362.

GHOTARRÉ (le). Oiseau martin-pêcheur de la nouvelle Zélande, LVI, 222.

GIAROLE (la). 3^e espèce des perdrix de mer, LVIII, 152.

GIBBAR (le). 1^{re} espèce du genre 2 des cétacées, des baleinoptères. Sa synonymie et mers qu'il habite. *Hist. des Cétacées*, 193. — Sa description, 195. — Sa nourriture, 197. — Il a un lard moins épais et une graisse moins abondante que les autres cétacées, 198. — Il est plus difficile à attaquer et à vaincre, 199.

GIBBIE. Insecte du genre des ptiniores; ex. *ptinus scotias*. *Hist. des Insectes*, III, 114. — Genre 56 d'insectes, 3^e espèce de la famille des ptinez, IX, 176.

GIBBON (le). Troisième espèce de singe qui approche le plus de l'homme, XXXV, 8. — L'orang noir, l'orang varié et l'orang gris, ou les gibbons, 168. — Description du gibbon, 197. — Prodigueuse grandeur de ses bras, 198. — Lieux où il se trouve, 199. — Ses caractères distinctifs, 201. — Addition à cet article, par Latreille, et observations anatomiques de Daubenton, 202. — Le petit gibbon, 206. — Le gibbon cendré, ou wouwou, par Camper, 207.

GIBÈLE (le). Espèce 32 du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des poissons*, XIII, 84. — Sa description, 164, 166.

GIBRALTAR. Détroit par lequel l'Océan coule dans la Méditerranée avec une grande rapidité, II, 151.

GIKESIA. Genre 15 des plantes dites portulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 378.

GILLIT (le), ou le gobe-mouche-pie de Cayenne. 15^e espèce des gobe-mouches, L, 99.

GINGEMBRE (le). *Anomum zingiber*. Sa description. *Hist. des Plantes*, IX, 282.

GINGIDIUM. Genre 18 des plantes dites ombellifères. *Hist. des Plantes*, XVI, 279.

GINORIA. Genre 4 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*, XVII, 25.

GIORNA (la). Espèce de raie. *Hist. des Poissons*, XIII, 271.

GIP-GIP (le). 3^e espèce moyenne des oiseaux marins-pêcheurs du nouveau continent, LVI, 280.

GIRAFFE (la). ou le camelo-pardalis. Très-gros animal d'Afrique, XXV, 4. — Sa description, XXXII, 5. — Sa marche, 7, 50. — Ce que dit de la giraffe Levaillant, 7 (note). — Ce qu'en dit Oppian, 8. — Héliodore, 9. — Strabon, 10. — Belon, *idem*. — Gilius, 12. — Si les cornes de la giraffe tombent, 13, 29. Autre description, 17, 19. — De quel animal la giraffe approche le plus, 21, 40. — Ses cornes, 21. — Leur figure, 25. — Ce qu'en dit Allamand, 26, 33, 46. — Description et dimensions d'une giraffe, 30, 38, 54. — Addition à cet article par MM. Allamand et Schneider, 32. — Détails sur les habitudes de la giraffe et sa conformation, 42. — Sur sa peau et ses autres parties, 45. — Son squelette, *idem*. — Autres observations de M. Sonnini sur la giraffe, 50.

GIRAUMONS (les). Espèce de courges. *Hist. des Plantes*, XIV, 283.

GIRELLE (la). 70^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Histoire des Poissons*, IX, 135 et 242.

GIROFLÉE. Genre 7 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 37. — 6 espèces, 38. Leurs usages et leurs propriétés, 39.

GIROFLIER. Genre 9 des plantes dites myrtés. *Hist. des Plantes*, XVII, 65.

GIROLE (la). Espèce d'alouette décrite par Aldrovande, L, 330.

GLACES. Le seul exemple d'une mer totalement glacée est celui de la mer noire, I, 292. — Glaces

fournies à la mer par les fleuves du nord, II, 110. — Mers où il y a le plus de glaces au nord de l'Amérique, 113. — Glaces de la nouvelle Zemble, 114. — Montagnes de glace flottante dans les mers voisines du Groënland, 171. — Etendue immense de glace qu'on trouve au dessus des Alpes, dans une longueur de plus de soixante lieues sur vingt et trente de largeur, III, 438. — Sur celles de la région du pôle, 439. — Remarques de plusieurs observateurs sur le même sujet, IV, 135.

GLACES DE MIROIR. Nature de celles nécessaires pour des miroirs ardents, V, 319. — Explication des figures qui représentent le fourneau dans lequel ont été courbées les glaces servant à la composition des différents miroirs ardents, 441.

GLACIAL (le). 9^e espèce du genre des poissons appelés *pleuronectes*. Sa patrie. *Histoire des Poissons*, XI, 326.

GLACIÈRES. Voyez MONTAGNES DE GLACES.

GLADIATEURS (les). 4^e espèce du genre *q* des cétacées appelés *dauphins*. Ce sont les plus grands ennemis des baleines, *Histoire des Cétacées*, 128. — Comment ils les attaquent, 129. — Leur synonymie, 418. — Leurs armes, *idem*. — Leur description, 419, 422. — Ils attaquent par troupes la baleine, 421. — Mers où on les trouve, 422.

GLAISE. Expériences faites sur la chaleur des corps avec des globes de glaise, IV, 405. — Fouilles faites à Montbard pour reconnoître les dépôts successifs et les différentes couches de glaise, VIII, 110. — Son endurcissement au feu, 127. — Sa formation, 128. — Productions hétérogènes qui s'y forment, 130. — Différence entre les couches de glaise, 134 (note).

GLANDES CONGLOMÈRES. Réflexions à leur sujet. *Hist. des Insectes*, II, 21.

GLANDES (les) des plantes. *Hist. des Plantes*, I, 77, 287. — Leurs différents noms et genres, 288. — Ce que c'est que ces glandes, II, 41. — Leurs différentes espèces, 150.

GLANÉE. Nom donné à une chasse des canards, LXI, 316 (note).

GLANIS (le). 1^{re} espèce du genre des poissons appelés *silures*. *Hist. des Poissons*, XII, 5, etq. — Sa description, 10. — Lieux qu'il habite, 12. — Son accroissement, 13. — Sa marche, 14. — Ses habitudes, *idem*. — Force de ses membres, 15. — Le glanis femelle, 16. — Ses parties internes, 17. — Comment on peut le naturaliser, 18.

GLAPHYRE. Insecte du genre des scarabéides; ex. *Melolontha serratulæ*. *Histoire des Insectes*, III, 150. — Genre 114 d'insectes, 8^e espèce de la famille 16, les scarabéides, X, 205.

GLAUCIENNE. Genre 4 des plantes papavéracées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 12.

GLAUCOPE (le), par Sonnini. Oiseau de la nouvelle Zélande de l'espèce du martin, XLVI, 353.

GLAUX ou **GLOUX**. Genre 14 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*, XVII, 33.

GLAYCÆ (le). Poisson du genre des centronotes. *Hist. des Poissons*, VIII, 403.

GLAYEULS (les). genre 10 de la famille des iris. *Hist. des Plantes*, IX, 120. — Une espèce de France, 51 espèces connues, 122. — Six autres qui ont rapport aux glayeuls, 128.

GLECHOMA. Voyez les **TERRETTES**.

GLEDISTIA. Voy. **FÉVIER** d'Amérique.

GLINOLE. genre 5 des plantes dites ficoïdes. *Hist. des Plantes*, XVI, 382. — 2 espèces, 383.

GLOBBÈES (les). genre 3 des plantes dites balisiers. Espèce remarquable. La globbée à épi penché. *Hist. des Plantes*, IX, 278. — 4 espèces connues, 279.

GLOBE de la terre. Voyez **TERRE**.

GLOBULAIRES (les). genre 21 des plantes dites lysimachies. *Hist. des Plantes*, XIV, 394. — 5 espèces de France, 396. — 10 espèces connues, 398.

GLOMERIS. genre 1^{er} des insectes appelés chilognathes. Leur description. *Hist. des Insectes*, VII, 63. — 7 espèces : savoir 1^o Celui ovale, 64. — 2^o Celui testacé. 3^o Celui plombé. 4^o Celui pustulé, 65. — 5^o Celui marginé. 6^o Celui bordé. 7^o Celui marbré, 66.

GLOSSOPETRE. Nom donné aux dents de requin

pétrifiées, XIII, 337. — Opinions à leur sujet, et lieux où on les trouve. *Hist. des Poissons*, III, 393 (note).

GLAUPICHI (les) de Steller. Oiseaux de mer, LXIV, 124.

GLOUT (la). Espèce de poule d'eau, LIX, 190.

GLOUTON (le). Quadrupède mal à propos confondu avec l'hyène, XXVII, 7. — Ses différences, 14. — Il est l'ennemi du renne, et comment il l'attaque, XXX, 127. — Sa description et lieux qu'il habite, XXXIII, 203. — Sa fourrure, 206. — Ses habitudes, 210. — Sa voracité, 211. — L'isatis lui sert de pourvoyeur, 215. — Description du glouton, amené à Paris, 218. — Autre description, 220.

GLOUX. Voyez GLAUX.

GLOXINIE (la) tachée. Genre 10 des plantes dites campanulacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 219. — Une espèce connue, 220.

GLUCINE (la). Espèce de terre, XVI, 240.

GLUME (la). Ce que c'est dans les fleurs. *Hist. des Plantes*, II, 193; et VII, 86.

GLUTTIERS (les). *Sapium*. genre 30 de la famille des euphorbes. Arbres exotiques. *Hist. des Plantes*, X, 37. — Espèces remarquables. Le gluttier des oiseaux, 38. — Le gluttier à suif, et le produit qu'il donne, 39, 40. — 5 espèces connues, 41.

GLYCIMÈRES (les). genre 162 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 427. — 2 espèces, 428.

GLYCINE. genre 54 des plantes dites légumineuses. *Hist. des Plantes*, XVII, 328.

GLYCYRRHIZA. Voyez RÉGLISSE.

GLYPHISODON. Poisson du 3^{me} ordre de la première division des osseux. *Hist. des Poissons*, X, 151. — genre 136 de poissons. 1^{re} espèce, le moucharra, XI, 220, 221. — 2^e espèce, le kakaisel, 220, 223.

GMELINE (la) d'Asie. genre 10 des plantes dites gatiliers. *Hist. des Plantes*, XV, 215. — Une espèce connue, 216.

GNAPHALES (les) ou immortelles. genre 84 des

plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 242. — Leur description, 243. — La gnaphale globuleuse, et celle en arbre, 244. — Celle d'Orient et celle citrine, 245. — Celle fétide, 246. — Celle des jardins, ou l'immortelle d'Amérique, et celle pied-de-chat, 247. — Celle germanique, et 17 espèces de France, 248. — 147 espèces connues, 253.

GNAVELLE ou KNOVEL, *scleranthus*. genre 10 des plantes dites portulacées. *Hist. des Plantes*, XVI, 373. 3 espèces et leurs propriétés, 374.

GNET (le) des Indes. genre 28 de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, X, 159. — Une espèce connue, 161.

GNIDIENNES (les). genre 10 de la famille des arbrustes thymelées. *Hist. des Plantes*, XI, 186. — Celle simple, 187. — 13 espèces connues, 188.

GNOU (le) ou NIou, animal du Cap. XXXI, 75. — Espèce de bœuf. Ce qu'en dit M. Forster, 78. — Observations de M. Allamand, 85. — Autres voyageurs qui ont parlé de cet animal, 88.

GOA. Habitans de cette ville, XX, 186.

Gobe-mouches. Oiseaux qui se nourrissent de mouches, de moucherons et d'autres insectes volans, sans toucher ni aux fruits, ni aux graines, ni à la viande, L, 50. — Leurs espèces: on les appelle aussi mouche-rolles et tyrans. *Voy. ces mots*, *idem*. — Leurs caractères, leurs habitudes, leur patrie, 51. — On distingue trois classes de ces oiseaux muscivores, savoir: 1^o les gobe-mouches proprement dits; 2^o les mouche-rolles; 3^o les tyrans, 53. — Le gobe-mouche proprement dit. 1^{ere} espèce, celui d'Europe, 54. — Sa description, 55. — Lieux qu'il habite; son nid, 56. — Sa nourriture, son arrivée en France; les froids lui sont funestes, 57. — Pourquoi on l'a appelé *sylvia pestilentialis*, 58. — Gobe-mouche noir, ou collier à gobe-mouche de Lorraine, 2^e espèce, 59. — L'oiseau mâle paroît porter quatre habits différens, suivant les différentes saisons, 61. — Ce que dit à ce sujet M. Lottinger, 63. — Ses rapports avec le traquet d'Angleterre, 62 (note). En quel tems il arrive en Lorraine, et lieux qu'il habite, 64. — Sa nourriture, son chant, etc., 65. — Description d'un

gobe-mouche à collier trouvé en Bourgogne, 66. — Le gobe-mouche à collier du Cap est le même que celui de Lorraine, 68. — Le gobe-mouche de l'île de France, 3^e espèce, 70. — Le gobe-mouche à bandeau blanc du Sénégal, 4^e espèce, 72. — Leur description, 73. — Le gobe-mouche huppé de Sénégal, 5^e espèce, et celui huppé de l'île de Bourbon, 75. — Deux autres gobe-mouches de la même île 76, (note). — Différences et ressemblances entre les deux premiers, 77. — Le gobe-mouche à gorge brune du Sénégal, 6^e espèce, 79. — Le petit azur, gobe-mouche bleu, des îles Philippines, 7^e espèce, 81. — Le barbichon de Cayenne, 8^e espèce de gobe-mouche, 83. — Le globe-mouche brun de Cayenne, 9^e espèce, 86. — Le gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne, 10^e espèce, 88. — Le gobe-mouche citrin de la Louisiane, 11^e espèce, 90. — Le gobe-mouche olive de la Caroline et de la Jamaïque, 12^e espèce, 92. — Sa description, 93. — Le gobe-mouche huppé de la Martinique, 13^e espèce, 95. — Le gobe-mouche noirâtre de la Caroline, 14^e espèce, 97. — Le gillit ou gobe-mouche pie de Cayenne, 15^e espèce, 99. — Le gobe-mouche brun de la Caroline, 16^e espèce, 101. — Le gobe-mouche olive de Cayenne, 17^e espèce, 103. — Le gobe-mouche tacheté de Cayenne, 18^e espèce, 105. — Le petit noir-aurore, gobe-mouche d'Amérique, 19^e espèce, 107. — Sa description, 108. — Le rubin ou gobe-mouche rouge huppé, de la rivière des Amazones. 20^e espèce: c'est la plus brillante de toutes, 110. — Le gobe-mouche roux de Cayenne, 21^e espèce, 112. — Le gobe-mouche à ventre jaune, 22^e espèce, 115. — Différences et ressemblances de celui de Cayenne et de celui de Saint-Domingue, 116. — Le roi des gobe-mouches. Pourquoi on l'appelle ainsi, 23 espèce, 118. — Sa description et sa forme singulière, 119. — Les gobe-mouchérons, 24 et 25^e espèces, 120. — Leur description, 121. — Réflexions sur le bien que procurent tous ces petits oiseaux chasseurs, 122. — Le gobe-mouche à front blanc, par Virey, 125. — Le gobe-mouche à front jaune, 127. — Le gobe-mouche à front noir, 129. — Le gobe-mouche blanc-noir, et le pleschanka, 131. — Le gobe-mouche à queue blanche

134. — Le gobe-mouche de Pondichéry, 136. — Le vira-ombé de Madagascar, 138. — Le gobe-mouche tec-tec de l'île de Bourbon, 140. — Le gobe-mouche orangé et noir des Indes orientales, décrit par Forster, 142. — Le gobe-mouche noir des îles de la mer du Sud, 144. — Le gobe-mouche noir à crête, de Ceilan et de Java, 145. — Le petit goyavier de l'île de Manille, 147. — Le gobe-mouche noir et jaune de Ceilan, 149. — Le gobe-mouche verd luisant des Indes orientales, 151. — Le gobe-mouche brillant de la Chine, 152. — Le gobe-mouche de la nouvelle Ecosse, 153. — Le gobe-mouche verdâtre de la Chine, 154. — Le gobe-mouche gris de la Chine, 156. — Le gobe-mouche à tête bleuâtre de l'île de Luçon, 157. — Le gobe-mouche à gorge jaune des îles Philippines, 158. — Le gobe-mouche ferrugineux de la Caroline, 159. — Le gobe-mouche musicien, oiseau de la Daourie, région de la Tartarie orientale, 161. — Le gobe-mouche du Kamschatka et des bords du Jenisei, 163. — Le gobe-mouche fauve de Cayenne, 165. — Le gobe-mouche strié de l'Amérique septentrionale, 167. — Le gobe-mouche à ventre rouge de la mer du Sud, 169. — Les gobe-mouches bruns des îles Sandwich, 3 espèces, 171. — Le gobe-mouche olivâtre de New-Yorck, 174. — Le gobe-mouche jaunâtre de New-Yorck, 176. — Le gobe-mouche gris-vert de New-Yorck, 177. — Gobe-mouche moineau de l'île de Tanna, 178. — Gobe-mouche bicolor, 179. — Gobe-mouche à longue queue de Java, 180. — Gobe-mouche blanc de Danemarck, 181. — Le gobe-mouche de Cambaye, 182. Toutes ces espèces de gobe-mouches, depuis celui à front blanc de la page 123, sont décrits par Virey. Oiseaux qui ont rapport aux gobe-mouches. Le kinki-manou de Madagascar, 245. — Le preneur de mouches rouge, 248. — Sa description, 249. — Le drongo, 251. — Le piauhau, 254. — La lavandière et les bergerettes ou bergeronnettes sont des oiseaux, véritables gobe-mouches. LI, 339. Voyez ces mots.

GOBIES (les). genre 55 des poissons osseux. Les deux nageoires thoraciques réunies l'une à l'autre : deux na-

gépères dorsales. 1^{er} sous-genre ; des nageoires pectorales attachées immédiatement au corps de l'animal, 21 espèces. *Hist. des Poissons*, VII, 191. — 2^e sous-genre ; chacune des nageoires pectorales attachée à une prolongation charnue, 196. — 1^{re} espèce, le peigne, le gobie pectinirostre. Sa synonymie, 197. — Habitudes des gobies, 198. — Description de la 1^{re} espèce, 201. — 2^e espèce. Le gobie boddaert. Sa synonymie, 202. — Sa description, 203. — La lancette ou le gobie lancéolé, 3^e espèce, sa synonymie, 205. — Sa description, 206. — Le gobie aphyé, 4^e espèce ; sa synonymie, 208. — Sa description, 209. — Le gobie paganel, celui ensanglanté et celui noir-brun. Leur synonymie et leur description, 311. — Le gobie boulerot, 8^e espèce. Sa synonymie et sa description, 217. — Autre description faite en Grèce, 220 (note). — Le gobie bosc, 9^e espèce. Sa description, 225. — Le gobie arabique et le gobie jozo, 10^e et 11^e espèces. Leur synonymie et leur description, 227. — Le gobie bleu, 12^e espèce. Sa description, 232. — Le gobie plumier, 13^e espèce. Sa description, 234. — Le gobie électre, et celui nébuleux, 14 et 15^e espèces. Leur synonymie et leur description, 236. — Le gobie awaou, 16^e espèce. Sa synonymie et sa description, 239. — Le gobie noir, 17^e espèce. Sa description, 242. — Le gobie lagocéphale, le gobie menu, et le gobie cyprinoïde, 18, 19 et 20^e espèces. Leur description, 243. — Le gobie schlosser, 21^e espèce. Sa description, 250. — Supplément à leur tableau générique. 1^{er} sous-genre, les nageoires pectorales attachées immédiatement au corps de l'animal, 14^e espèce, le gobie Thunberg. *Hist. des Poissons*, XIII, 285. — Sa description, 286.

GOBIESOCES (les). Genre 59 des poissons osseux. Les deux nageoires thoraciques non réunies, l'une à l'autre, une seule nageoire dorsale, très-courte et placée au dessus de l'extrémité de la queue, très-près de la nageoire caudale, la tête très-grosse et plus large que le corps. *Hist. des Poissons*, VII, 279. — Le gobiesoce testar, 280. — Sa description, 281.

GOBIOIDES (les). Genre 56 des poissons osseux. Les

deux nageoires thoracines réunies. Une seule nageoire dorsale ; la tête petite ; les opercules attachés dans une grande partie de leur contour, 4 espèces. *Hist. des Poissons*, VII, 254. — Le gobiode anguilliforme, 1^{re} espèce. Sa description, 256. — Le gobiode smyrneen, 2^e espèce, 258. — Le gobiode broussonnet, 3^e espèce, 259. — Le gobiode queue noire, 4^e espèce, 261.

Gobiomores (les). Genre 57 des poissons osseux ; les deux nageoires thoracines non réunies ; deux nageoires dorsales ; la tête petite, les yeux rapprochés ; les opercules attachées dans une grande partie de leur contour. 1^{er} sous-genre : les nageoires pectorales immédiatement attachées au corps de l'animal, 3 espèces. *Hist. des Poissons*, VII, 262. — 2^e sous-genre, chacune des nageoires pectorales attachée à une prolongation charnue, une espèce, 263. — Le gobiomore gronovien, 1^{re} espèce, 264. — En quoi les gobiomores diffèrent des gobies et des gobioides, 265. — Description du gobiomore gronovien, 266. — Le gobiomore taibou, 2^e espèce, 268. — Ses couleurs, 270. — Le gobiomore dormeur, 3^e espèce, 271. — Le gobiomore koelreuter, 4^e espèce, 272. — Sa description, 273.

Gobiomoroides (les). Genre 58 des poissons osseux. Les deux nageoires thoracines non réunies ; une seule nageoire dorsale, la tête petite, les yeux rapprochés, les opercules attachés dans une grande partie de leur contour. Une seule espèce, 275. — Le gobiomoroïde pison, 276. — Sa description, 277.

GOËLANDS (les) et les mouettes. Discussion littéraire relative à ces deux noms. Voyez *MOUETTES*, LV, 206. — Caractères généraux et habitudes communes à ces deux genres d'oiseaux, 210. — Leur nourriture, 211. — Nature de leur bec et leur description, 212. — Lieux qu'ils habitent, 214. — Leur conduite dans la vie domestique, 220. — Le goëland à manteau noir, 1^{re} espèce, 224. — Son cri, 226. — Le goëland à manteau gris, 2^e espèce, 227. — Le goëland brun, 3^e espèce, 230. — Lieux où il se trouve, 232. — Nom que lui ont donné les anglais, 234, 235. — Le goëland varié

GÉNÉRALE.

431

ou le grisard, 4^e espèce, 237. — Ses habitudes, 239. — Sa domesticité, 240 (note). — Le goéland à manteau gris brun, ou le bourguemestre, 5^e espèce, 246. — D'où lui vient ce dernier nom, 248. — Le goéland à manteau gris et blanc, 6^e espèce, 252. — Le goéland à bec varié, par Sonnini, 285.

GOËLLETES. Nom que les marins donnent aux hirondelles de mer, lorsqu'elles sont petites, LX, 81 (note).

GOERTAN (le), ou PIC VERD. Oiseau du Sénégal, LV, 259.

GOÏTRE. Tumeur comprimée et pendante sous la gorge des reptiles appelés *iguanes*. *Hist. des Reptiles*, III, 259, 267.

GOÏTREUX (le) d'Amérique, ou le lézard verd à points rouges. *Histoire des Reptiles*, III, 119. — Sa description, IV, 77.

GOLEIAN (le). 33^e espèce du genre des poissons appelés *cyprins*. *Hist. des Poissons*, XIII, 85. — Sa description, 164, 167.

GOLFE. Celui qui est formé en France sur ses côtes occidentales, et qu'on appelle *le golfe de Biscaye*, II, 119. — La mer d'Allemagne est un grand golfe formé par l'Océan, 120. — Le golfe Linchidolin formé par l'Océan, 128. — Le golfe de Bengale, 138. — Le golfe Persique, 139, 140.

GOLÓ-BROU (le). Espèce de merle de la nouvelle Zélande, XLVI, 271.

GOMART, *bursera*. Genre 19 des plantes dites térébintacées. *Hist. des Plantes*, XVII, 192.

GOMME (la). Celle des végétaux. *Hist. des Plantes*, I, 107. — Ce qu'elle produit, 108. — Gommés-résines, 111.

GOMME-DE-LIERRE. *Histoire des Plantes*, XIV, 174.

GOMOSIE (la) d'Amérique. Genre 25 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XII, 383. — Une espèce connue, 384.

GOMPHOSÉS (les). Genre 68 des poissons osseux.

Leurs caractères distinctifs. *Hist. des Poissons*, VIII, 108. — 2 espèces : 1^{re} le gomphose bleu. Sa description, 109. 110. — 2^e Le gomphose varié, sur les bords de l'île de Taïti, 113.

GONAMBOUCH (le). Oiseau de Surinam, de l'espèce des bruants, XLIX, 98. — Sur le même, LIII, 255 (note).

GONOLEK (le). Espèce de pie-grièche rouge du Sénégal, XXXIX, 379.

GONORHYNQUE (le). Espèce 40 du genre des poissons appelés cyprins. *Hist. des Poissons*, XIII, 86. — Sa description, 173.

GONYPES (les). Genre 489 d'insectes de la famille des asiliques. *Histoire des Insectes*, XIV, 309.

GONZALAGUNIES (les). Genre 30 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIII, 390. — 10 espèces connues, 391.

GOODENIES (les). Genre 14 des plantes dites campanulacées. *Histoire des Plantes*, XIV, 223. — 10 espèces, 224.

GORAMY (le). 1^{re} espèce de la classe des poissons osphronèmes. Sa description. *Hist. des Poissons*, VIII, 128. — Sa conformation, 130.

GORDONIA. Genre 24 des plantes malvacées ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 203.

GORGE (la) blanche de Willugby, oiseau de l'espèce des mésanges, LII, 241. — Sa description, 243.

GORGE-BLEUE (la). Oiseau. En quoi il diffère du rouge-gorge, LI, 235. — Ses habitudes, 238. — Lieux qu'il habite, 241.

GORGE-NUE (le). Espèce de perdrix rouge. Sa description, XLIII, 41.

GORTÈRES (les). Genre 116 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XII, 418. — 7 espèces connues, 419.

GORYTES (les). Genre 390 d'insectes de la famille des nyssoniens. *Hist. des Insectes*, XIII, 308.

GOSCHIS. Espèce de chiens de St-Domingue, XXV, 25.

GOSYPIUM

GOSSTIUM. Voy. Coton.

GOUAN (le). 45^e espèce du genre des poissons appelés labres. *Hist. des Poissons*, IX, 126, 209.

GOUANIA. Genre 25 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 239.

GOUARONA (le). Oiseau. 5^e espèce des courlis du nouveau continent. LVIII, 266.

GOUDRON (le), ou *brai liquide*, produit du bois de pin. *Hist. des Plantes*, X, 220. — Sa consommation et son usage en médecine, 221.

GOUETS, *Arum*, *aroidæ*. Famille 13 des plantes monocotylédones proprement dites. Leur description et leurs différentes espèces. *Hist. des Plantes*, IV, 111.

§ 1. Spadice enveloppé dans une spathe, *amrobëinia*, *zostera*, *arum*, *caladium*, *callaydracontium*, *lagena*, *houttuyania*. § 2. spadice sans spathe, 116. — *Orantium*, *acorus*, genres qui ont des rapports avec la famille des gouets, 117. — *Saururus*, *aponogeton*, *urirandra*, *potamogeton*, *hydrogeton*. Genre 3 des plantes dites aroides, VII, 408. — Espèces remarquables. La serpentinaire, le dragon commun, 410. — Le gouet-nain, et le pied de veau, 412. — Le gouet d'Italie, 415. — Le gouet mucroné, 416. — Le gouet ombiliqué ou la colocasce, 417. Le gouet gobe-mouche, 418. — Le gouet à feuilles de scorzonere, 419. — Le gouet hédéracé, 420. — 4 espèces de France, 421. — 25 espèces connues, 422.

GOUFFRE Ce que c'est, II, 325 et 327. — gouffre tournoyant; ce que c'est. *Histoire des Mollusques*, II, 336 (note).

GOUJON ARABE (le). 10^e espèce des poissons dits gobies. *Hist. des Poissons*, VII, 227. Voyez GOBIES. — 9^e espèce du genre des poissons appelés cyprins, XIII, 78. — Lieux où on le trouve, 128. — Sa nomenclature, *idem*. — Comment il dépose ses œufs, 130. — Sa description, 132.

GOULET. Nom que l'on donne à une entrée intérieure de certains filets qui servent à la pêche, tels que le verveux. *Hist. des Poissons*, II, 420.

GOULIN (le). Oiseau des Philippines, XLVI, 320. Sa description, par Brisson, *idem*. (note.)

Tab. Tome I.

E e

GOURGE (la), ou gourde des pèlerins. *Hist. des Plantes*, XIV, 279.

GOUPI. genre 6 des plantes dites nerpruns. *Hist. des Plantes*, XVII, 217.

GOUT (le). Son siège, XX, 37. — Sa différence avec l'odorat, 38.

GOUTTES D'ANGLETERRE. C'est une composition médicinale, opérée par la dilatation de la soie. *Hist. des Insectes*, XIV, 154.

GOYAVIER (le petit), de l'île de Manille. Espèce de gobe-mouche, décrit par Virey, L, 147.

GOYAVIER. *Psidium*. genre 6 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, XVII, 60.

GRAINE (la). Ce que c'est dans les plantes. *Hist. des Plantes*, I, 47. — Organisation interne et externe des graines dans les plantes monocotylédones et dicotylédones : 1^o dans celles-ci, 118. — Le testa, 1^{ere} enveloppe de la graine, 119. — Situation de la plantule dans la graine, 122. — 2^o Dans les plantes monocotylédones, *idem*. — De la germination, *Voyez* ce mot. — D'où dépend la conservation de la graine, 130. — Temps que certaines graines mettent à lever, 132. — Développement de la graine dans le fruit, II, 66. — Des moyens employés par la Nature pour disséminer les graines sur la terre et en avancer le développement, 79. — Leur nombre est un des premiers obstacles à la destruction des races, 81. — Des graines nautiques ; leurs différences avec celles aériennes, 83. — Comment les animaux contribuent à la dissémination des graines, 84. — Résultats de la dissémination des graines par les vents, les eaux, et les animaux, 87. — Vocabulaire méthodique pour les graines, 109. — La graine considérée comme partie du fruit, 230. — Graine d'orge, 379. — Comment la graine contient des petits êtres organisés. *Histoire des Animaux*, XVII, 37. — Multiplication des graines, 53.

GRAINE A TATOU de la Guiane. *Hist. des Plantes*, XIV, 105.

GRAIS. Nom qu'on donne, en vénerie, aux défenses que le sanglier porte à la mâchoire supérieure, XXIII, 153.

GRAISSE du cochon, XXIII, 128.

GRAISSE d'ours, XXVI, 70.

GRALLES (les). Oiseaux de rivage; leur nid, leur ponte et leurs œufs, LX, 355.

GRAMINÉES (les), *gramineæ*. Leur anatomie. *Hist. des Plantes*, II, 377. — Famille 11 des plantes monocotylédones proprement dites; leur description et leurs différentes espèces, IV, 80; VII, 83. — Dans quel tems elles sont dites en fleurs, 85. — Les céréales, 91. — Manière de les cultiver, 92. — § 1. Deux styles, une étamine. genre 1^{er}, le cinna en roseau, 102. — genre 2, le jarava-ichu, 103. — § 2. Deux styles, deux étamines. genre 3, les erianthes, 104. — genre 4, les flouves, 105. — genre 5, les crypsis, 107. — § 3. Deux styles, trois étamines. Glume uniflore, fleurs hermaphrodites. genre 6, le lappago à grappe, 109. — genre 7, la mühlenbergie diffuse, 110. — genre 8, les aristides, *aristida*, 111. — genre 9, les vulpins, 114. — genre 10, le polypogon de Montpellier, 117. — genre 11, les fléoles, 118. — genre 12, les alpistes, 121. — genre 13, les leersites, 126. — genre 14, les dilépyres, 127. — genre 15, la trichodie à fleurs lâches, 128. — genre 16, les paspalons, 129. — genre 17, les digitaires, 131. — genre 18, les panics; panis ou millets, 134. — genre 19, les mils, 152. — genre 20, les agrostis, 155. — genre 21, le lagurier ovale, 166. — genre 22, les stipes, 167. — genre 23, la stégosie de Cochinchine, 171. — genre 24, les cannes, 172. — genre 25, l'oryzopside à feuilles rudes, 187. — genre 26, les calamagrostis, 188. — genre 27, les ptérotides, 190. — genre 28, les trachinoties, 191. — § 4, deux styles, trois étamines, glume uniflore et fleurs polygames. genre 29, les houques ou sorgho, 193. — genre 30, les andropogons ou barbons, 201. — genre 31, la cymbachnée ciliée, 210. — genre 32, le raphis commun, 211. — genre 33, les manisures, 212. — § 5, deux styles, trois étamines, glume à deux ou trois fleurs, fleurs polygames. genre 34, les anthistéries, 213. — genre 35, le spinier, 216. — genre 36, les chloris, 218. — genre 37, le pappo-

E e 2

phore vulpin, 220. genre 38, les ischèmes, 221. — genre 39, le séhima ischémoïde, 223. — genre 40, les tripsaques, 224. — genre 41, les racles, 226. — genre 42, les égilopes, 228. — genre 43, le colladoa à deux épis, 231. — genre 44, la torrésie, 233. — genre 45, les rottboellies, 234. — § 6, deux styles, trois étamines, glumes à deux ou trois fleurs hermaphrodites. genre 46, l'échinaire capitée, 237. — genre 47, les canches, 239. — genre 48, la trisettaire digyne, 243. — genre 49, les méliques, 244. — genre 50, le tétrapogon velu, 247. — § 7, deux styles, trois étamines, glumes assemblés en groupe, et contenant chacune plusieurs fleurs. genre 51, les dactyliers, 249. — § 8, deux styles, trois étamines, glumes contenant plusieurs fleurs relevées en épis serrés sur un axe commun, un seul épi le plus souvent. genre 52, la seslerie bleue, 252. — genre 53, les cretelles, 254. — genre 54, les ivraies, 260. — genre 55, les élymes, 264. — genre 56, les orges, 267. — genre 57, les fromens, 275. — genre 58, les seigles, 292. — § 9, deux styles, trois étamines, glumes lâches contenant plusieurs fleurs, fleurs en panicule. genre 59, les bromes, 296. — genre 60, les festuques, 304. — genre 61, les pâturius, 313. — genre 62, les unioles, 322. — genre 63, les brizes ou amourettes, 342. — genre 64, les avoines, 327. — genre 65, les roseaux, 340. — § 10, deux styles, six étamines ou davantage. genre 66, le riz, 344. — genre 67, les ehrharties, 354. — genre 68, les zizanes, 354. — genre 69, la luziole de Pachacama, 355. — genre 70, la diaphora de Cochinchine, 357. — § 11, un style à un seul stigmate, trois étamines. genre 71, les nards, 359. — genre 72, l'alvarde, ou sparthe, 361. — genre 73, les apludes, 363. — genre 74, le maïs, 364. — § 12, un style, stigmate divisé, trois étamines. genre 75, les olyres, 370. — genre 76, les larmiers, 372. — genre 77, les coqueluchioles, 374. — genre 78, la pommerrenelle, corne d'abondance, 375. — genre 79, la spartine de Schreber, 377. — genre 80, la remirée maritime, 378. — § 13, un style, plusieurs stigmates, six étamines ou davantage. genre 81, les phares, 379. — genre 82,

les bambous, 382. — genre 83, la pariane d'Aublet, 390.

GRANATITE (la). Espèce de pierre, XVI, 287.

GRAND DUC (le), ou le hibou. Son nid, sa ponte et ses œufs, LX, 340. *Voy. HIBOU.*

GRANDEUR DU CORPS. *Voyez ACCROISSEMENT.*

GRAND-ŒIL (le) 33^e espèce du genre des poissons appelés *spares*. *Hist. des Poissons*, IX, 385; et X, 85.

GRANGÉES (les). genre 134 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 54 — 4 espèces connues, 55.

GRANGERIA. genre 38 des plantes dites rosacées, *Hist. des Plantes*, XVII, 141.

GRANIT. Sa composition, VIII, 30. — Où il se forme, 35. — Montagnes purement graniteuses, 38. — Groupes qu'il forme, 40. — Ses variations, 44. — Sommet des montagnes graniteuses, 46, 52. — Bloc de granit de la statue de Pierre I^{er}, 50. — Sa matière se détruit à la longue, 59. — granits décomposés, 61. — granits secondaires, 67, 70. — Granit produit par des feux volcaniques, IX, 326. — Roche particulière de granit, XI, 401. — Ce que c'est que le granit, XVI, 311. Origine des granits. *Hist. des Mollusques*, I, 82.

GRANITOÏDE. Espèce de pierre, XVI, 314.

GRAPHIPTÈRES (les). Insectes particuliers : ex. *carabus variegatus*, *trilineatus*. *Hist. des Insectes*, III, 83. — genre 11 d'insectes; leur description, VIII, 236. — Leurs habitudes, 237. — Espèces : 1^o Celui cindeloïde; 2^o celui moucheté, 238. — 3^o Celui trilineé; 4^o celui effacé; 5^o celui bombardier, 239. — Son moyen singulier de défense, *idem*. — Comment on l'explique, 241.

GRAPHIPTÉRIDES (les). Insectes particuliers. Leur description, VIII, 228. — Lieux où on les trouve, 229.

GRAPPE (la). Ce que c'est dans les fleurs. *Hist. des Plantes*, II, 198.

GRAPSE. Insecte du genre des vigilans : ex. *cancer ruricola*. *Hist. des Insectes*, III, 24. — genre 9 des crabes, dont cependant les grapses diffèrent, VI, 56. — Leurs habitudes, 57. — Le grapse cendré, 58. — Habitudes des crabes peints des Antilles françaises, 59,

366. — Leurs voyages, 61. — Leur changement de peau, 64. — Comment on les apprête pour les manger, 65. — Espèces européennes : 1^o Celui aplati, 66. — 2^o Celui mélangé, 67. — 3^o Celui nain, 68. — Grapes exotiques; celui peint, 69, 336, 337. — Celui ensanglanté et celui rayé, 70. — Celui bigarré, celui écrit et celui tétragone, 71. — Celui cendré, 72. — Celui squameux, espèce dont la patrie est inconnue, 73. — Espèce de grapse dont parle Pernetty, 337.

GRASDEAU (le). 4^e espèce du genre des poissons appelés *athérines*. *Histoire des Poissons*, XII, 369, 375.

GRASSETES (les) *Pinguicula*. genre 27 des plantes dites lysimachies. *Hist. des Plantes*, XIV, 408. — Quatre espèces de France, 409. — Douze espèces connues, 410.

GRATERON (le). Plante du genre des gaillets. *Hist. des Plantes*, XIII, 335.

GRATGALS (les) *Randia*. genre 35 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 5. — 5 espèces connues, 7.

GRATIOLE. genre 25 des plantes dites personées. *Hist. des Plantes*, XVI, 36. — 6 espèces et leurs propriétés, 37.

GRAVANCHES (les). Variété de poissons appelés *lavarets*, première espèce des corégones. *Hist. des Poissons*, XII, 233.

GRAUWACKE. Espèce de pierre, XVI, 327.

GRAVURE. Combien les Grecs ont excellé dans la gravure sur les pierres fines, XIII, 99 (note).

GRÈBE (le). Oiseau plongeur, LIX, 300. — Sa conformation, 302. — Lieux qu'il fréquente, 304. — Ses habitudes, 305. — Le genre de ces oiseaux est composé de deux familles : les grèbes et les castagneux, 307. — Le petit grèbe, 2^e espèce, 308. — Le grèbe huppé, 3^e espèce, 310. — Le petit grèbe huppé, 4^e espèce, 313. — Le grèbe cornu, 5^e espèce, 315. — Le petit grèbe cornu, 6^e espèce, 319. — Le grèbe duc-laart, 7^e espèce, 324. — Le grèbe de la Louisiane, 8^e espèce, 325. — Le grèbe à joues grises, ou le jougris,

9^e espèce, 327. — Ses variétés, par Sonnini, 329. — Le grand grèbe, 10^e espèce, 331. — Le grèbe au long bec, par Sonnini, 334. — Le grèbe montagnard, par le même, 336.

GRECS. Leur teint, XX, 231. — Les Grecs modernes consomment une quantité de poisson poulpe : récit à ce sujet, de Sonnini. *Hist. des Mollusques*, III, 115.

GREFFE (la). Par son moyen l'homme a, pour ainsi dire, créé des espèces secondaires, IV, 39. — Observations sur ce moyen artificiel de perfectionner les végétaux. *Hist. des Plantes*, I, 175 (note).

GREMIL, herbe aux perles, *lithospermum*. genre 16 des plantes dites boutraches. *Histoire des Plantes*, XVI, 91. — 3 espèces; leurs qualités, 92.

GREMILLET. Voyez SCORPION.

GRENADIER. 11^e genre des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, XVII, 63. — Deux espèces et leurs propriétés; *idem*.

GRENADILLES (les), ou passiflores. genre 17 des plantes appelées courges. *Hist. des Plantes*, XIV, 297. — 59 espèces connues, 301.

GRENADIN (le). Oiseau du Brésil ou de l'Afrique, de l'espèce des veuves, XLVIII, 89. — Ses variétés, 91 (note).

GRENAT (le). En quoi il diffère du diamant, XIII, 24. — Ses rapports avec les schorls, 25. — Grenats orientaux et occidentaux, 31. — grenat syrien, 32. — Grenat de Bohême, 33, 42 (note.) — grandeur et forme du grenat, 36. — Montagnes de grenat, 38. — Lieux où il se trouve, 39. — Manière de le tailler, 40. — Si c'est une pierre précieuse, XIV, 3; du grenat, XVI, 258.

GRENAT (le). 2^e espèce des oiseaux colibris, LIII, 262. — Sa variété, par Sonnini, 263.

GRENIERS (les). Comment ceux destinés à recevoir et conserver les grains, doivent être situés et construits. *Hist. des Insectes*, XI, 63.

GRENOUILLARD (le). Espèce d'oiseau de proie, du genre des busards, décrit par Levaillant, XXXVIII, 320. — Lieux où il se trouve, 321.

GRENOUILLE (la) Expériences qui prouvent que les grenouilles ne peuvent vivre long-tems dans l'eau sans respirer, LIV, 383. — Détails sur sa peau. *Hist. des Reptiles*, I, 76 (note). — Respiration de la grenouille commune, appelée *rana esculenta*, 160 — Expériences sur des grenouilles dans le vide, 179. — Sur leur cri, 183. — Manière dont le sang circule dans la grenouille, par Swammerdam, 195. — Note sur l'accouplement de deux grenouilles, 208 (note.) — Comment il a lieu, 209, 225. — Parties sexuelles de la grenouille mâle, 221. — Celles de la femelle, 222. — Sur ses œufs et expériences à ce sujet, 225, 227. — Changemens successifs qui surviennent au germe contenu dans l'œuf de la grenouille, par Th. Bartholin, 241. — Pprétendue métamorphose de la grenouille jackie de Surinam, en poisson, 242. — Genr 2 des reptiles appelés *batraciens*, *ranae*; leur description générale. VIII, 87. — La grenouille verte ou commune, 90. — Ses variétés, 92. — La grenouille rousse à tempes noires, 94. — Ses variétés, 97. — La grenouille ponctuée, 100. — Ses habitudes, 101. — La grenouille plissée, 102. — La grenouille crieurde, 104. — Ses habitudes, 105. — La grenouille galonnée, 106. — La grenouille rougette, 109. — La grenouille tachetée, 111. — Sa description, 112. — La grenouille mugissante, 113. — Lieux où elle se trouve et ses habitudes, 114. — Celle alose ou shad-frag, 115. — Celle cloche des Etats-Unis d'Amérique, 116. — La grenouille ocellée, 118. — Ses variétés, 121. — La grenouille halécine, 122. — Ses habitudes, 123. — La grenouille tigrée, 125. — Celle grognante, 127. — Autres espèces, 128. — La grenouille jackie, 130. — Ses prétendues métamorphoses, 131. — La grenouille arunco, 134. — La grenouille thaul, 136. — Tableau méthodique des grenouilles, 430. — Les grenouilles sont, à Vienne, l'objet d'un grand commerce, et très-recherchées par les gourmands. *Hist. des Mollusques*, II, 232.

GRENOUILLER (le). 2^e espèce du genre des poissons appelés *macroptéronotes*. *Hist. des Poissons*, XII, 33, 37.

GRÈS (le). Expériences sur le grès, II, 43. — Il se convertit bientôt en argile, seulement en séjournant dans l'eau, III, 289. — Expériences à ce sujet, IV, 111. — Expériences sur la chaleur des corps faits avec des globes de grès, 405. — Autres et expériences sur le grès, VI, 55. — Nature du grès, VIII, 75. — Description et expériences sur le grès, par M. de Lassone, des grès de Fontainebleau, 77, 85. — Grès purs et impurs, 84. — Lieux où se trouvent communément les grès, 90. — Ses différentes espèces, 92. — Leur couleur, 95. — Autre espèce de grès, 100. — Comparaison des grès avec les pierres à fusil et le grès dur nommé *grisard*, XIII, 379. — Nuances entre les deux, 381.

GRÈS DE TURQUIE. Espèce de pierre à aiguiser, XIII, 265.

GREWIA genre 11 des plantes tiliacées, ou tilleuls, *Hist. des Plantes*, XVIII, 171. — 3 espèces et leurs propriétés, 172.

GRIAS genre 6 des plantes dites guttiers. *Hist. des Plantes*, XVIII, 273.

GRIBOURIS (les), *cryptocephalus*. Insecte du genre des chrysomèles proprement dites: ex. *cryptocephalus sericeus*. *Hist. des Insectes*, III, 227. — Espèce d'insecte du genre des chrysomélines, XI, 330. — genre 228, 34 espèces, 362 à 373.

GRIFFARD (le) Grand oiseau de proie, aigle d'Afrique, par Sonnini, XXXVII, 334. — Son plumage, sa force et sa fierté, 336. — Ses habitudes, 337.

GRIFFES (les). Ce que c'est dans les plantes. *Hist. des Plantes*, I, 284.

GRIFFON (le). Espèce de vautour, XXXVIII, 102. — Sa description, 103. — Raisons pour croire que c'est le grand vautour des anciens, 105.

GRIENON. Petit village à trois lieues de Versailles, où l'on trouve toutes les plus belles coquilles du bassin de Rheims, dans le plus bel état de conservation. *Hist. des Mollusques*, 143. — Magnifiques échantillons fossiles du nautille flambé, de celui des mers orientales et africaines, trouvés dans ce lieu et aux environs, 144.

GRÉNI (le) 1^{re} espèce des aracarís, oiseaux de l'Amérique, LVI, 63. — Sa description, 65.

GRILLON (le). Insecte particulier : ex. *gryllus campestris*. *Hist. des Insectes*, III, 276. On le connoît aussi sous le nom de CRIS-CRIS, insectes de la famille des orthoptères. Celui des champs et celui domestique, 116. — Son cri, d'où il lui vient, et à quoi il lui sert, *idem*. — Détails sur cet insecte par de Géer, 117. — Genre 156, sa description, 122. — Sept espèces, 123.

GRILLONNES (les). Famille des insectes. *Hist. des Insectes*, III, 274; V, 279. — 2^e famille de la 3^e section des orthoptères, composée des trydactiles, des courtilliaires et des grillons. Leurs caractères. XII, 112.

GRIMME (la), ou chèvre de Grimm. Sa description par le docteur Herman Grimm, XXXI, 152. — Description de cet animal par MM. Vosmaër et Pallas, 153. — Remarques de MM. Forster, 162. — Particularités de son squelette, 164.

GRIMPEREAUX (les). Espèce d'oiseau de la nature des mésanges, LII, 244. — Ils sont ainsi appelés parce qu'ils grimpent très-légèrement, 365. — Leurs rapports avec les colibris, et leurs différences, 366. — Leur nourriture, 367. — Leur plumage, 368, 375. — Diverses espèces de grimperaux, 369. — Description du grimpereau, 370. — Ponte de la femelle, 373. — Lieux que le grimpereau fréquente, 374. — Sa longueur totale, 375. — Ses variétés. Le grand grimpereau, 378. — Le grimpereau de muraille, 379. — Lieux où il se trouve et ses voyages, 382. — Description du mâle et de la femelle, et de plusieurs de leurs parties, 383. — Oiseaux étrangers de l'ancien continent qui ont rapport aux grimperaux; les souimangas, 386. *Voyez* ce mot, auquel sont joints plusieurs autres espèces de grimperaux, LIII, 5 et suiv. — Les guilguits d'Amérique. *Voy.* ce mot, 60. — Le sucrier, 83. — Le grimpereau verd par Virey, 96. — Le grimpereau à long bec des îles Sandwich, 97. — Le grimpereau à queue violette, 100. — Le grimpereau couleur de tabac, 103.

— Le grimpereau à dos rouge de la Chine, 105. — Les grimpereaux fuligineux, 109. — Les grimpereaux du Bengale à bec rouge, à barbes et ailes dorées, 114. — Le grimpereau verd du cap de Bonne-Espérance, 119. — Le beau grimpereau de Malaca et le grimpereau à queue noire, 121. — Le grimpereau à long bec, le grimpereau siffleur et le grimpereau gris de la Chine, 123. — Tous ces grimpereaux sont décrits par Virey, depuis celui de la page 96. — Sur la ponte, les œufs et le nid du grimpereau, LX, 346, 347.

GRIMPEUR (le). 67^e espèce du genre des poissons, appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 192, 252 et 253.

GRINETTE (la). Espèce de poule d'eau, LIX, 186.

GRISALPIN (le). Oiseau gros-bec de Virginie, XLVII, 46.

GRISARD (le). 4^e espèce du genre des oiseaux goélands, LX, 237. — Ses habitudes, 239, 242. — Celles d'un grisard élevé en domesticité, 240 (note). — Sa description, 241. — Détails anatomiques sur cet oiseau, 244.

GRISÉ (le). 23^e espèce de squalé. Sa nomenclature et sa description. *Hist. des Poissons*, IV, 96. — Autre, par Broussonnet, 97 (note).

GRISETTE (la), ou le cochevis du Sénégal, oiseau de la nature de l'alouette, LI, 8. — La grisette ou fauvette grise, dite en Provence passerine, 106. — Son nid, 107. — Sa description, 108. — La fauvette bouscarle, 109. — La petite grisette, par Sonnini, 111.

GRIRIN (le) de Cayenne, espèce de merle, XLVI, 291.

GRISLEA. genre 5 des plantes dites salicaires. *Hist. des Plantes*, XVII, 26.

GRIS-OLIVE (le). Oiseau de la Louisiane, formant la 5^e espèce moyenne des tangaras, XLVIII, 327.

GRISON (le). Description de cet animal par M. Allamand. C'est une espèce voisine de celle de la belette et de l'hermine, XXXIII, 25. — Preuve de son naturel féroce et sanguinaire, 27. — Ses dimensions, 28.

GAISON (le) 20^e espèce du genre des poissons dits labres. *Histoire des Poissons*, IX, 117, 194. — 1^{ere} espèce du genre des poissons appelés *pomacanthes*, XI, 189.

GRIVE D'EAU (la). Sa description, LIX, 88.

GRIVELIN (le). Oiseau du Brésil, espèce de gros-bec, XLVII, 29. — Le grivelin à cravate, autre espèce de gros-bec, 63.

GRIVERT (le), ou rolle de Cayenne. Espèce d'oiseau, XLIV, 283.

GRIVES (les). Leurs rapports avec les merles, XLV, 253. — 4 espèces principales, savoir : la grive proprement dite, la draine, la litorne et le mauvis, 254. — A la suite quelques grives étrangères, 256. — Trait de conformité entre la grive et la draine, *idem*. — Entre la litorne et le mauvis, 257. — Description générale des grives, *idem*. — Cas que faisoient les Romains des grives, et description des volières dans lesquelles ils les conservoient, 258. — Usage à peu près du même genre dans certaines provinces de France, 261. — Habitudes des grives, 264. — Comment on les chasse, 265 et 270. — Leurs voyages, 266. — Description de leur bec, 271. — Description de la grive proprement dite, 272. — Pourquoi on l'appelle grive de vigne, 273. — Son appareillement et sa ponte, 276. — Lieux où elle se trouve et comment on la prend, 279. — Ses habitudes, 280. — Sur la grive tenue en cage, 282 (note). — Variétés de la grive proprement dite, la blanche et la grive huppée, 284, 285. — Oiseaux étrangers qui ont rapport à la grive proprement dite : celle de la Guiane, 287. — La grivette d'Amérique, 289. — La grive de la Jamaïque, par Sonnini, 294. — La rousserolle. *Voy.* ce mot, 296. — La draine. *Voyez* son article, 300. — Oiseaux étrangers qui ont rapport aux grives et aux merles. La grive bassetse de barbarie, 337. — Le tilly ou la grive cendrée d'Amérique, 340. — Addition par Sonnini, 343. — La petite grive des Philippines, découverte par Sonnerat, 345. — L'hoamy de la Chine, décrit par Brisson, 346. — La grivelette de Saint-Domingue, 348. — La grive d'eau, LIX, 88. — Description de son bec, 89.

GROENLAND, l'ancien et le nouveau, II, 161. — Montagnes de glace dans les mers voisines du Groenland, 171.

GROENLANDAIS. Leur description, XX, 66, 109. — Relation qu'en a donné M. Crantz, 110, 113. — Sur ce que dit M. P. . . . de ce peuple, 419.

GROIN (le). 54^e espèce du genre des poissons appelés *lutjans*. *Hist. des Poissons*, X, 186 et 242.

GRONDEUR (le), ou le cotte grognant. Poisson de la classe des cottes. 1^{re} espèce. *Hist. des Poissons*, VIII, 284. — Sa description, 285.

GRONDIN (le). 9^e espèce du genre des poissons appelés *trigles*. Sa description. *Hist. des Poissons*, IX, 9 et 35. — Sa comparaison avec le gurnau, poisson du même genre, 36.

GRONOVIE (la) grimpante. genre. 1^{er} des plantes dites courges. *Hist. des Plantes*, XIV, 247. — Une espèce connue, 248.

GRONOVIE (le squalé). 29^e espèce du genre des poissons squalés. Sa description. *Hist. des Poissons*, IV, 119.

GRONOVIE (la raie). 38^e espèce. *Voyez* le mot RAIE.

GROS-BEC (le). Oiseau de notre climat; ses différents noms, 376. — Sa description et surtout celle de son bec, 378 (note). — Lieux où il se plaît, 379 (note). Son chant, 380. — Sa ponte et son nid, 381. — Sur le mâle et la femelle, 383. — Description de la baya, nouvelle espèce de gros-bec, 384 (note). — Le bec-croisé; pourquoi ainsi nommé, XLVII, 5. *Voy. ce mot.* — Oiseaux étrangers qui ont rapport au gros-bec. Le gros-bec de Coronandel, 16. — Sa description, 17 (note). — Le gros-bec bleu d'Amérique; pourquoi on l'a appelé nucifrage, 18. — Le dur-bec, 20. — Le cardinal huppé, 23. — Le rose-gorge, 27. — Le grivelin, 29. — Le rouge-noir, 31. — Le flaver, 32. — La queue en éventail, 34. — Le padda ou l'oiseau de riz, 36. — Le toucan-mourvi, 40. — L'orchel, 43. — Le gros-bec nonette, 45. — Le grisalbin, 46. — Le quadricolor, 47. — Le jacobin et le domino, 49. — Le baglasecht, 53.

— Le grosbec d'Abyssinie, 56. — Singularité de la construction de son nid, 57. — Le guifso-balito, 59. — Le grosbec tacheté du cap de Bonne-Espérance, 61. — Le grivelin à cravate, 63. — Le bec-croisé leucop-
tère, par Virey, 65. — Le grosbec de la Chine, 67. — Le nêlicourvi, 69. — Construction de son nid, 70. — Le bec-croisé social, 71. — Le grosbec cafre, 73. — Le grosbec à ventre noir, 77. — Le grosbec du Malabar, 79. — Le grosbec perroquet, 81. — Le grosbec de Gambie, 83. — Celui de Caucase, 84. — Sa description, 85. — Le grosbec de la nouvelle Angleterre, 86. — Le grosbec ferrugineux, 88. — Le grosbec à queue blanche, 90. — Le grosbec verdâtre, 92. — Le grosbec asiatique, 93. — Le grosbec chanteur, 95. — Le grosbec perlé, 97. — Le cardinal de Sibérie, 99. — Le petit cardinal du Volga, 104. — Le cardinal huppé d'Afrique, 106. — Le cardinal de Virginie à bec jaune, 108. (Toutes ces espèces de grosbecs, depuis celui décrit p. 55, sont ajoutés par Virey). — Le malimbe, par Sonnini, 111. — Sur la ponte, les œufs et le nid des grosbecs, LX, 379.

GROS-ŒIL (le). 39^e espèce du genre des poissons appelés spares. *Hist. des Poissons*, IX, 388; et X, 95.

GROSEILLER, genre 1^{er} des plantes dites cactes. *Hist. des Plantes*, XVII, 5. — 10 espèces, 6. — Leurs propriétés, 8.

GROSSESSE. Terns de la gestation chez les différents animaux, XVIII, 23. — État de la matrice dans la grossesse, 80. — Sur l'imagination des femmes grosses, 188. — Exemples à ce sujet, 193. — Durée de la grossesse, 198. — Signes de la grossesse, 380. — Point de grossesse avant trente-cinq ans à l'île de Formose, XX, 166. — Les Portlandais ne se marient qu'à une femme enceinte, XXI, 45.

GROSSEUR. *Voy. EMBONPOINT.*

GROTTES. Les premières ont été bâties par les hommes et construites dans la craie, VIII, 180. — Sur les grottes d'Arcy-sur-Cure, près de Vermanton, 270. — Sur celle appelée Trois-Ros, 271 (note). — grotte

de la Balme; sa formation. *Hist. des Mollusques*, I, 79. — Grottes de Caumont, à quatre lieues de Rouen, I, 596 et suiv. — Sur les figures émultiformes que le peuple croit y voir, 400. — Anecdote comique à ce sujet, 401.

GRUE (la). De tous les oiseaux voyageurs, c'est celui qui entreprend et exécute les courses les plus lointaines et les plus hardies, LVII, 21. — Noms et fables que lui attribuoient les anciens, 24. — Les singes sont leurs ennemis, 26. — Leur vol, 28. — Leur vigilance à terre, 30. — Elles partent aux premiers froids de l'automne; lieux où elles se retirent, 31. — Comment on les prend, 34. — Manière de les apprivoiser, 36. — Leur longue vie et leur nourriture, 37. — Singularité de leur trachée-artère, 38. — Leur plumage, 39. — Grues blanches, 41. — Lieux qu'elles habitent principalement, 42. — Grue des Indes orientales, 43. — Ses espèces, 44. — La grue à collier, 48. — Celle blanche de Sibérie, par Sonnini, 49. — Lieux où on la trouve, 50. — Ses habitudes, 51. — L'argala, par le même, 53. — Grues du nouveau continent; la grue blanche de l'Amérique, 56. — Sa description; 57. — Lieux où on la trouve, et ses habitudes, 59. — La grue brune, 61. — Les plaies des grues guérissent aisément, 62 (note). — Observations de Bartram sur la grue brune, 64 (note). — Oiseaux étrangers qui ont rapport à la grue; la demoiselle de Numidie. *Voy. ce mot*, 67. — L'oiseau royal, 74. — Le carlama, 84. — Le secrétaire ou le messager, 88. *Voy. le premier mot*. — Le kamichi, 102.

GRY-GRY, ou émerillon des Antilles, décrit par le P. Dutertre, XXXIX, 251.

GRYPHÈS (les) genre 114 des mollusques dits acéphales. *Hist. des Mollusques*, VI, 202. — Leurs rapports avec les autres divisions, et particulièrement avec les huitres, 203. — Leur description, 204. — 3 espèces, 206.

GUACARI (le). Poisson du genre des hypostomes. *Hist. des Poissons*, XII, 103 et 104.

GUACCO (le) 4^e espèce des crabiers de l'ancien continent, LVII, 218. — Ses variétés, 221 (note).

GUACHI (le). Espèce de chien d'eau de l'Orénoque, XXXIII, 293.

GUAMAIACU. 3^e espèce des poissons appelés *coffres* ou *ostraciens*. *Hist. des Poissons*, V, 38.

GUANACO. Ses différences avec le lama, XXXII, 85 (note).

GUANCA-VELICA. Petite ville du Pérou, remarquable par sa mine de mercure, XII, 23.

GUANQUE (le). Espèce de rat du nouveau continent, décrit par Sonnini, XXX, 208. — Ses habitudes, 209.

GUAPURU. genre 5 des plantes dites myrtes. *Hist. des Plantes*, XVII, 60.

GUARA (le), ou diodon holocanthe. Espèce de poisson. *Hist. des Poissons*, V, 188. — Ses différences avec l'atinga, 189. — Sa pêche, 191.

GUARDOQUIA (le) genre nouveau qui rentre dans la famille des labiées. *Hist. des Plantes*, XV, 414.

GUARE (le). 2^e espèce des poissons appelés *scombres*. *Hist. des Poissons*, VII, 292. Voyez *SCOMBRES*.

GUARÉA genre 11 des plantes azédaracks. *Hist. des Plantes*, XVIII, 246.

GUAROUBA (le), ou perriché jaune. Espèce de perroquet, LXIV, 64.

GUAZE (le). 13^e espèce du genre des poissons appelés *labres*. *Hist. des Poissons*, IX, 136 et 248.

GUEBUM (le) Poisson décrit par Marcgrave, appelé en français *voilier*; description de ses écailles. *Hist. des Poissons*, 209. — Rapidité avec laquelle il nage, 210.

GUÈDE ou PASTEL, *iratis*. genre 29 des plantes crucifères. *Hist. des Plantes*, XVIII, 77. — 4 espèces, 78. — Leurs propriétés, 79.

GUEMUL (le). Animal considéré comme un cheval, espèce de lama, décrit par Sonnini, XXXII, 122. — Notice de Molina sur cet animal, 123.

GUENONS (les). Ce que signifie ce nom, XXXV, 15. — Différences des guenons d'avec les makis, 14. — 9 espèces de guenons, 15. — Sur la guenon appelée *kebos* par les anciens Grecs, 16. — Autres espèces de guenons

guenons ou singes découverts par les mêmes, 17. — Espèce intermédiaire entre les guenons et les babouins, appelée *maimon*, le seul de tous ces animaux dont la queue soit dégarnie de poils, 18, 298. — Caractères qui distinguent les guenons des sapajous et des sagoins, 21. — La guenon à museau allongé, 284. — La guenon à camail, 286. — Autre espèce décrite par M. Pennant, 287. — La guenon à crinière, 289. — La guenon à face pourprée, 292. — La guenon à long nez, 294. — Ses dimensions, 297. — La guenon couleur de chat sauvage, XXXVI, 67. — La guenon couronnée; sa description et ses dimensions 25, 26, 28. — La guenon appelée *mone*, 35. — La palatine, autre espèce de guenon, 46. — Le talapoin, 60. — Celle à nez blanc proéminent, 78. — La guenon nègre, 82. — Fœtus de guenon, 84.

GUÉPARD (le). Espèce de chat sauvage, XXXIII, 156.

GUÊPE (la). Insecte; sa nourriture. *Histoire des Insectes*, I, 141. — La république des guêpes fait du papier, 225. — Description de leur forteresse, 226. — Celles du nouveau monde font du carton, 228. — Description de leur ruche, *idem*. — Sur leur aiguillon, 262. — *Vespa vulgaris*, III, 364. — Genre 403 d'insectes de la famille des guépiaires, XIII, 332. — La guêpe frelon et la guêpe commune; lieu où la première fait son nid, 333. — Lieu où la seconde construit son nid, 335. — Forme du guépier et sa construction, 336. — Description de son enveloppe, 337. — Travaux des guêpes dans le guépier, 339. — Sa durée, 340. — Combats des guêpes, 341. — Guépier particulier de la guêpe de Holstein, 342. — 5 espèces de guêpes, 350.

GUÉPIAIRES, *vespariæ*. Espèce de guêpes. *Hist. des Insectes*, III, 358. — § 1. guépiaires solitaires à bec; *rostratæ*, 359. — § 2. guépiaires solitaires maçonnes, *murariæ*. § 3. guépiaires à ruches et sociales, *favosæ*, 362. — Famille 75 d'insectes; leur description. XIII, 326. — Genre 398, les synagres, 344. — Genre 399, les eumènes, 356, 344. — Genre 490, les odynères, 326,

Tab. TombI.

F f

346.—genre 401, les polistes, 329, 348.—genre 402, les épinones, 330, 349.—genre 403, les guêpes, 332, 350.

GUÊPIERS (les). Oiseaux, LIV, 148.— Leur comparaison avec les hupes et les promerops, 149.— Leur analogie avec les martins-pêcheurs, 150.— Leur climat, 151.— Le guépier; sa synonymie, 215.— Manière de le pêcher à la ligne au milieu de l'air, 218.— Lieux où les guépiers sont les plus communs, 219.— Leur cri, 220.— Lieux où ils nichent, 223.— Leur vol, 224.— Singularité à ce sujet, 225.— Description du guépier mâle, 226.— Le guépier à tête jaune et blanche, 229.— Le guépier à tête grise, 231.— Le guépier gris d'Ethiopie, 233.— Le guépier marron et bleu du Sénégal, 234.— Ses variétés, 236.— Le patirich guépier de Madagascar, 237.— Autre espèce de guépier de Madagascar, 239.— Le guépier verd à gorge bleue; méprise à son sujet, 240.— Exemple des méprises qui peuvent contribuer à la multiplication des espèces nominales, 241.— Le guépier des Philippines, 242, 258.— Autres espèces, 247.— Le grand guépier verd et bleu à gorge jaune, 248.— Le petit guépier verd et bleu à queue étagée, 250.— Le guépier verd à queue d'azur, 252.— Le guépier rouge à tête bleue, 254.— Le guépier rouge et verd du Sénégal, 256.— Deux autres même genre, 257 (note).— Le guépier à tête rouge, 258.— Le guépier verd à ailes et queue rousses, de Cayenne, 260.— L'ictérocéphale ou le guépier à tête jaune, 263.— Le chaddœjr, par Soncini, 266.— Sa description, 271.— Le schoëghagha ou le guépier des Arabes, commun dans les forêts de l'Yemen; 272.— Le guépier à queue d'hirondelle; son caractère distinctif, 273.— Le guépier bicolor observé à Malimbe en Afrique par Perrein, 274.— Ses habitudes, 275.— Le guépier à collier et à très-longue queue du même endroit, 277.— Le guépier à plumage varié du même endroit, 278.— Le guépier de Perse, 280.— Le guépier jaune de la côte de Coromandel, décrit par Sonnerat, 282.— Le kogo, espèce de guépier de la nouvelle Zélande, 284.— Sa descrip-

tion, 285. — Le moho, guépier des îles de Sandwich, 286. — Ses variétés, 287. — Le guépier à caroncules, de la nouvelle Hollande, au port Jackson, 288. — Le guépier cornu ; il est indigène à la nouvelle Hollande, 290. — Le guépier natté, du même endroit, décrit par John White, 292. (Tous les guépiers, depuis celui de la page 266, sont décrits par Sonnini).

GUERLINGUETS (les). Animaux de la Guiane ; espèces d'écureuils, XXVII, 198. — Leur description, 199.

GUERRE. Tableau des désastres qu'elle entraîne après elles, XXIII, 368. — Sublime prière de Buffon à Dieu, pour détourner les fléaux de la guerre ; 369.

GUETTARDES (les). genre 76 des plantes dites rubiacées. *Hist. des Plantes*, XIV, 97. — Espèces remarquables. La guettarde de l'Inde, 99. — La guettarde odorante, 100. — 14 espèces connues, *idem*.

GUI (le). Vénération qu'avoient les anciens pour ce végétal ; ce qu'en dit Pline. *Hist. des Plantes*, X, 367. — genre 8 des chèvre-feuilles, *viscum*. XIV, 140. — Espèce remarquable, le gui commun, 150. — Culte religieux que lui rendoient les Gaulois, 151. — 1^{re} espèce de France et 16 espèces connues, 153.

GUIACONO. Voyez PLAQUEMINIERS.

GUIANE (la). L'aspect de ses vastes terres présente l'idée de la nature brute et le tableau de la formation successive d'une terre nouvelle, III, 428, 430. — Nature de ce climat, IV, 27. — Ses fleuves, 124.

GUIER. genre 14 des plantes dites épilobes. *Hist. des Plantes*, XVII, 48.

GUIB (le). Animal du Sénégal ressemblant à la gazelle, XXXI, 165. — Sa description par M. Adanson, le premier qui en ait parlé, 166.

GUIDEAU (le). Espèce de filet dont on se sert pour la pêche. *Hist. des Poissons*, XIII, 345. — Comment on le tend, 346. — Autres espèces, 348.

GUIFETTE (la). Espèce d'hirondelle de mer, 3^e espèce, LX, 100. — En quoi elle diffère des pierre-garins, 102. — La guifette noire ou l'épouvantail, 4^e espèce, 104. — D'où lui vient ce nom, 105.

GUIRO-BALITO (le). Oiseau, espèce de gros-bec, XLVII, 59.

GUIGNA (le). Espèce de chat sauvage, XXXIII, 165.

GUIGNARD (le). 3^e espèce de pluvier doré, LVIII, 349. — Ses voyages, 351. — Sa stupidité, 352. — Autre espèce, ou le guignard d'Angleterre, 353. — Le guignard à tête noire, LIX, 29.

GUIGNETTE (la). Espèce de bécasseau, ou oiseau de rivage, LVIII, 137. — Ses habitudes, 139.

GUILANDINA. Voy. BEN.

GUILLEMOT (le). Oiseau du Nord, à courtes ailes, LXII, 343. — Ses émigrations, 346. — Sa description, 349. — Le petit guillemot, improprement nommé colombe du Groënland, 349. — Sa description, 352. — Ses habitudes, 355. — Le kaiover du Kamtschatka, 357.

GUILLINO (le). Animal, espèce de loutre du Chili, XXXIII, 327. — Sa fourrure, 328.

GUIMAUVE, *althea*. genre 4 des plantes malvacées, ou mauves. *Hist. des Plantes*, XVIII, 184. — Propriétés, *idem*. — genre 14, *hybiscus*, 193. — 4 espèces, 194. — Culture et propriétés, 195.

GUINÉE (la nouvelle). Description de ses habitants, XX, 168.

GUIRA-BERABA (le). 5^e espèce des oiseaux pitpits, LII, 147.

GUIRA-PANGA, ou le cotinga blanc. Oiseau de Cayenne, XLIX, 317. — Description de la caroncule qu'il a sur le bec ; sa différence d'avec celle du dindon, 318.

GUIRA-PÉREA. Oiseau du Brésil, décrit par Pison, et confondu par Brisson avec le guira-beraba, 5^e espèce des oiseaux pitpits, LII, 148. — Rangé par Brisson dans la classe des tangaras, XLVIII, 362.

GUIRA-QUEREA (le). Oiseau du Brésil du genre de l'engoulevent, 2 espèces, LIV, 329.

GUIRAROU (le). Oiseau de la Guiane du genre des cotingas, XLIX, 324. — Autre espèce, ou cotinga gris, 327.

GUINÉGAT (le). Oiseau de l'Amérique méridionale, du genre des bruants, *XLIX*, 82. — Portraits du mâle et de la femelle, 84.

GUISEAU. Anguille de la Seine; sa description. *Hist. des Poissons*, *VI*, 101.

GUIT-GUITS (les). Oiseaux d'Amérique, *LIII*, 60. — Le guit-guit noir et bleu, 61. — Variété, 65. — Le guit-guit verd et bleu à tête noire, 69. — Ses variétés. Le guit-guit verd à tête noire, 71. — Le guit-guit verd et bleu à gorge blanche, 73. — Le guit-guit tout verd, 75. — Le guit-guit verd tacheté, 76. — Le guit-guit varié, 79. — Le guit-guit noir et violet, 81. — Les guit-guits verd-bleus, par Virey, 128. — Le guit-guit à bracelets, et le guit-guit cannelle, par le même, 130.

GUITTARINS (les). Voyez les **COTELETS**.

GULAUND (le). Espèce d'oie d'Irlande, *LXI*, 238.

GUNDÉLIE (la) de Tournefort. genre 56 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, *XII*, 174. — Une espèce connue, 176.

GUNNEL (le). Poisson de l'espèce des blennies. *Histoire des Poissons*, *VII*, 147. Voy. **BLENNIE**.

GUNNÈRES (les) genre 24 de la famille des orties. *Hist. des Plantes*, *X*, 139. — La gunnère des teinturiers et trois espèces connues, 140.

GUOR (le). 11^e espèce des poissons appelés tétrodons; sa description. *Hist. des Poissons*, *V*, 107.

GURNAU (le). 8^e espèce du genre des poissons appelés trigles. Sa description. *Hist. des Poissons*, *IX*, 9 et 32. — Sa comparaison avec le grondin, poisson du même genre, 36.

GUTTIERS (les), *guttiferae*. Famille 94 des plantes. *Hist. des Plantes*, *VI*, 22. — § 1^{er}. Point de style. Leurs différens noms, 23. — § 2. Un style, 25. — genre à feuilles alternes, ayant des rapports avec les guttiers et les orangers, 28. — Famille 95 des plantes dicotylédones, *XVIII*, 266. — § 1. Styles nuls; genre 1^{er}, guttier cambogia, 267. — Ses usages, 268. — genre 2, clusia, 269. — genre 3, garcinia, 270. — genre 4, toromita. Genre 5, quapoya, 272. — genre

6, grias, 273. — § 2. Styles uniques; genre 7, mani, et 8, macoubea, 274. — genre 9, mammea, 275 — genre 10, macanea, et 11, singana, 276 — genre 12, mesua, et 13, rhéedia, 277. — genre 14, calophyllum, 278. — § 3. genres qui tiennent le milieu entre les guttiers et les orangers. genre 15, vatéria, 278. — genre 16, elœcarpus, 279 — genre 17, vatica, et 18 allophyllus, 280.

GUZARATE. Habitans de ce pays, XX, 184.

GYMNÈTRES (les). genre 99 des poissons; point de nageoire de l'anus; une seule nageoire dorsale; les rayons des nageoires thoraciques très-allongés. Leur description. *Hist. des Poissons*, IX, 60, 61. — Celui hawken, 62.

GYMNOCARPUS. genre 11 des plantes dites portulacées. *Hist. des Plantes*, XVI, 375.

GYMNOCÉPHALE (le). 24^e espèce du genre des poissons appelés lutjans. *Hist. des Poissons*, X, 175 et 218.

GYMNOMURÈNES (les). genre 216 des poissons osseux 1^{re} espèce, la gymnomurène cerclée, la gymnomurène marbrée. 1^{re} et 2^e espèce. *Hist. des Poissons*, XIII, 256, 257.

GYMNOSTYLES (les). genre 133 des plantes composées. *Hist. des Plantes*, XIII, 52. — 3 espèces connues, 53.

GYMNOTES (les). genre 24 des poissons qui ont des nageoires pectorales et de l'anus, et point de nageoires du dos ni de la queue. 1^{er} sous-genre, la mâchoire inférieure plus avancée; première espèce, la gymnote électrique, *Hist. des Poissons*, V, 334, 336. — Caractères véritablement distinctifs du genre auquel appartient ce poisson, 338. — Sa description, 339. — Poissons qui ont reçu l'épithète électrique, 340. — Effets de l'électricité du gymnote, 341, 354. — Lieux qu'habite le gymnote électrique, 344. — Son portrait, 345. — Ponte de la femelle, 346. — Sa queue, 347. — Sa manière de nager, 348. — Sa vessie aérienne ou natatoire, 349. — Sa qualité torporifique a été découverte par Van-Berkel, observée ensuite par Richer

et par d'autres, 351. — Hunter a très-bien décrit l'organe dans lequel réside cette vertu, 352. — En quoi elle consiste, 353. — Comment elle est transmise, *idem.* — Suite de ses effets, 354. — Comment on suspend cette vertu électrique, 356. — Vertu galvanique du gymnote électrique, 357. — Description de ses organes torporifiques, *idem.* — Leur composition intérieure, 360. — Étincelles qu'ils produisent, 361. — Comment on obtient ces étincelles, 362. — Comment on les explique, 363. — Analogie entre un carreau fulminant et les organes torporifiques de la gymnote, 365. — La source de cette vertu naît dans les nerfs, 367. — Dimension et distribution de ces nerfs dans la gymnote, *idem.* — Le cerveau est la première source de sa vertu électrique, 369. — Ce qu'il faut pour donner naissance à cette faculté, 370. — Comment on explique pourquoi certaines personnes peuvent toucher un gymnote électrique, sans éprouver de secousse, 372. — Détail des expériences de Williamson sur le gymnote électrique, 374 (note). — Des poissons connus à Cayenne sous le nom de *coulans*, 379 (note). — Composition du corps du gymnote et son naturel, *idem.* — Sur sa chair, 381. — Le gymnote putaol, 2^e espèce, 382. — Le gymnote blanc, 3^e espèce, 384. — Le gymnote carapo. Celui fierasfer, et celui long-museau, 385. — Description du gymnote carape, 387. — Du gymnote fierasfer, 388. — Du gymnote long-museau, 389.

GYNOPOGON. genre 20 des plantes dites apocins. *Hist. des Plantes*, XVI, 188.

GYNTÉL (le) de Strasbourg. Espèce de linotte, XLVII, 300.

GYPAETES (les). Oiseaux de proie qui tiennent de l'aigle et du vautour, par Sonnini, XXXVIII, 212. — Leurs caractères propres et lieux où on les trouve, 213. — Le gypaète des Alpes, 214. — Sa description, par M. Picot de la Peyrouse, 215. — Lieux qu'il habite, 216. — Le gypaète châtain, 218. — Le gypaète d'Afrique, décrit par le chevalier James Bruce, 219. — Sa description, 220. — D'où vient la grande quantité de poudre brune dont il est couvert; conjectures à

ce sujet , 222. — Le gypaète basané , décrit par Brown, 223. — Le gypaète d'Augola, 225. — Sa description , 226.

GYPSOPHYLLE. genre 20 des plantes caryophyllées. *Hist. des Plantes*, XVIII, 131. — 8 espèces, 132.

GYPSE (le). — Sa différence d'avec le plâtre, VIII, 356, 359. — gypse et sélénite sont la même chose, 355, 359. — Le gypse naturel, 360. — Le gypse de Suède, 379 (note). — On peut considérer le gypse comme le plâtre le plus pur, 381. — Sur la carrière à plâtre de Saint-Raphaël, qui contient trois sortes de gypse, 390 (note.) — Sur le gypse ou sélénite, 2^e espèce de vitriol à base terreuse, IX, 472. — De la formation des gypses, XVI, 105. — Du gypse ou chaux sulfatée, 223. — Des gypses mélangés, 224. — Des gypses ou sulfates calcaires composés, 239.

GYRASOL. Espèce de pierre, XII, 423. — Son étymologie, XIV, 86. — Détails sur cette pierre, 87, 98.

GYRIN. Insecte du genre des hydrocanthares : *ex. gyrinus nbtator*. *Hist. des Insectes*, III, 75. — genre 1^{er} des insectes appelés hydrocanthares, VIII, 149. — Leur description, 150. — Leurs habitudes, 151. — Leurs espèces : 1^o le gyryn nageur ; 2^o le bicolor ; 3^o celui américain, 153. — 4^o celui petit ; 5^o celui velu, 154.

GYROSELLES (les). genre 19 des plantes dites lysimachies. *Hist. des Plantes*, XIV, 591. — 2 espèces connues, 592.

FIN DU PREMIER VOLUME DE LA TABLE GÉNÉRALE.



